

HIPPOCRATIS
APHORISMI
GRÆCE ET
LATINE,

*

*Ita digesti in ordinem, ut mutuo sese explicare,
& ad morborum curationem singuli suo è
loco prodire videantur, cum breui exposi-
tione ex Galeni commentarijs desumpta.*

RIVSD. HIPPOCR.

*Prænotionum libri tres, cum explicatione eod-
em ex fonte hausta.*

Per Ioannem Butinum medicum.

*Insigniores aliquot sententiæ selectæ ex libro
Aurelij Cornelij Celsi, medici inter Latinos
eloquentissimi.*

Inhibuit. Paris. orat.



LYGDUNI,
APUD IOAN. TORNAESIVM
TYPOGR. REGIVM.

M. D. LXXX.

Cum privilegio Regi ad decennium.

In his first oration, he treated of the
 (1) the most common diseases of the
 (2) the most frequent accidents, and
 (3) the most common diseases of the
 (4) the most common diseases of the
 (5) the most common diseases of the
 (6) the most common diseases of the
 (7) the most common diseases of the
 (8) the most common diseases of the
 (9) the most common diseases of the
 (10) the most common diseases of the
 (11) the most common diseases of the
 (12) the most common diseases of the
 (13) the most common diseases of the
 (14) the most common diseases of the
 (15) the most common diseases of the
 (16) the most common diseases of the
 (17) the most common diseases of the
 (18) the most common diseases of the
 (19) the most common diseases of the
 (20) the most common diseases of the
 (21) the most common diseases of the
 (22) the most common diseases of the
 (23) the most common diseases of the
 (24) the most common diseases of the
 (25) the most common diseases of the
 (26) the most common diseases of the
 (27) the most common diseases of the
 (28) the most common diseases of the
 (29) the most common diseases of the
 (30) the most common diseases of the
 (31) the most common diseases of the
 (32) the most common diseases of the
 (33) the most common diseases of the
 (34) the most common diseases of the
 (35) the most common diseases of the
 (36) the most common diseases of the
 (37) the most common diseases of the
 (38) the most common diseases of the
 (39) the most common diseases of the
 (40) the most common diseases of the
 (41) the most common diseases of the
 (42) the most common diseases of the
 (43) the most common diseases of the
 (44) the most common diseases of the
 (45) the most common diseases of the
 (46) the most common diseases of the
 (47) the most common diseases of the
 (48) the most common diseases of the
 (49) the most common diseases of the
 (50) the most common diseases of the
 (51) the most common diseases of the
 (52) the most common diseases of the
 (53) the most common diseases of the
 (54) the most common diseases of the
 (55) the most common diseases of the
 (56) the most common diseases of the
 (57) the most common diseases of the
 (58) the most common diseases of the
 (59) the most common diseases of the
 (60) the most common diseases of the
 (61) the most common diseases of the
 (62) the most common diseases of the
 (63) the most common diseases of the
 (64) the most common diseases of the
 (65) the most common diseases of the
 (66) the most common diseases of the
 (67) the most common diseases of the
 (68) the most common diseases of the
 (69) the most common diseases of the
 (70) the most common diseases of the
 (71) the most common diseases of the
 (72) the most common diseases of the
 (73) the most common diseases of the
 (74) the most common diseases of the
 (75) the most common diseases of the
 (76) the most common diseases of the
 (77) the most common diseases of the
 (78) the most common diseases of the
 (79) the most common diseases of the
 (80) the most common diseases of the
 (81) the most common diseases of the
 (82) the most common diseases of the
 (83) the most common diseases of the
 (84) the most common diseases of the
 (85) the most common diseases of the
 (86) the most common diseases of the
 (87) the most common diseases of the
 (88) the most common diseases of the
 (89) the most common diseases of the
 (90) the most common diseases of the
 (91) the most common diseases of the
 (92) the most common diseases of the
 (93) the most common diseases of the
 (94) the most common diseases of the
 (95) the most common diseases of the
 (96) the most common diseases of the
 (97) the most common diseases of the
 (98) the most common diseases of the
 (99) the most common diseases of the
 (100) the most common diseases of the

Per loannem: Buitan: medicum.
 In primis et post sententiam fuisse
 And in the case of the following



LONDON:
 ADAM LANE, TORONTO
 TYPOGRAPHY.
 M. D. LXXV.
 Castiglione's Regal and Imperial



I. B V T I N V S

LECTOR L



IN manus iterum sumo
relegendum opus A-
phorismorum Hippo-
cratis, antehac à me
succisuiis horis eum in
ordinem adductū, qui Lectorem
molestæ inquisitionis tædio leua-
re posset, vt accinctus alteri nunc
editioni typographus formā quā-
dam ad imitandum habeat pro-
positam, è qua similitudinem du-
cens ipsum tibi emendatius red-
dat. Quod vt faciam inuitant cum
plurima, tam hæ præcipuè causæ,
ne calumniandi materiam plerif-
que relinquam si minime reco-
gnitum opus nullòque schemate

nouo commendatum haud aliter
quàm ignotam quandam aut exo-
ticam auem in publicum exire pa-
tiar quocunque produxerit auræ
vis aut fortunæ, tutoris fide non
interposita. Huc etiã impulit vti-
litis ratio, quòd hanc operam,
quæ rei huius gratia suscipitur, vt
tātus author intelligatur, plurimū
conducere videam omnibus qui
vitam suam sactam tectā ab omni
detrimento conseruare volunt, &
morbos, communes hominū ho-
stes, atq; adeo mortē ipsam auer-
santur. Est enim hoc vniuersæ me-
dicinæ quoddam veluti prōptua-
rium, vnde plura vel ad profligan-
dos morbos, vel ad tuendam pro-
pagandāque vitā, excerpere pos-
sis vtilia documenta, quàm ex aliis
omnibus qui suas hac de re com-
mentationes literis vnquàm man-
dauerunt. Hæc sentētiarum & ve-
lut oraculorum plusquàm Delphi-
corum lectio nulli hominū generi

aut

aut conditioni non est in primis
necessaria, nisi cui sanitas & huius
vitæ lux cōmunis non est omnino
curæ. Sit igitur hic vnus author
vice multorum tibi, ad quem te,
quandocunque de re medica di-
sputatio inciderit, referre possis,
quæ penitus notū habeas, quē-
que de omnibus his rebus quæ ad
vitæ & corporis vsum attinent tu-
to in consilium adhibeas. Multi-
tudo librorum te frustra non di-
strahat: vnus enim ingenio se ap-
plicet oportet qui velit trahere
quod in animo fideliter sedeat.
Nusquam est, vt ait Seneca, qui
vbique esse contendit: Qui in
omnibus chartis excutiendis ope-
ram consumit, nulli potissimum
inter alias addictus, ei similiter fa-
cere videtur qui duabus tellis in-
nixus vtraque frequenter exclusus
cadit. Quare si artes imitatio do-
cuit, si in disciplinis omnibus eli-
gendus est aliquis cuius nos simi-
les

les esse velimus, & summa animi
contentione effingamus, ad medi-
cinæ laudem aspirans hoc Hippo-
cratis vnū exēplar habe, ad quod
te ipse cōponas, cuius dicta, facta,
consiliâque omnia ob oculos po-
sita sic apud te deputes & obser-
ues, vt ad hæc cursum ipse tuum
non aliter quàm suum ad cynosu-
ram nautæ, siue quid in Theorice
dicendum demonstrādum ve fue-
rit, siue etiam in practice & artis
operibus attentandum, quocūque
licebit tempore, dirigere possis.
Extant quidem aliorum permulta
præclarâque de hac arte scripta
volumina: sed est quædam ex fon-
tib⁹ illa si possis haurire voluptas.
Gratius ex ipso fonte bibuntur
aquæ, Et magis adducto pomū de-
cerpere ramo, Quàm de cælata su-
mere lance iuuat. Si sint adhuc
quibus minime placeat immuta-
tus Hippocratis ordo, hoc à me ij
responsum ferât, prodesse cupien-
ti sa

ti satis esse, si quos adiuuare voluerim, aliquod ipsi commodum sentiant. Quis vnquam scripsit quod omnium iudicio comprobatū fuerit? aut aliquem momo locum non reliquerit? Id assequar quod ipse volui, & mei laboris fructum satis amplum accepisse videbor, si per eum nonnulli profecerint. Aliis ingredi liceat iter quodcunque censebitur esse melius. Non obfisto. Nec librum hunc offerenti mihi alios de manibus excutere fuit animus. Addidimus etiam Aphorismos græcè scriptos, ac latinis præposuimus, eundem sequuti ordinem. Fruere lector & vale. Andegavi decimo sexto Calend. Maij 1567.

Quoniam vita hominum angustis circumscripta terminis admonet preperandum esse ei qui excellens esse cupit in arte, cum magnitudo tanta est, ut ab homine quantum ru diligenti ac laborioso vix possit & inchoari & ad finem usq; perducī: Hippocrates, ut erat ad docendum non minus quàm ad discendum propensus (non enim est facile inuenire, qui quod ipse sciat non tradat alteri lubens) docuit quæ ratione & via compendiarie posset homo vitæ brevis artem longam ediscere, concinnatis videlicet Aphorismis & generalibus his præceptis, artem ipsam velut ex confusa caligine in claram lucem educentibus. Quod artium magistri facere solent etiam cum docent primas in vtraque lingua literas. Quod ipse Galenus effecit cum scripsit Isagogen pulsum, ubi coëgit in pauca capita quæ fusius antè scripserat de pulsibus. Idem fecit cum summam methodi contraxit in breues quosdam canones duobus libris ad Glauconem. Idem in arte medica cum videret medicinam latissimè fusam, eam totam ordine definitorio scripsit, & omnia quæ ad artem hanc attinent breuiter & ingeniore conclusit. Haud aliter Hippocrates multum annu antecedens Galenum, cum videret longam

inuenta & cognita medicinam, eam breuibus
his sententijs expressam dedit hominibus, quò
minore negotio ipsam in hoc velut enchiri-
dium collectam pauco quidem tempore conse-
querentur. Quo in scripti genere cum nullum
certum, sed nunc vnum, nunc alium atq; aliud
ordinem insequutus fuerit, ut se data quidem
occasione res in tanta diuersitate offerebant;
cumq; rationibus non obscuri intelligerem o-
mnia quæ fiunt quæq; dicuntur ordine ac mo-
do constare maximè, quinimo eam ob rem
mundum hunc vniuersum appellari cosmum
ab ordine, quòd in eo rectè cuncta disposita
sint: in medio enim Terra posita est, eam Mare
circunfluit, mare autem Aer continet, eum
Æther, deniq; Cælum ipsum his omnibus ob-
tentum est, in quo stellarum motus & orbium
quantum ostendant ordinem, vix animo per-
cipi nedum oratione explicari potest. Neq; verò
(ut res alio sit exemplo notior) quanquam
membris omnibus optimè formatu statua sit,
nisi collocentur ipsa, & artus etiam leuiter lo-
co moti, perdunt quo riguerunt vsum, & tur-
bati exercitus sibipsi sunt impedimento: ob id
Aphorismos secundum locos communes digessi,
non ut prouerbio locum darem, Hic telam te-
xuit, ille diduxit: neq; ut incudi redderem opus
omnibus partibus absolutissimum, cui, ut nihil
addi detrahiue potest, ita nihil adeò additum

nihilq; detractum est, quin ipsum sit omnino
quod erat prius: sed ut studiosos hac molestia
& labore vltro citroq; vagandi quarendive
quidq; ubiui alibi quam ibi ubi esse debebat,
leuarem. An rectè factum, huius rei iudicium
doctis deferro: Taceant alij, ne (quod plerisq;
blatteronibus accidit) id damnent quod non
intelligunt Fit enim serè ut optimè dictis gra-
tiam praua iudicia non referant.

Εἰς ἀφορισμοὺς ὑπὸ βαλίνης

Διὰ τὸν ἑαυτοῦ.

Εὐθὺς ἱπποκράτης ποιεῖ πυθίας οἷα σβύλλα
ζεῖνσι θεοῦ δ' ἡρώων σὺν θείῳ ἐξ ἀδύτων.

Πάντα δ' ἐξεῖναι ἀκρίβως θεύλατος ἢ φέροι οἶπρος
Λεῖψ' ἰσικ' ἐξεῖναι σὺν χροσὶς ἢ μετὰ ἀλῆ.

Νῦν δ' ἄρα βαλίνης τὴν κερσεπολογημένην ἀ-
συνέχως θείῳ σαφές ἐστιν μνηστῆρ. (Ἰατρικῶς
λα. αὐτοῦ.)

DE EODEM LATINE.

Enthem Hippocrates quondam ceu Pythia

Hac sacra cecipit pectoris ex adytis. (vates

Omnia sed cecinit confusa, sacer tulit illum

Quò furor, ut nullus sortibus ordo foret.

At nunc indigesta oracula digerit hic dum

Intimus, ratio est, quod furor ante fuit.

Catoli Vrsinhouy.



HIPPOCRATIS

L E X.

*

Medicina omnium artium clarissima est: verum propter ignorantiam eorum, qui eam exercent, & ob eos, qui de medicis iudicant, omnibus iam artibus longè postponitur. At verò eius erroris causa hæc videtur: Soli medicinæ nulla poena in ciuitatibus statuta est, præter quàm ignominia. Verum hæc nihil mouet eos, qui ex illa veluti sunt compositi ac facti. Simillimi enim huiusmodi medici sunt personis, quæ in Tragædiis inducuntur. Quemadmodum enim illi figuram quidem, habitum, ac personam eorum, quos referunt, habent, illi ipsi autem verè non sunt: sic & medici, fama quidem multi, opere autem valde pauci. Quisquis enim medicinæ scientiam sibi verè comparare volet, iis præditum & adiutum eniti oportet, Natura, Doctrina, Loco studiis apto, Institutione à puero, Industria, & Tempo.

Tempore. Primum quidē igitur omnium
Natura opus est. Natura enim re-ugnā-
te, irrita omnia fiunt. Si verò Natura ad
optima tanquam viæ dux sit, artis doctri-
na obtinetur: quam sanè cum prudentia
adquirere oportet: ita vt à puero Insti-
tutio accedat. Atque id in loco à Natura
ad disciplinam apto. Amplius autem &
Industriam adhibere oportet: eamque
ad multum omnino tempus, quo disci-
plina ipsa, veluti insita & ingenerata, pro-
sperè & copiosè fructus suos producat.
Qualis enim eorum, quæ terra gignun-
tur, consideratio est: eiusmodi etiam di-
sciplinæ medicinæ cognitio est. Natura
enim nostra velut ager est: dogmata præ-
ceptorum, velut semina suat. Institutioni
à puero cum eo conuenit, quòd oportu-
no tempore semina in terram cadūt. Lo-
cus autem, in quo ars docetur, est velut
circumfusus aër, qui nutrimentum præbet
satis ipsis. Industria autem cultura est.
Tempus postremum hæc omnia corro-
borat, vt omnia perfectè enutriantur. His
igitur ad artem medicam allatis, & vera
ipsius cognitione comparata, tandem in
varias vrbes commeandum, & non ser-
mone tantum, verum etiam opere, medi-
cos haberi conuenit. Imperitia sanè ma-
lus

lus Thesaurus est, malâque supellex. Et
somnia, & cî, qui rem apertè citra
somnia dispicit. Alacritatis, fiduciæ, ac
lætæ securitatis expers: timiditatisque &
audaciæ nutrix. Timiditas equidem in
exercendis operibus inscitiam: Audacia
verò ignorantiam artis declarat. Duo
enim sunt, scientia, & opinio, quarum
altera quidem sciētes efficit, altera igna-
ros. Cæterum res sacræ sacris homi-
nibus explicantur: profanis id
fas non est, priusquàm
scientiæ mysteris
initientur.



Prima, qui sunt de

*Secunda, qui locis
affectu conveniunt*

*Hoc opus Aphori-
smorum sex par-
tibus distinctum o-
mnes habet Apho-
rismos. Eos verò
continet pars*

Tertia, qui —

*Quarta, qui com-
petunt —*

Quinta qui —

Sexta qui —

{ Repletionē.
Evacuationē.

Capiti.

Cerebro & nervis.

Oculis.

Naribus.

Ori & linguae.

Dentibus.

Gutturis, & faucibus.

Thoracis, & pulmonibus.

Hypochondrijs, epigastrio, ventri.

Lateri.

Ventriculo, & cordi.

Intestinis.

Hepati.

Felli, & lieni.

Renibus, ano, vesica, ubi ratio tota de urina conspicitur.

Item qui mulierum locis conveniunt & virilibus locis.

Habitui corporis.

Aetati.

Temporibus.

{ Febris & quibusdam morbis criticis & acutis qui cum febris numerari queunt.

{ Locis externis convenientes ad Chirurgiam maximè attinent.

Numerus unicuique Aphorismo prepositus
 eius materie de qua est ordinem monstrat.
 Qui verò est ad finem Aphorismi positus, prior
 eum quotus est in ordine quem sequutus est
 Hippocrates significat, posterior librum.



HIPPOCRATIS

APHORISMORVM

PARS I.

*

PROOEMIUM.

Ingressus & totius veluti prooemium operis, in quo tacitè monet Hippocrates, vt in hac vitæ breuitate festinantes quàm maximo studio, viam incedamus compèdiosissimam, reiectis inutilibus iis quæ ad vsum minus esse necessaria videbuntur, si quam habeat ars longa molestiam, ea præceptionum breuitate & compendio sarciantur.

I.



Βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἡ δὲ πείρα σφαλερὴ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή. Δεῖ δὲ οὐ μόνον ἑαυτὸν παρέχεν τὰ δέοντα ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν νοσήσασιν ἐκ τούτων παρέχοντας, καὶ τὰ ἔξωθεν.

VITAE brevis, Ars verò longa, Occasio præceps, Experimētum periculosum, Iudicium difficile. Nec verò satis est, medicum suum fecisse officium, nisi suum quoq; ægrotus, suum astantes faciant, sintq; externa ritè comparata. I. I.

Ars longa est, si eam hominis vita metiamur: tam variarum enim rerum investigationem & cognitionem requirit, ut homo quantumvis diligens ac laboriosus) hanc & inchoare & ad finem usque perducere non possit, nisi processerit via doctrinae aphoristica, quæ omnes rei proprietates quam brevissimis verbis circumscribat. Propterea operæ precium est quæ quisque cognovit ea mandare literis & tradere posteritati commentationes, quæ rerum percipiendarum naturam omnem diligenter ac citò, & sermone dilucido interpretantur, ut qui volunt brevi tempore artem longam ediscant, nec difficultate rei exterriti auocentur, à proposito, nec præsumpta desperatione perueniendi quod volunt, animo statim initio despondeant. Quod autem ars longa sit, hæc etiam ostendunt, Occasio præcepti, quæ ob humani corporis defluxum assiduamque mutationem citò præterit: experimentum remedium medicorum periculosum, ob subiecti dignitatem: iudicium, quo quid faciendum sit inquirimus, difficile, ob sectas & varias in medicina opiniones. Intelligent autem quantum veritatis habeant omnia quæ in hoc libro scribuntur, imò nihil eorum falsum esse comperient, medicinam ita ut hic docti fuerint, faciētes: si à medico, egro, ministris, externis, nullus proficiatur error. Et hæc sponsio reddit auditorem attentorem

ad intelligendos aphorismos. Porrò cùm quatuor sint quæ ad actionem aliquam concurrunt, id à quo fit, sine quo non fieret, per quod fit melius, & per quod tria illa conservantur: Medicus est à quo fit actio, est enim principale instrumentum curationis. Aeger habet actionem eius sine quo non fieret actio. Assidentes & externa per quod fit melius. Vfus rectus remedium, per quod tria illa conservantur. Vfus autē rectus est usus per omnes aphorismos.

Aphorismi ad eam medicinæ partem attinentes, quæ est de victus ratione & repetitione.

I I .

Οὐ πλεονομήει λιμὸς οὐδ' ἄλλο ἔδει ἀγασθόν, ὅτι ἀρμᾶλλον τῆς φύσεως ἦ.

Non satietas, non fames, neq; aliud quicquam quod modum naturæ excelsit, bonum. 4. 2.

Cùm sanitas moderatio quædam sit & temperies, necesse est omnes excessus qui plurimum à modo recesserunt, iam aegritudines esse. Idem vult intelligi in sumendis, admoendis, faciendis, educendis omnibus, quæ si modum excedant (excessu notabili) mala putanda sunt. Labor, inquit, cibus, potus, somnus, Venus, omnia mediocria sunt. Epidemiorum 6.

III.

Ὅπου ἂν τροφή παρὰ φύσιν πλείων εἰσέλθῃ, τὴν νόσον ποιεῖ. Διηλοῖ ὃ καὶ ἡΐησις.

Vbi cibus præter naturam plus ingestus est, hic morbum facit, ostendit autem sanatio. 17. 1.

Plus cibi quàm natura modo conveniat, repletio nominatur: plus autem in corporibus duplex est, unum, quantum ad vasorum capacitatem, alterum, ad vires seu ad illam quæ nos gubernat naturam, de quo intelligens Hippocrates dixit excedentem cibum, id est, gravantem vires, esse præter naturam & morbum subinde generare: Nam cibo supra modum ingesto, vbi adhibita euacuatione egrotus lenabitur, argumento erit morbum ex cibi multitudine fuisse ortum. Euacuationem autem dicere consuevit Hippocrates, quando humores omnes equaliter vacuantur, quod potissimum fit vena sectione: purgationem autem, quando prava affecti qualitate educuntur medicamento proprio, quod humores peccantes solos natum est educere.

III.

Ἀπὸ πλησμονῆς ὁκόσα ἂν νοσήματα γίνονται κίνωσις. ἢται. καὶ ὁκόσα ὑπὸ κινώσεως πλησμονή. ἔτι ἄλλων ἢ ὑπὲρ κινώσεως.

Quicunq; morbi ex repletionem fiunt curantur

curat euacuatio, & quicumq; ex euacu-
tione repletio, & aliorum contrarie-
tas. 21. 2.

Quòd quidem multitudo morbum efficiat
antea dictum est: quòd autem euacuatio sit
eius curatio, cum id unicuiq; manifestum sit,
non est opus dicere, sicuti neq; de omnibus alijs
causis quæ morbos committunt, quod per con-
traria curentur.

V.

Εν τῶσι γυμνασικοῖσιν αἱ ἐπ' ἄκρον διεξίει
σφαλεραί· καὶ ἐν τῷ ἑκάτῳ ἴσονται· ὃ γὰρ δύναται
μᾶλλον ἐν τῷ αὐτῷ, ὅδε ἀτρεμίσθιν· ἐπεὶ ὃ σὺν
ἀτρεμίσθιν, ὅδε τι δύναται ἐπὶ τὸ βέλλον ἐπι-
διδόντα, λείπεται ἐπὶ τὸ χεῖρον· ταῦτα γὰρ ἐν ἐκ-
κιν τὴν διεξίειν λύει· συμφέρει μὴ βραδείας, ἵνα
πάλιν ἀρχῇ ἀναδρέψῃ· καὶ τὸ σῶμα μα-
κρὸν ἐκ τῆς ἐκκινώσεως ἐς τὸ ἑκατὸν ἄγει· σφαλε-
ρὸν γὰρ· ἀλλ' ὁκοῖται αἱ ἡ φύσις ἢ ὅτι μέλλοντος
ὑπομείνῃ, ἐς τὸ αὐτὸ ἄγει· καὶ αὐτὸς ὃ γὰρ αἱ
κινώσεις αἱ ἐς τὸ ἑκατὸν ἄγουσι, σφαλεραί καὶ
πάλιν αἱ ἀναδρέψεις αἱ ἐν τῷ ἑκάτῳ ἴσονται,
σφαλεραί.

Habitus Athletarum, qui summum bo-
nitatis attingunt, periculosi sive in extre-
mo constitierint, neq; enim in eodem pos-
sunt permanere neq; quiescere. Cum ve-
rò non quiescant & non possunt profi-
cere in melius, reliquum est ut decidant

in deterius. His de causis bonū habitum statim soluere expedit, ut corpus rursus nutriri incipiat. Neq; compressiones ad extremū ducendæ (periculosum enim:) sed qualis natura fuerit eius qui debet perferre, ad hoc ducere conuenit. Sic & euacuationes quæ ad extremum deducunt periculosæ. Et rursus refectiones, cum extremæ fuerint, periculosæ. §. 1.

Quod neq; euacuare neq; replere supra modum oporteat, documento esse potest Athletarū bonus habitus, qui alioqui inculpabilis existens, ut qui & bonis abundet humoribus & vires habeat robustas, hoc solum malum maximum gerit, quod ad extremam venit repletionem: hunc itaq; soluere nos oportet haudquaquam morantes, sed anticipantes solutione periculum. Causam verò ob quam soluere oporteat, talem ipse subiecit dicens: neq; enim possunt in eodem permanere neq; quiescere: nam cum semper natura collisionem, alimenti distributionem, sanguinis generationem, adiectionem, adglutinationem, atq; assimilationem operetur, quando nihil adycti solidis corporis partibus potest, neq; venæ amplius habent conceptaculum in quod alimentum distributum recipiatur: tunc periculum imminet aut diruptionis vasorum, aut suffocationis

in calorem naturalis & mortis repentine. Ve-
 igitur corpus rursus nutrirī possit, bonum ha-
 bitum oportet sine mora solvere. Eius autem
 solutio est euacuatio, & hanc quoq; oportet fa-
 cere non ultra modum, cum sit immodica eua-
 cuatio non minus periculosa quàm immodera-
 ta repletio. In euacuationibus enim non solum
 quid abundantia requirit attendendum est,
 sed quantum vires ferre possunt eius qui debet
 euacuari. Alij siquidem melius, alij minus bene
 ferūt euacuaciones. Porro nihil immodicū peri-
 culo vacat, siue sit in demēdo siue in addendo.

V I.

Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβεῖς διαίται, ἔν τῳσι μικ-
 ροῖσι ἀνὲ πάθει καὶ τῳσι ὀξέσιν, ἔμὴ ἐπιδέ-
 χεται, σφαλεραί. καὶ πάλιν αἱ ἐς τὸ ἔλαττον λε-
 πτότης ἀφιγμέναι διαίται, χαλεπαί καὶ γὰρ
 αἱ πληρώσεις αἱ ἐς τὸ ἔλαττον ἀφιγμέναι, χα-
 λεπαί.

Victus tenuis atque exquisitus in mor-
 bis quidem longis semper, in acutis ve-
 rò in quibus non conuenit, periculosus.
 Et rursus qui ad extremum deuenit te-
 nuitatis grauis est: Nam & repletiones
 quæ ad extremum deueniunt graues
 sunt. 4. 1.

Hic agit de victu agrotantium, ostendens

nobis in morbis longis semper periculosum esse victum tenuem, quod scilicet vires ipsas demolitur quas præstat tum fouere, tum integras, ut morbi diuturnitati pares esse queant, serua-
re. In acutis verò non semper esse periculosum. Competit enim in simpliciter acutis, quibus maximus vigor & indicatio primis diebus futura est: Non competit in acutis ex decidentia, qui possunt ad quadragesimum usque protrahi diem. Est autem victus in extremo tenuis, qui per solam inediam ad indicationem usque sic procedit: tenuissimus, per mellieratum: tenuis verò qui per pauca & parum nutrientia edulia fit, qualis est ptisana succus. Omnis talis victus vires quidem comminuit, sed adhibendus cum iudicio, eatenus ut non fiat exolutio virtutis & natura.

V I I.

Εἰ τῇσι λεπτοῖσι διαίτησιν ἀμαρτάνουσιν οἱ νοσέοντες, διὸ μᾶλλον βλάβη. πάντες γὰρ τὸ ἀμαρτάνειν ἂν γένηται, μέγα γίνεταί μᾶλλον, ἢ ἐν τῇσιν ὀλίγον ἀδρεγίηται διαίτησι. Διὰ τὸ καὶ τῇσιν ὑγιαίνουσι σφαλερά· αἱ πάντες λεπταὶ καὶ καθυστερηταὶ καὶ ἀκρεβέες διαίται, ὅτι τὰ ἀμαρτανόμικρα χαλεπώτερον φέρουσι. Διὰ τὸ ὅτι αἱ λεπταὶ καὶ ἀκρεβέες διαίται σφαλερά· ἐς τὰ πλεῖστα τὸ μικρὸν ἀδρεγίηται.

In tenui victu ægri delinquant, quo
fit ut

fit ut magis lædantur. Quicumque enim error committitur magnus, maior in hoc fit quam in paulò pleniore victu. Propterea etiam sanis periculosus existit valde exquisitus victus & constitutus, quoniam errores grauius ferunt. Ob hoc igitur tenuis victus atque admodum exquisitus magna ex parte periculosior est eo qui paulò plenior. §. I.

Quicumq; error accidit agrotantibus qui tenui victu reguntur, hic maximū affert periculum: & quia natura à tali victu debilitatur, & quia transitus ad eum est insuetus. virium autem iam imbecillium reliquias facillè deiecit quicumq; supervenerit error. Hippocrates in lib. de ratione victus tenuiorem victum ratione viventibus meliorem pradicat, & re vera laudabilior est plenior, præsertim in acutis; idem verò hic periculosiorem ait, sed delinquentibus. Quemadmodum enim (si modò prophana sacrū conferre licet) qui legem acceperunt, aut religione distringuntur, hi gravius est delictum si peccare cōtingat, quam aut religione soluti, aut legis expertibus: sed tamen lex mala, aut religio periculosior non est censenda: Sic tenuior vivendi ratio, licet hac exquisitè viventibus gravius sit delictum cū erraverint, non tamen idcirco peior

plenior

pleniorè indicatur.

VIII.

Ες δὲ τὰ ἰσχυρὰ ναυτήματα, αἱ ἰσχυραὶ θεραπεῖαι ἐς ἀκριβοῦς, καὶ ἰσχυραί.

Extremis morbis extrema exquisitè remedia optima sunt. 6. 1.

Extremos morbos nominavit Hippocrates summos, ultra quos non sunt alij. Quare precipit in ipsis fieri exquisitissimam curationem, & victum adhiberi tenuissimum.

IX.

Ὅκε μὲν βίη καὶ ἐξὸ τοῦ νόσημα, ἀνέκτα ἴσως ἰσχυρὸς πόσις ἔχει, καὶ τῇ ἰσχυρῇ λεπιοτάτῃ διήκτῃ ἀναγκαῖον χρῆσθαι ὅκου ᾧ μὴ, ἀλλ' ἐπιδίχεται ἀδρστέρως διατῆναι τοσοῦτοι ὑποκαταβάινῃ, ἐπέσει ἂν ἵστος μαλθακώτερον τῷ ἰσχυρῶν ἤ.

Vbi morbus peracutus est, statim extremos habet labores, & extremè tenuissimo victu utendū est: vbi verò non, sed pleniorè victum contingit adhibere, tantū cibi indulgendum est, quanto morbus extremis est mollior. 7. 1.

Peracutus est morbus qui statim circa primos dies in summo vigore consistit. Porro in morbi

morbi vigore tenuissimo victu vtendum est: Nam si propter inflammationes vel febres, quæ à morbo acutis vix unquam separantur, abstinendum est, hoc ipsum (morbo in suo vigore consistente) magis est faciendum, ne si liberalior victus indulgeatur, natura, quæ contra morbum pugnabat, eo relicto, ad coctionem cibi se conuertat. In alijs morbis qui tardius in vigore sunt futuri, tantum à victus tenuitate declinandum est, quantum morbi ab extremis recedunt.

X.

Ὅταν ὁ ἀκμᾶς τῆ νόσου, τότε καὶ τῇ λεπτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκάζει χεῖρα.

Quando morbus in suo vigore consistit, tunc victu tenuissimo vtendum est. 8. 1.

Hæc sententia similis est præcedenti: nisi quòd generalior extendi posse videatur ad omnes morbos, quorum in vigore tenuissimo victu vtendum est.

XI.

Συντακμαίεται ὁ χεὶρ καὶ τὸ νοσίουται ἐξ ἀκμῆς τῇ διαίτῃ πρὸς τὴν ἀκμὴν τῆ νόσου καὶ πόντον ἐκείνος ἀπαυδῆος πρῶτος, καὶ ἐκ ἐξ ἀκμῆς τῇ διαίτῃ ἢ ἡ νόσος πρῶτος ἀπαυδῆος καὶ ἀμβλυώται.

Con

Cōiectari oportet an æger sufficiat cū victu perdurare, donec morbus cōsistat, & nunquid prius ille deficiat nec possit cum victu perdurare, vel morbus antea deficiat atq; hebescat. 9. 1.

Bona medicina pars est coniecturalis. Totam victus rationem igitur non solum morbi tempore, de quo superius dictum est, abstinendum esse in vigore, sed etiam agrotantis virtute metiemur: quæ si imbecillior fuerit, adiiciendum aliquid victui, & tantò plenior est adhibendus quantò plenior natura imbecillior exposulat. Quocirca etiam in ipso morbi vigore, ubi aliquis casus intervenierit robur nature dissoluens, nutrire aliquando cogimur.

X I I.

Ὁκόσοις μὲν ἂν αὐτίκα ἡ ἀκμὴ, αὐτίκα λαπῶς διαγῶν. ὁκόσοις δὲ ἴς ὕπερ ἡ ἀκμὴ, ἴς ἐκείνο καὶ πρὸς ἐκείνου μικρὸν ἀφαιρετίον ἴμωσθαι δὲν δὲ πικρίως διαγῶν, ὡς ἂν ἐξαρκίῃ ὁ νοσίων.

Quibus igitur statim morbus consistit, iis statim tenuis victus adhibendus est, quibus verò posterius debet consistere, iis & in ipso consistendi tempore, & parum ante illud, eibus subtrahendus: Prius verò vberius agendū ut æger sufficiat. 10. 1.

ciat. 10. 1.

Sermo hic vniuersalis est de omnibus mor-
bi pronuntians, in quibus dum vigor adest,
tenuis conuenit victus. Verum longe antè
tempus vigoris erit alēdus ager, vt imminen-
tem morbi tempestatem ferat potentius cibo
pleniore firmatus.

ΧΙΙΙ.

Εν τοῖσι παροξυσμοῖσι ὑποσίλλια χρῆται
προσθεῖται γὰρ βλάβη. καὶ ὁκίσα καὶ περιόδους
παροξύνεται, ἐν τοῖσι παροξυσμοῖσι ὑποσίλ-
λια χρῆται.

In accessionibus abstinere oportet,
nam cibum dare nocuum est, & quibus
per circuitum fiunt accessiones, in ipsa
accessione abstinere oportet. 11. 1.

Cibandi consilia petenda sunt à tempore
& à viribus aegri: itaq; cum precipit in acces-
sionibus abstinendum esse, ne cibus oblatus
distrahat naturam quæ circa morbi materiam
tum est occupata, intelligit si per vires id per-
mittatur & naturam aegrotantis.

ΧΙΙΙΙ.

Τὸς δὲ παροξυσμοῖς καὶ τὰς κατὰσάσεις δη-
λώσκειν αἱ ἡμέραι, καὶ αἱ ὥραι τῆ ἵπτος, καὶ αἱ τῆ
περιόδου πρὸς ἀλλήλας ἀντιπιδόσεις, ἢ τε
καὶ

καθ' ἡμέραν, ἢν τε παρ' ἡμέραν, ἢν τε καὶ ἀφ' ὀψέων. ὅς χρόνος γίνονται αὐτὰ καὶ τρισὶν ἐπιφανομέροισιν, οἷον ἐν πλεονεξίᾳ πύελον, ἢν αὐτὴν ἐπιφαίνεται ἀρχομένη, βραχύνει. ἢν δ' ὕστερον ἐπιφαίνεται, μακύνει. καὶ ἕρα, ἐν ὑποχωρήματα, καὶ ἰδρωῖσι, καὶ ὄρεται, καὶ δύσκειται, ἐν βραχύνει, καὶ μακύνει τὰ νοσήματα, ἐπιφανόμενα δὴλοι.

Accessiones autem & constitutiones morbi indicabunt, & anni tempora, & circuituum successiva incrementa, siue quotidie, siue alternis diebus, siue per maiora fiant interualla. Sed ex iis quæ mox apparent, indicia sumuntur, quemadmodum in morbo laterali si circa initia statim spiritum appareat, breuiat morbum: Si verò postea appareat, producit. Et urinae & alui excrementa & sudores, quæcunq; apparuerint, vel bonam morborum indicationem vel malam, vel breues aut longos fore morbos ostendunt.

12.1.

Cum victus instituenti ratio sumatur vel à viribus ægri, vel à morbo ipso seu morbi constitutione, vel à particularibus accessionibus, vires imprimis cognoscende sunt: cognoscuntur autem ex pulsibus & ex iis notis quas describit Hippocrates in Prasagijs. Accessiones

ε

Et constitutiones morbus ipse indicabit. Nam si tertiana fuerit, per tertium accessio fiet: si verò quotidiana, singulis diebus: at si quartana, per quartam. Animadvertere si morbus est acutus vel peracutus vel longus, Et quando maximè in vigore consistet, nihil aliud est quàm morbi constitutionem considerare. Item anni tempora indicabunt easdem constitutiones Et accessiones: Nam Aestas addit celeritatem: Hyems tarditatem, ita ut aestiva quartana magna ex parte breves sint: Autumnales Et quæ magis hyemem attingunt, longæ. Circuituum etiam incrementa, hoc est accessionum quæ fiunt in circuitibus incrementa, siue quotidie siue alternis diebus siue longiore tempore fiant, constitutiones indicabunt. Hæc sicut ætas, natura, consuetudo, industria, regio, Et æris ambientis quæ tunc vagatur, temperatura constitutionem morbi declarat, an ipse sit peracutus, an longus Et chronicus: Et declarant ipsas accessiones, an per tertium, vel per quartum, vel singulis diebus, siue qua hora diei aut noctis sint inuasuræ. Hæc autem ed pertinent, ut secundum vires, morbi constitutionem Et accessiones particulares, recta victus ratio prescribatur. Morbi etiam continuatio, brevisne futurus sit an longus coniectabatur ex iis quæ post apparent ac superveniunt: cuiusmodi sunt in morbo castali sputum, urina, alui excrementa,

menta, sudores. Quod planum fit exemplo laborantis ex pleuritide Anaxionis, de quo satis multa verba Galenus in commentario facit. Quantò enim citius apparent quæ excernuntur coëla in pleuritide, tantò breuior sperari debet morbus: Quantò verò tardius, tantò longior.

IX.

Γέροντες διφοράτα καὶ σίλω φέρουσιν, ὅτι περὶ οἱ καθιςθεότες, ἡκιστα μέγιστα, πάντων ἢ μάλιστα παύδια. τυτίων ἢ αὐτίων ἀπὸς ἀντυχῆ αὐτὰ ἰωντῶν. ἀεθυρότερον ἰόντα.

Senes facillimè ieiunium ferunt, secundo loco qui etatem cōsistentem habent, minus adolescentes, omnium minimè pueri, præsertim qui inter ipsos sunt viuidiores. 13. 1.

Aetatum differentia confert etiam ad constituendam victus rationem, nam indicatione sumpta ab hominis etate senibus instituendus est victus tenuis etiam in morbo, quia facillè ieiunium ferunt, ij præsertim qui sunt in principio senilis etatis: Nam extremè senes tale quid patiuntur quale lucernis penè extinctis accidit, quæ continuam exigunt olei suffectionem, multam autem & subitam simul nequeunt sustinere. Pueri verò largior victus.

viſtus indulgetur , quia plurimum cibū confi-
ciunt propter abundantem in eis calorem na-
turalem. Media etates inter ſenes & pueros
quantò propinquiores hiſ aut illis exiſtent,
tantò minus aut magis offenduntur ex longi
inediis.

XVI.

Τὰ αὐξανόμενα , πλείστον ἔχθ τὸ ἔμφυτον
θερμόν. πλείους ἔν δέ τ' τροφῆς. εἰ δ' μὴ, τὸ σῶ-
μα ἀναλίσκει. Γέρουσι δὲ ὀλίγον τὸ θερμόν.
Διὰ τοῦτο ἄρα ὀλίγων ὑπεκκαυμάτων δύνανται,
ἰσὺ πολλῶν γὰρ ἀποσβέννυνται. Διὰ τοῦτο καὶ οἱ
πυρετοὶ τοῖσι γέρονσι οὐχ ὁμοίως ὀξείας , ψυ-
χρόν γὰρ τὸ σῶμα.

Qui crescunt plurimum habent cali-
di innati , plurimo igitur egent alimen-
to, alioqui corpus absumitur. Senibus
verò parum calidi innati inest, propter-
ea paucis alimentis egent, quia à multis
extinguitur. Hanc etiam ob causam fe-
bres senibus non similiter acutæ sunt,
frigidum enim est eorum corpus. 14. 1.

Cùm tota moles animalium in perpetuo
fluore sit , ni similis altera substantia pro ea
quæ defluxit restituta sit, evaporabitur certè
atq; dissipabitur vniuersa. Quo factum arbi-
tror vt natura non animalibus modo, verum-

etiam stirpibus insitas quasdam vires deficientis ac desiderati semper appetentes statim ab initio dederit, tantò profectò magis aut minus intensas quanto maior minòr ve fieret iste fluor in unoquoque animali. Proinde cum ex humida & aëria substantia puerorum, eorumq; qui crescunt, plurimum cōtinenter dissipatur, ob innati caloris in eis abundantem substantiam, qui potenter cibos conficit, sit ut pluribus egeant alimentu. Senes autem, quia paucus sit fluor substantia illorum, quæ iam sicca est & terrestris, nec facile resolubilis, & quia paucus ille calor senilis opprimitur multu & extinguitur, ideo frugaliter & parcè refici debent. Eadem ex causa subinfertur, febres acute non tam facile contingunt senibus quàm iunioribus: multum enim calidum promptè in immensum attollitur, paucum verò non facile. Accenditur autem febris ob innati caloris conversionem ad igneam naturam: verum tantam senibus evenire conversionē, ut æqua sit ei quæ iunioribus accidit, vix fieri potest: nam corpora senum frigida, puerorum calida sunt.

XVII.

Αἱ κατὰ τὴν χεῖρα καὶ τὴν ἡγρὸς θερμότητες φέρονται, ὅτι οὗτοι μακρότεροι. ἐν ταύταις οὐ τῆσαι ὄντοι καὶ τὰ πρὸς τὰς πόδας ὁρμητικώτεροι. καὶ ὅτι τὸ ἐμφυρὶ θερμὸν πλεονέχον. περὶ τῆς

ἐκ πλείονος διορταῖ. σημεῖον, αἱ ἡλικίαι, καὶ οἱ ἀθληταί.

Ventres Hyeme & Vere natura calidissimi sunt, & somni longissimi: quare per ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda. etenim tunc calor innatus plurimus est, unde & pluribus egent alimentis: indicio sunt ætates & athletæ. 15. 1.

Non parum etiam conducunt ad victus rationem inveniendam anni tempora: nam hyberno tempore cum plus appetant homines, & cibum facilius concoquant, quam æstivo, plus etiam exhibendum est. ventres enim, hoc est, capacitates omnes & internæ partes, ventriculus, venæ, arteriæ, cordis sinus, Hyeme & Vere calidissimi sunt calore naturali. Nam ob circumstantem extrinsecus frigiditatem se recipit interdò calor, sicut Aestate ad sibi affinem protenditur, atq; ita contingit dissolui quidem ac dissipari eius substantiam tempore æstivo: contineri ac cohiberi & in profundum secedere hyemali. Ob hoc igitur, et quia ibi inclusus, & quia tum plurimus est, idcirco cibi appetentiam intendit, coctiones auget, & plus sanguinis cumulat, & crassius efficit corpus, & ut superfluitates excernantur providentiam habet: hic enim est omnium operationum natura.

lium autor & causa. Accidit & his temporibus somnos fieri longissimos ob noctium longitudinem, quod & ipsum multum confert ad coctiones, nutritiones, & cetera naturae opera. Quod verò plurimum alimentum sit necessarium ubi calidum abundat, argumento sunt pueri, qui quia calidum plurimum habent, idcirco & pluribus egent, & plura concoquunt. Athleta verò quia exercitijs augent calorem nativum, ob id etiam multis frui possunt alimentis.

XVIII.

Ἄν ὕδατος διαίτης πᾶσι τοῖσι πυρεταῖσι συμφέρουσι, μάλιστα δὲ παῖδ' ἰοῖσι, καὶ τοῖσιν ἄλλοις τοῖσιν ὅπως εἰσιμέντοις διαγινᾶσθαι.

Victus humidus febricitantibus omnibus confert, maximè verò pueris & iis qui tali victu uti consueverunt.

16. 1.

Haftenus de quantitate, nunc de qualitate victus agit tam egrorum quàm sanorum: nam feбри, quoniam calida & sicca est passio (est enim conuersio naturae caliditatis ad igneam) victum humidum consulit, indicatione sumpta ab eo quod dicitur, contraria cōtrariorum esse remedia. Humidioribus verò naturis, siue propter aetatem, siue propter consuetudinem,

non

non contrariam, sed magis affinem seruandam statuit : naturam enim eorum fouere debemus per humida, non eodem quo morbos modo demoliri, semper in memoria habentes quòd vitium sanorum indicationes in ijs quidē quæ præter naturam sunt, contrarias, in ijs autem quæ sunt secundum naturam, similes facere oporteat. Sed in ægri si complicantur affectus, ita vt simul sit hydropisis & febris, quia indicatione sumpta à morbis ipsis calida & sicca vni, frigida & humida alteri debentur remedia, id id festinandum est quod magis urget, altero non omnino posthabito aut neglecto. Sed, cū essentia febris sit in calore præter naturā, magis quàm in siccitate, cur vnus contrarij tantum, id est, humidi meminit, prætermittens omnino alterum. i. frigidum? Dic ipsum id fecisse studio breuitatis, aut vnus tantum humidi meminisse, vt suum Aphorismum pluribus communem faceret: Sermo enim institutus est tam de febrientibus quàm de sanis. Item alia causa est quòd intemperaturarum omnium pessima est siccitas & curatio difficilissima, & ne talis intemperies, quæ ferè inemendabilis est, inualescat, eam oppugnat suo contrario. Præterea humidorum vsus est tutissimus, ergo tutissimè huiusmodi pestem ita corrigit: mors enim nihil est aliud quàm calidi & humidi defectus. Item calor in subiecto sicco euadit

dit acrior, febricitantis autem corpus calidum & siccum est, hanc acrimoniam calori, humiditate obtundit. Postremo solius humidi non frigidi meminit, quod frigidorum usus periculosissimus est, ut docetur in libro methodi medendi.

XIX.

Καὶ οἷον ἀπαξ, ἢ δις, ἐ τολεῖν, ἢ ἐλάττω, ἐ καὶ μίγος. ὁδότερον δὲ π ἐ τῇ ἀγῇ, ἐ τῇ χάρῃ, καὶ τῇ ἡλικίᾳ, καὶ τῷ ἔθει.

Et quibus semel aut bis, & quibus plura ne an pauciora particulatim oporteat offerre, considerandum. Condonandum autem aliquid ætati, regioni, tempori, & consuetudini. 17. 1.

De quantitate & qualitate dictum superius, nunc de modo offerendi dicitur. Non enim satis est cognoscere quod huic tenuis vel plenus, illi conveniat humectans vel siccans vietus, sed nunquid semel aut sæpius, plura aut pauciora singulis partibus offerri debeant, intelligendum. Nimirum ex viribus ægri & dispositione eius qui est robustus vel imbecillus, plethoricus vel exsuccus, intelligetur quàm multum & quàm parum, quàm frequens & quàm raram alimentum institui debeat. Robustus & exsuccus eget multo, quia valet concoquere

coquere multum, & frequente, ut quod habet diminutum resarciatur. Imbecillus & plethoricus eget paucis & raro. Si cum imbecillitate sit humorum defectus vel corruptio, parum & saepius offeremus: parum quidem, quia vires imbecillae multum non sustinent: saepius autem, quoniam defectus exigit adiectionem, corruptio verò contemperamentum. Sic quidem oportet & à morbo & à viribus aegrotantis ad ea quae proposuimus sumere indicationes. Quae in re magnam etiam momentum habet tempus, aetas, & consuetudo.

XX.

Είςτος ἔ φθινόπωρον σιλία διαπορεύεται
φίπτοι, χυμῶτος πίνω, ἄγος δ' ὀύπερον.

Aestate & Autumno cibos difficillimè ferunt, Hyeme facillimè, secundum locum Ver habet. 18. 1.

Superius in eo Aphorismo, Ventres Hyeme &c. quantum offerri debeat, nunc quomodo offerendum sit indicatione sumpta à tempore ostendit. Quapropter Hyeme quidem raro & plurimum cibi cōcedit, quoniam tunc inest plus innati caloris: Aestate verò frequentius & parum singulo quoque pastu propter diminutionem eiusdem caloris, cuius officium est coquendi ac consistiendi cibos. Reliqua verò

duo tempora, Autumno quidem Aestatem
subsequitur, Ver Hyemem.

X X I.

Τοῖσιν ἐν τῇσι περιόδῳσι παροξυνόμενοισι
μηδ' ἐν διδόνει, μηδ' ἀναγκάζειν, ἀλλ' ἀφαιρέειν
τῶν προδιόσων ὡς τῶν κρίσειν.

Iis qui per circuitus accessiones ha-
bent, nihil dare oportet, neq; cogere, sed
subtrahere adiectioni ante indicatio-
nes. 19. 1.

Ex ipsis etiam accessionibus quæ per cir-
citus, hoc est per certum ordinem & seriem
temporis redeunt, discendum est quomodo ci-
bus offerri debeat agrotantibus. Nihil enim
sibi vel potus exhibendum in accessione, nec
nisi longè ante accessionem, ne cum natura to-
ta est in concoquendo morbo, ad conficiendos
cibos remaneat.

X X I I.

Τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ λεπυνόμενα σώματα,
ὡς ὧς ἱπαναίρει φθὴν δεῖ τὰ ἔν ἐν ὀλίγῳ, ὀλίγως.

Quæ longo tempore extenuata sunt
corpora, lentè reficere oportet, quæ verò
breui breuiter. 7. 2.

Cum solida substantia nisi longo tempore
extenuari

extenuari non possit, longo etiam tempore eget
ut reficiatur: humida non tanto tempore eget:
Spirituosa omnium minimo.

I X I I I .

Εἰ ἐκ νόσου τρεφὴν λαμβάνων τις, μὴ
ἰσχύη, σημαίνει ὅτι πλείονι τρεφῇ τὸ σῶμα χρε-
ταί. ἢ ὅ τρεφὴν μὴ λαμβάνοντες τὸ το γίνεσθαι,
χρὲ εἶδέναι, ὅτι κινῶσιος δέεται.

Si à morbo cibum assumens quis nō
corroboratur, pluri alimento corpus uti
significatur: quòd si non assumenti ci-
bū hoc accidat, scire oportet quòd indi-
get euacuatione. 3. 2.

Qui post morbi solutionem abundans ali-
mentum sumentes cum appetitu, non possunt
vires salubres recuperare, copiosiore utuntur
quàm pro ratione & quàm vires possint con-
ficere, unde ex eo gravantur & non nutriun-
tur. Qui verò nec appetunt, nec quod satis est
assumere possunt, vitiosos humores habent,
quos nisi euacuauerint, aut missione sangui-
nis, si corpus est plethoricū, aut deiectione pur-
gante, si cacochymum, fieri non potest ut sa-
nitati restituantur. Hippocrates enim quando
proportionē inuicem seruata humores omnes
augentur, aut alio modo peccant, missione san-
guinis auxiliatur: Vbi verò vnus aliquis su-
perabundat

perabundat, aut vitiosè se habet, purgatorium dat medicamen.

XXIII.

Τὰ μὴ καθαρὰ τῶν σωμάτων, ὅσοις ἂν θρέψῃς, μᾶλλον βλάπτεις.

Non pura corpora quantò plus nutries tantò magis lædes. 10. 2.

Impura corpora, in quibus sunt aliqua reliquia humoris corrupti per morbū, offenduntur alimento cacochymia familiari, ut si pituitosum pituitosis, biliosum biliosis, &c. detur. Corruptitur enim alimentum adueniēs corpori malos humores habenti. Nutries dixit, pro eo quod est largiore cibo implebis, nam nutritio propriè dicta, vacuati est repletio & perfecta assimilatio, quæ tum non fit cùm leduntur corpora nutrimento. Sunt ergo paulatim purganda, ac in purgati locum substituendus bonus cibus, sed paucus.

XXV.

Ἡσυχον πλεονεξῆσθαι ποτοῦ, ἢ σίτου.

Facilius est impleri potu quàm cibo.

11. 2.

Eiusdem sententia est in libello de alimento: Quicumque indigent citissima adiectione, humidum

humidum remedium ad recuperandas vires optimum est: vbi verò adhuc celeriore egent, per odores reficiuntur. Nam humida si non ita nutriunt: vt solidiora, superant tamen nutriendi celeritate, quoniam humidum vt facilius alteratur, ita promptius quoq; distribuitur.

X X V I .

Τῶν τετραπότων ἀνθρώπων καὶ τεχνῶν, τεχνῶν καὶ ἀγχορῶντες γίνονται.

Eorum quæ vniuersim & velociter nutriunt veloces quoque fiunt excretiones. 18. 1.

Omnia quæ paruo post assumptionem tempore & velociter nutriunt, velocem etiam habent excretionem: sed quæ contrariam naturam habent, ea tardè excernuntur. Nam vna quæq; pars proprium sibi ex cibis alimentum nata est atrahere & sibi apponere: mox vbi fuerit saturata, tunc ipsos emittere ad excretionem. Siquidem vbi id completum est cuius gratia retentrix facultas erat, vsui, succedit expultrix, quæ quod reliquū est expellit foras.

X X V I I .

Λιμὸν δύνειξεν λίαν.

Famem vini potio soluit. 21. 1.

Fames non omnis, sed vehemens, implacata ciborum

ciborum appetentia, dicta canina fames, solum continuum oris ventriculi ab intemperie frigida, hac meri potu soluitur. Vinum enim generosum (si præsertim post edulia pinguia offeritur) innatas, quia longiore tactu calfacit, emendat intemperiem illam frigidam, unde famem excitat am sedat.

XXVIII.

Τὸ ἐξ ἀσθενείας δυσίκανον μηδὲν ἐπιδιδόναι τὸ σῶμα, μοχθηρόν.

Eius qui ex ægitudine benè cibatur, nihil proficere corpus, malum. 31. 2.

Quod corpus eius qui à morbo cibum capit, non proficit nec euadit carnosum, vegetum, floridum, hoc fit ex facultatis imbecillitate, vel ex malorum humorum superabundantia.

XXIX.

Ὡς τὰ πολλὰ πάντες οἱ φασίως ἔχοντες, κατ' ἀρχὰς μὲν δυσίκανοντες, ἔπειτα μηδὲν ἐπιδιδόντες, ὥστε τὴν πέλιν πάλιν ἀσπένουσιν· οἱ δὲ κατ' ἀρχὰς μὲν ἀσπένοντες ἰσχυρῶς, ὕστερον δὲ δυσπένοντες, βίαν ἀπεκιδνάσκουσιν.

Omnes ferè qui malè se habent circa initia cupidè comedentes, nec quicquam proficiētes, ad postremum rursus cibum non appetunt: qui verò circa initia cibum

bum valde fastidiunt, postea benè appetentes, ij in melius euadunt. 32. 2.

Quidam soluti morbo benè appetunt, qui si corroborantur, bonum : sin minus, vel facultas nutrix imbecilla est, vel abundant humores moxj, vel plenius quàm pro natura modo cibantur. Quidam non appetunt, quia natura longa pugna fatigata, quiete gaudet magis quàm alimento : Quod ex longo itinere fessis usu venit, paulatim tamen comedentes corroborantur & reualescunt. Quòd si perseueret deiecta appetentia, significantur reliquiae humorum vacuandorum.

I X X.

Ἐν πύσιν νόσῳ τὸ ἰσχυρὸν τὴν ἀγρίαν, καὶ δὲ ἰσχυρὸς πρὸς τὰς ἀποφορὰς, ἀλὰ τὸ τὸ ἴδιον, καὶ τὸν.

In quonis morbo mente constare & benè se habere ad illa quæ offeruntur, bonum : contrà verò se habere, malum.

33. 2.

Ex constantia menti significantur omnia sana esse quæ circa cerebrum sunt, sicut ex promptitudine quadam ad ea quæ offeruntur coniectura fit de ijs quæ ad ventrem attinent & hepar & cor. Sic se res habet : In ijs omnibus in quibus ager parum recessit à consuetudine

dine naturali per morbum, siue in apprehensione & ratiocinatione, siue in appetitu cibi, in colore, vigore, siue in alijs omnibus consuetis, melius est, quam si multum fiat recessus. Omnes enim morbi iudicantur quanti sint aut quales ex recessu à natura.

XXXI.

Τὸ σμικρὸν χεῖρον, καὶ πόρος καὶ σίτον, ἥδιον δὲ, τῷ βελτιόνει μὲν, ἀποδείξεται, ὅ, μᾶλλον αἰρετίον.

Parum deterior potus aut cibus, suauior autem, melioribus quidem sed minus suauibus, est præferendus. 38. 2.

Hæc sententia vera est, non in cibo tantum & potu, sed omnibus sumendis, admonendis, faciendis, educendis: vt. medicus gratificetur agro in eo in quo delectatur & cui consuevit, modò ne multum recedatur ab eo quod secundum rationem faciendum est. Nam quæ cum voluptate sumuntur, ea ventriculus amplectatur auidius & magis concoquit: sicut illa quæ displicent refugit, vnde nausea, flatus & fluctuationes subsequuntur.

XXXII.

Οἱ αἰδιομαρταὶ τὰς σμικρὰς πόρους φέρει, καὶ ὥσπερ ἀδινέας ἢ χέροντες, τὸ ἀσυνήθειον ἰσχυρῶς καὶ ἵστανται φέροντες.

Qui

Qui consueti labores solitos ferre, et si inualidi sunt aut senes, facilius ferunt quàm qui non sunt assueti, quamvis robusti & iuuenes. 49. 1.

Magna vis est consuetudinis: nihil enim ubiq; tam difficile est & arduum, quod in familiaritatem non perducatur assidua meditatio. Vnde fit ut alij terram fodiant aut arent, alij remigent, & facilius & incundius, q̃ videlicet quibus id saepe usu venit. Nam exercitio robur, & cōsuetudine voluptas ad agendū acquiritur. Quod Poëta significauit: Quod male fers, assuesce, feres benè: cuncta vetustas lenit.

XXXIII.

Τὸ ἐν πάλλει χρόνον συνήθεια, καὶ ἡ χειρῶν, ἥ ἀσυνήθεια ὅσον ἐνοχλεῖν εἶασι. δὲ οὐδ' ἔστι τὰ ἀσυνήθεια μετὰ πάλλει.

Quæ longo tempore assueta sunt, etiam si deteriora sunt, minus iis quæ insueta sunt molestare consueuerunt: Conuenit igitur etiam ad insueta permutari. 50. 2.

Hic aphorismus de consuetu omnibus enunciat sumendis, admouendis, faciendis, educendis, quorum singula etsi mala sunt, minus tamen nocent quàm ea quæ natura quidem non eque noxia, sed nunquàm in consuetudinem.

nem perueniunt. Verùm quoniam mutanda consuetudinis incidere potest necessitas, & natura non sustinet repentinam mutationem absq; poxa, prouidendum ne repenti dissecemus mala consueeta, sed dissuamus insuetu paulatim assuescentes.

XXIII I.

Οκόσοις ὃ πλεῖν ὀρεῖταις νόσῳ, ᾗσι πάντο
διψῶσιν ἢ ἐπικοιμηθῶσιν, ἀγαθόν.

Qui bibere appetunt, iis admodum sitientibus si superdormierint, bonũ. 27. 5.

Noctu valdè sitientibus siue ex potatione vini meracioris, siue ex penuria humidi & frigidi sitis aduenerit, potus est dandus : Nam & defectui succurrere confert, & illam qua facta ex vino est caliditatem, aqua restinguere theorema est medicum. Si verò non biberint parum sitientes & superdormierint, bonum, quia per somnum fit humectatio, & id quod sitim efficit coquitur calore ad interna recepto subdescenditq;.

XXIV.

Επὶ νόσῳ πολυχρονίῃ ἀποσιὴ καὶ ἀκρηγία
ὑποχωρήσεις, κακόν.

In morbo diuturno fastidium cibi & deiectiones syncerae, malum. 6. 7.

Fasti

Fastidium cibi in morbis longis facultatis imbecillitatem ostendit, quæ quia ad finem morbi durare vix potest, periculosum est valde ne antè succumbat ager quàm possit adiuvari, præsertim vbi sincera deiectiones extiterint nulli aquosa humiditati permixta. Nam deiectiones huiusmodi, quæ sunt vniui cuiuspiam humoris solius, siue is picrocholicus sit, siue melancholicus, siue porraceus, siue bilis æruginea dicta, nativam omnem humiditatem exustam esse à calore febrili demonstrant.

I X X V I.

Ex πολυποσίῃς ῥίγος καὶ παραφροσύνη, κακόν..

Ex multa potatione rigor & desipientia, malum. 7. 7.

Quod aliqui ex vini potatione desipiant, sanguine feruente & spiritu calido caput opplentibus, id vnicuique manifestum est: Sed quod aliqui sint qui etiam cum desipientia rigeant, id rarius, & maiori cuiusdam mali indicium est. Nam tantum abest vt multitudine vini calor nativus augeatur, vt etiam, sicuti lucernæ flammæ oleo vniuersim superinfuso, prorsus extinguatur.

I X X V I I.

Ἀλύκη, χάσμη, φρίκη, ὅπως ἴσως ἴσῃ πνέ-
ρμος, λόφ τὴν νῆσοι.

Anxietudinem, oscitationem, horrorem, vinum æquali portione aquæ mistum epotum, morbum solvit. § 6. 7.

Anxietudo illis euenire solet quibus in ore ventriculi humoris aliqua qualitas continetur ventriculo molesta, quam ipse tunica imbibent. Oscitationes autem sicut & pandiculationes fiunt in musculi ab humiditate flatuosa, vel spiritu vaporoso, quasi partium corporis distensiones. Horror autem prauis humoribus per cutem currentibus accidit. Singula hac vino æquali portione aquæ misto epoto percurantur. Vinum enim præterquàm quòd omnes humores optimos reddit, calfacit totum corpus & citò mouetur ad omnes partes.

XXXVIII.

ἢν τις τὸν πυρετικόν τε φῶν διδῷ, τὴν μὲν ὑγιαίνοντα ἰχθῆσι, τὴν δὲ κακόντα νοῦσιν.

Si quis febricitanti cibum dederit, sano quidem cibis est, laboranti verò morbus. § 6. 7.

Vult dicere cibum sanis quidem augere robur, morbum verò laborantibus, ita ut in febricitantibus ex duobus alterum necessarium esse videatur, aut ut nutriētes, febrem augeamus: quia natura ad cibi coctionem renouata
finis

finis inualescere morbum: aut non nutrientes, vires dissolvimus, quæ cibo fœveri debent: Hic utendum prudenti coniectura, de qua in undecimo aphorismo huius materie. Inter adulterinos & supposititios est habendus hic aphorismus.

De vacuatione.

I.

Τὸ κτ' πολὺ καὶ ἐξαπίνης κενοῦν, ἢ πληρεῖν, ἢ θερμαίνειν, ἢ ψύχειν, ἢ ἄλλως ὁικωσθῆναι τὸ σῶμα κινεῖν, σφαλερόν. καὶ γὰρ πᾶν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον, τὸ δὲ κατ' ὅλγον, ἀσφαλές, καὶ ἄλλως ἢ καὶ ὡς ἐξ ἐτέρου ἐφ' ἕτερον μεταβάλλει.

Plurimum atq; repenti euacuare vel replere, vel calfacere, vel refrigerare, siue quouis alio modo corpus mouere periculosum: Quoniam omne nimium est naturæ inimicum: Sed quod paulatim fit, tutum est, cum aliàs, tum cum ab altero ad alterum fit transitus. § 1. 2.

Mempit horum quatuor, euacuare, replere, calfacere & refrigerare: quia sanitas consistit in iusta quantitate & qualitate triplicis substantiæ, solidæ, humide, spirituosæ. Vacuatio quidem & repletio sunt quantitatis, calfactio verò & refrigeratio qualitatis.

In horum ergo mediocritate quia consistunt facultates corpus nostrum dispensantes, fit ut omne nimium tam in excessu quam in defectu quod commodationem illam destruit, non secus auersetur natura quam subitas omnes ad insueta mutationes.

II.

Ἐν τῇσι παρεχῆσι τῇ κοιλίᾳ, καὶ τῇσιν ἰμέτρισι τῇσιν αὐτῶν μέγεθος γινόμεναισιν, ἢν μὲν οἷα δ᾽ αἰ καθαίρειται καθαίρενται, συμφέρει τε καὶ σφόδρως φέρουσι, ἢν δὲ μὴ, τὸν αὐτὸν. Οὕτω δὲ καὶ ἡ κεφαλῇ, ἢν μὲν οἷα δ᾽ αἰ γίνεται γίνεται, συμφέρει τε καὶ σφόδρως φέρουσι. ἢν δὲ μὴ, τὸν αὐτὸν. ἰπιβλίπτει ἢν δ᾽ αἰ καὶ χάρην, καὶ ὄρεον, καὶ ἡλικίαν, καὶ νέους ἐν ἧσι δ᾽ αἰ, ἢ οὐ.

In perturbationibus ventris & vomitibus spontinis si talia purgentur qualia purgari oportet, confert & leuiter ferunt, sin minus, contrà. Sic & vasorum inanitio, si talis fiat qualis fieri debet, confert & benè tolerant, sin minus, contrà: Inspicere itaque oportet & regionem & tempus, & ætatem & morbos in quibus conueniat aut non. 2. 1.

Præponit vacuationem naturalem medicæ, ut exemplo sumpto à vacuationibus quæ fiunt à natura sciat medicus quales ipse moliri debeat.

beat : Medicus enim minister est naturæ benè operantis , & Ars imitatur naturam. Deiectione ergo illa quæ tantū sit impetu faculeatis naturalis, nō à causa externa, si qualia oportet purgari purgentur, hoc est, ea quæ sua qualitate corpus infestant, confert & leniter ferunt: nam facilitas tolerantia indicium est quòd talis euacuatio facta est qualis erat facienda. Quòd si aliorum fiat euacuatio, & non eorum quæ corpora nostra molestant, contrarium euenit, neq; enim confert, & grauiter ferunt egrotantes. Eodem pariter modo si medicus moliatur aliquam facere euacuationem, eorum, estò quæ corpora nostra molestant; quem admodum & in alijs locis humorem noxium præcipit euacuari, neque alterum illi in euacuatione præferri. Si igitur pituita superabundet, hæc omnino oportet euacuari: flaua autem bile vel atra infestante, abstinentum est à pituita, & bilis infestans euacuanda. Sic & si humor sanguineus in corpore modum excefferit; sanguinem euacuari oportet, sicut & serosam eius partem si hæc fuerit superabundans. Omnium itaq; vacuationum intentio est humor superabundans; cuius notitia perquirenda est ex regione, tempore, etate, natura & colore egrotantis, & ex ipsis morbis: nam biliosa pustula, fastidium cibi, sitis, amaritudo oris, erysipelas, tertiana febris, suadent vtendum medi-

camento cholagogo. Item calor ad nigritiem tendens, pustula nigra, elephas, cancer, quartana febris, lien magnus, varices nigrae, delirium mentis, melancholia, suadent utendum medicamento melanogogo. Regio frigida humida, Hyems, etas senilis, hac significant abū dare pituitam: sicut regio calida, Aestas, etas iuuenilis, bilem. Ad has & similes intentiones respicientes oportet nos inuenire qualitatem euacuationis, hoc est, qualis humor vacuandus est.

III.

Τὰ κριτόρρηκα καὶ τὰ κενερόρρηκα ἀγέλης, μὴ κινέειν, μὴ δὲ νεωτεροποιέειν, μήτε φαρμακείῃσι, μήτ' ἄλλοις ἐπιδομασίον, ἀλλ' ἰᾶν.

Quæ iudicantur & iudicata sunt integrè neq; mouere neq; nouare aliquid, siue medicamentis, siue aliter irritando, sed sinere ^{ex parte} 20. 1.

Cum sit crisis solius naturæ opus, nō medici. Est enim crisis subitus naturæ, id est, facultatis naturalis, & præsertim expultricis, motus in morbo ad salutem omnino vel ad melius, ad mortem vel ad peius per insignem aliquam euacuationem. Nihil omnino agendum est medico cum ipsa perficitur crisis aut iam perfecta est, sed omnia naturæ permittenda, ne eius actionem turbemus, quæ in hoc tota est, ut materias nocentes expellat. Si verò quicquàm deficiat, medici est ut id quod deficit suggerat, euacuans

evacuans ea quæ ab imperfecta indicatione sunt relicta, ne recidivam faciant. Perfecta indicationis & cui nullus numerus indicatarius deest, hæc signa sint, Primum, melior est quæ per evacuationem inferiorem fit, quàm quæ per abscessum: Deinde per quam humor noxius quàm per quam alius quisspiam evacuatur: Tertio loco, quæ recto sit tramite: Posthac quæ facîle toleratur: Dein quæ cum coctione: Et in die decretorio. Horum aliqua si desint, neque integra fuerit indicatio neque exquisita.

I I I I.

Α δὲ ἄγχι, ὅπου ἂν μάλιστα ῥέπῃ, ταύτῃ ἄγχι, ἀπὸ τῶν συμφορέων χειρῶν.

Quæ ducere oportet quò maximè natura vergit, per loca conferentia eò ducere. 21. I.

In evacuatione eorum quæ sunt ab imperfecta indicatione relicta, oportet medicum naturæ motum animadvertere, & si quidem idoneus fuerit, ei convenit adminiculari viam struendo, si verò contrarius & noxius, hunc prohibere atq; divertere oportet, ne in partem principatum obtinentem humores noxios, aut omnino quò non expedit, detrudat. Sunt autem evacuationibus conferentia loca, intestina deiectionibus, vesica urinis, ventriculus vo-

missionibus, (nam si facultas naturalis ad vomitum insurgat, non est eius motus interruptendus, postquam locus & meatus conferens est & manifestus) cutis sudoribus, palatum & nares fluxui sanguinis & pituitæ, &c.

V.

Πείποντα φαρμακώδεις καὶ κίτριν, μὴ ὠμώμεν
δὲ εἰ ἀρχῆσιν, ἢ μὴ ὀργῇ. τὰ δὲ πλεῖστα οὐκ
ὀργῇ.

Concocta medicari atq; mouere, non cruda neq; in principiis, modò non turgent: plurima verò non turgent. 22. 1.

Humores qui agitantur & de loco ad locum moventur ac transfluunt, medicamento vacuare primo quoq; tempore licet: crudos autem & qui in aliqua parte firmati sunt, hos neq; medicamentis irritare, neq; alio auxilio mouere oportet, nisi post coctionem: tunc enim natura pellente & pharmaco attrahente facilius sequitur eductio. Videtur siquidem ipsa natura post coctiones, humores discernere ac vtilibus in usum asseruatis superfluos expellere. Quod sola si potest exequi, nec eget auxilio manum porrigentis medicamento opus non est. Si verò imbecillius agat, id quod deficit oportet supplere, ut tandem humoris voxq; fiat euacuatio. Ratio itaque prohibita
purgatio

purgationis ante coctionem est, quia crudus humor ob crassitiem & frigiditatem est tardi motus, nec pharmaco obedit, unde ex commotione symptomata prava sequuntur, tantò certè deteriora quantò pharmacum est in attrahendo generosius, & humor ob maiorem crassitiē in reluctando validior, aut magis fixus, & in vijs angustioribus. Per aluum quidem ducere crudos humores vetat ratio aphorismi, sed aphorismo minimè prohibetur initio pharmaca lenia, quæ aluum lubricant & à ventre communes materias ducunt. Nam hoc non est crudum humorem, sed excrementa trahere. Aphorismus autem omnem crudi attractionem prohibet, non omnem alui deiectionem. Ut igitur medicandi prohibitio à cruditate, sic initio purgandi atq; à remotis attrahendi permissio ab illa turgendi ratione pendet. Nominè turgentium intelliguntur tenues, biliosi, aliquam motionem excitantes, aut aliquò erumpentes, ventrem moeantes, aut saltem non fixi, quales in morbis rarè cōtingūt. frequentius enim quietem habent humores & in vna aliqua parte consistunt in qua concoquantur toto morbi tempore vsq; ad eius solutionem.

V I.

Τὰ χαρίοντα μὴ τὰ πλεονέκτα τεκμαίρεσθαι,
ἀλλ' ὡς ἂν χρεῖν οἷα δὲ καὶ φύσις οὐφείηται. καὶ
ε ς ἔκον

ὅπου δ' αἰ, μείζονι λήποθυμίας ἄσθι, καὶ τῷτο ποιεῖν ἢ ἐξαρκίσει ὁ νοσίων.

Deiectiones non multitudine sunt æstimandæ, sed si talia deiciantur qualia conueniunt & ægri faciliè tolerant. Atque vbi vsque ad animi defectionem expedit ducere, faciendum, si æger possit tolerare. 2 III. 1.

Non ex copia vacuatio, sed ex his duobus probanda est, si qualia oportet, nimirum quæ vitiosè se habent euacuentur, & si ægri faciliè tolerant. Vacuationis autem modum statuet etiam virtus ægrotantis, ad cuius vsq; defectionem procedendum est interdū, vbi in maximis inflammationibus, in adurentibus febribus & vehementissimis doloribus id suadet vsus, & vbi sic valent vires vt ex animi deliquio rursus emergere faciliè queant. Nam huiuscemodi euacuationibus multos ita adiutos esse cognouimus, vt vel sanitati prorsus restituti sint, vel obuia morbi vehementia plurimum allenati.

V I I.

Εν τῷσι ὀξείσι πάθεσι ὀλιγάκις, καὶ ἐν ἀρχῇ τῇσι φαρμακείῃσι χρῆσθαι, καὶ τῷτο ὥστε ἐλαφρυνήσασθαι ποιεῖν.

In acutis morbis, rarò: & in principiis, medici

medicinis purgantibus uti, & hoc cum præmeditatione faciendum. 24. I.

Non sine ratione dixit arò circa principia morborum acutorum nobis in usum venire purgationes, quoniam non sæpe turgent humores in principijs qui præcipuam offerunt purgationis initio faciendæ occasionem. In longis quidem morbis expectanda concoctio est, sed in acutis in quibus turgent aut saltem fixi non sunt humores, inter initia purgandũ, ne morbus inualeseat, dissoluantur vires, ac in partem aliquam principem decumbant humores vagi. Qua in re cum sint multa perpendenda tam ex modo humoris quàm dispositione corporis, meritò dixit Hippocrates multa præmeditatione ei opus esse qui in principijs purgare tentat. Non quòd in alio exoneranda requiratur multa præcautio, sed in parte humoris noxij velut turgentis educenda: tunc enim perpendere oportet qualis sit humor, & quatenus turgentium vel fixorum participationem habeat: In corporis dispositione perpendendum, per quos meatus sint humores educendi, an satis illi sint reserati necne, an idoneè se habeat æger ad huiusmodi purgationem. Nam qui cruditate laborant multa, qui tenaces ac crassos cibos assumpserunt, quibus est aliqua viscerũ inflammatio, ij haudquaquam
apti

apti sunt ad purgationes. Quibus ex causis & quia medicamenta calida febrem augere nata sunt, suadet initio purgandum esse cum multa religione & cautela.

VIII.

Ἡ ὅλῃ δὲ καθάρσις, καὶ αἰσχροῦ, ἐπι-
φύει τε καὶ δι' ὀφθαλμοῦ φύεται τὰ δ' ἐν αὐτῇ,
δι' ὀφθαλμοῦ.

Si qualia oportet purgari purgentur, confert & facile ferunt : si contra, difficulter. 25. I.

Est hic Aphorismus magni usus, qui toties ab Hippocrate inculcatur & tot locis in 1. 23. & 25. libri primi. In 2. & 3. libri quarti : In quo cum alias purgationes tum eas præcipue vult intelligi quæ per inferna fiunt deiectione. Nam morbi propemodum omnes initium habent à ventre inferiore, & per ventrem insignes purgationes fiunt totius corporis, & venter ipse totum hominem regit, ipsiusq; moderatur habenas, ac vitæ gubernacula tenet : acceptos enim cibos conficit & per omnia membra dividit : ac vtili distributo quod ex his superfluum est educit. Certè huic nihil potest offensionis accedere sine gravissimo totius corporis incòmodo. Quod olim planum fecit Agrippa, conficte de membris conspirantibus in ventrem apologo.

I X.

Τὰ σώματα χρεὶ, ὅπου αἷμα βέλνεται καθαί-
ρειν, ὅσον ποιέειν.

Corpora cū quispiam purgare vo-
luerit, oportet fluida facere. 9. 2.

Sive per vomitum, sive per alui subdu-
ctionem purgare velū fluidum corpus efficiens
optimè purgabitur: Erit autem fluidum omni-
bus meatibus per quos educenda est materia
sic reseratis, ut nulla obstructione impediti fa-
cile eam transmittant: humoribus autem si
fuerint in corpore crassi ac glutinosi, sic inci-
sis, abstersis, atq; extenuatis, ut quàm maxi-
mè fieri potest ad fluendum sint parati. Ve-
rūm in acutis morbis, in quibus ferè turgente
humores, ista preparandi non datur occasio,
nec semper etiam est necesse preparare.

I.

Εν τῇσι τ' αἰσθίσις ῥύσσειν, αἱ μεταβολαὶ καὶ
διαχωρημάτων ὠφελέουσιν, ἢ μὴ ἐς τὰ πονηρὰ
μεταβάλλειν.

In profluviiis alui mutationes excre-
mentorum iuvant, nisi ad mala mutatio
fiat. 14. 2.

Dejectiones versicolores per crisin excerni
melius est quàm eas in corpore retineri. Quòd
si mutatio fiat ad signa coctionis, vel ad colo-

rem

rem enim qui sit naturali vicinus, bonum : Sin minus, contrà. Idem iudicium de urinis, in quibus si fiat talis mutatio, ut ubi tantum apparebat nebula, nunc appareat enacrema, ac tandem hypostasis alba, levis, æqualis, optima est mutatio : Sin minus, contrà.

XI.

Ὅπου λιμὸς, ἢ δ' αἰ ποτίειν.

Vbi fames, laborandū non est. 16. 1.

Est hic sermo communis ad sanos & egros, sanis enim non sunt præcipienda exercitia simul cum inedia, neq; etiam agris aliqui vehementior motus adhibendus eo die quo cibi abstinentia imperari debet, neq; sanguinem mittere oportet, neq; citare vomitum, neq; purgare, neq; multa uti frictione, neq; aliquo forti motu. Motus siquidem huiusmodi vires dissoluunt ubi cibus defuturus est. Edinversò dici potest, ubi laborandum, esuriendum non est.

XII.

Ὁκόσισι νέουσιν ἴουσιν, αἱ κοιλίαι ὕγραί εἰσι, τυτίουσιν ἀπογρηγόσκουσιν ξηραίνονται. Ὁκόσισι δὲ νέουσιν ἴουσιν, αἱ κοιλίαι ξηραί εἰσι, τυτίουσι πρὸς τυτίουσι χυμώουσιν ὕγραίνονται.

Quib is

Quibus iuuenibus adhuc aluus humecta est, iis senescentibus exsiccatur: quibus verò iuuenibus adhuc aluus sicca est, iis senescētib⁹ humectatur. 20. 2.

Qui aluos habent natura humidiores magna ex parte fit, ijs senescentibus, ad contraria transmutatio: qui verò sicciores, ijs eadem victus ratione seruata, fient in senectute humidiores propter contrarias iuuenum & senum temperaturas. Vel quia minus cibi assumitur in senectute quàm potētia hepatis congruat, vel quia parum bilis cōfluit ad aluum, vel quia retentrix facultas est robusta, expultrix imbecilla, excrementa siccantur. Quibus verò ob innatam siccitatem facultas retentrix fortior extiterat, ijs senescentibus fiet imbecillior, & ea ratione excrementa humectabuntur, quoniam expultrix valens est, retentrice imbecilla non remorante fluxum ciborum. Quod etiam ob hepatis refrigerationem accidere potest, vel ob multa bilis affluxum ad intestina quæ ea sollicitat & ad excretionem inuitat.

X L I I.

Οκόσοι τὰς κοιλίας ὑγρὰς ἔχουσιν οἱ μὲν ὄντες, βέλιοι ἀπαλλάσσουσιν τῶν τὰς ξηρὰς ἔχόντων. ἐς δὲ τὸ γῆρας, χεῖρον ἀπαλλάσσουσιν. ξηραίνονται γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ταῖσιν ἀποξηράσκουσιν.

СХВЛ

Quicunque aluos humidas obtinent, hi quandiu iuvenes sunt melius degunt quàm quibus sicca est. In senectute verò deterius degunt, siccantur enim alui magna ex parte iis qui senescunt. 53. 2.

Hic Aphorismus convenit cum antecedente, ubi etiam innuit alium humidam, quae facile excernit, meliorem esse: sicut eam quae non nisi aegrè, deteriore.

IIII.

Ἀρχομένοιαν τῶν νούσων ἢ π. δακύν κινέιν, κί-
τη. ἀκμαζουσῶν ὃ ἡσυχίην ἔχον βέλπιόν ἐστι.

Cùm morbi inchoant, si quid videtur mouendum, moue: cùm verò consistunt ac vigent, melius est quietem habere.

Περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη πάντα ἀδυναίει
εὐπερί δὲ τὰς ἀκμὰς ἐκχυρόμεται.

Circa initia & fines omnia imbeciliora, circa statũ verò fortiora. 29. & 30. 1.

Cum humores in aliqua corporis parte fixos atq; formatos ante coctionem mouendos esse vetuerit, non abs re consulit hic vt si expediat & si quid initio mouendum appareat, moueamus, non semper inter morborum initia humores mouendi libertatem concedens, sed tum solum cum turgent aut saltem fixi non haerent.

hærent. Quod certè non impedit quominus initio aluum ducas glande, clystere, vel leui pharmaco quod lubricando non fortiter attrahendo purget, vt ab excrementorum onere leuentur intestina, & alijs succis educendis reddantur paratiora. Hæc leuis inanitio, quæ vacuatio crudorum non est, sed excrementorum, prodest interim ad maiora: nam si quid noxi humoris circumstat, etiam educitur & omnibus his meatibus reſeratis ſapiſſime per quandã ſequelam ex ſuperioribus partibus aliquid emittitur, vt 1. de compoſitione medicamentorũ ſecundũ locos, & 12. methodi traditũ eſt de clyſtere, qui etiam ex meſenterio et ſimis hepatis frequẽter educit. Rei ſumma in hoc ſita eſt, vt cum nobis non deſint medicamenta clementia, antiqui etiam ignota, liceat initio morbi purgare eo pharmaco cuius vis ex ea parte non attrahat in qua hæret aliqua cruditas, & præſertim à meſenterio & iocinore: nam primarum venarum cruditas quamuis alia omnis, hæc tamen eſt quæ pharmacum & maximè deteſtatur. Quare ſicuti turgens humor & qui turgentis nomine poteſt intelligi, tenuis, ſyncerus, peſtilens, mobilis, deorſum vergens, quieſcere non permittens, & quicumque à crudis longius recedit, mox educi cum præmeditatione poteſt: ita craſſus & fixus educendus in principio non dicetur, ideo quia
d prius

prius extenuari & incidi debebit, & morbi
coctio expectari. Medicus itaq; si quid initio
mouendū esse duxerit, vel missione sanguinis
vel purgantibus medicamētū id moueat, in me-
moria semper habens quòd desperatos attin-
gere non oportet. Is vigore autem ab omni
remedio abstineat. Nam in statu symptoma-
ta omnia cū sint acerbissima, & natura sit
intentā morbo profligando, ea medicamentis
auocanda non est ab instituto.

XV.

Οἱ ὑγιανόντες ἰσχυρίσιν τὰ σώματα, ἐν τῇσι φαρ-
μακείῃσι καὶ θαιερόμενοι ἐκλύονται ταχέως, καὶ
οἱ πονηρῇ πρὸς τὴν χρεώμενοι.

Qui sanitate corporis fruuntur me-
dicamenta assumētes, statim exoluun-
tur, & qui prauo vtuntur cibo. 36. 2.

Qui partes similes & organicas tempe-
ratas & ob id actiones omnes inculpatas ha-
bet, si medicamentum validum sumit, syncope
prehendi solet, viribus exolutus: quoniam
medicamentum cū non inuenit humorum
sibi familiarem in homine temperato redun-
dantem, necessariò & quasi tyrannicè trahit
eum qui cum sanguine mīstus vnā cum alijs
essentiam hominis constituit. Itidem qui
prauo vtuntur cibo, & ob id laborant caco-
chymia,

obymia, si affatim purgētur, viribus exoluuntur propter malorum humorū superabundantiam, qui cum acres sint & mordaces transitu suo molestiam inferunt, & tandem animi defectum. Quare paulatim educendi sunt humores noxi, & boni vicissim apponēdi per epirasin.

XV L.

Οἱ δὲ τὰ πάματα ἱγίαις, φαρμακείαις, ἰεργάσις.

Qui benè valent corpore, difficulter ferunt medicationes. 37. 2.

Nam & vertigines & tormina & synco-
pas patiuntur, & exoluuntur, & difficulter
omnino his purgatio procedit, qui commode-
rato sunt corpore. Fiunt autem hæc omnia
medicamento proprium quidem humorem
attrahere appetente, ut flauam bilem, vel
atram, vel pituitam, vel aquosam superflui-
tatem: qui, quia non adest peccans in corpore
symmetro, absomit sanguinem, & carnes col-
liquat, ut ex ipsis proprium attrahat humorē.

XV I I.

Εν τῇσι φαρμακείαις γινώσκονται ἅπαντα τὰ πάματα ὅτι καὶ αὐτὰ πάματα ἰόντα λήθονται τὰ δὲ ἰσχυρὰς ἰόντα παύονται.

In medicationibus talia educere ē
corpore:

corpore qualia sponte prodeunt, vtile: Quæ verò contrario modo prodeunt, cohibere oportet. 2. 4.

Cùm medicus in artibus operibus ea quæ benè à natura sunt, imitari debeat, hoc vnicè curabit, vt in singulis morbis tales vacuet humores, quales in vacuationibus spontiniè vtiliter euacuantur à natura. Quod ita fieri, scilicet ve esse, indicio est facilitas tolerantia. Si verò fiat eorum euacuatio quæ natura non vtiliter educeret, ea maturè cohibenda est, vt-pote quæ non inuet agrotum, sed offendat.

XVIII.

Θαλασσιανὸν δὲ δίψος μᾶλλον πᾶσιν ἀνθρώποις, τὰς κατὰ

Medicari Aestate superiores magis, Hyeme verò inferiores. 4. 4.

Iubet tamen Hippocrates, lib. de ratione vietus priuatorum, aestate reuelli bilem flauam ad inferiora: Et idem habet Galenus in commentario. Dicendum quòd hîc loquutus est de vniuersali purgatione totius corporis: nam si velit quis purgare totum corpus bile, & sit Aestas, conuenientius id fiet vomitu: bilis enim propter sui leuitatem, & propter ambientem caliditatem, ad superiora magis mouetur. Quelibet autem superfluitas eò quòd
vergit,

vergit, ducenda, per loca conuenientia: Si verò opus est particulari purgatione ventris & intestinorum tantum, commodius id fiet deiectione per inferiora, quam præsertim enemata perficiunt. In summa, quæ in præsentì abundat, iis medeberis purgatione, vt tamẽ per loca quò vergunt purgationẽ instituas: at quibus ne augeatur velis obsistere per opposita reuellere debes, Aestate & Hyeme naturas suas seruantes: Aestate quidem bilis abundat, Hyeme verò pituita. Quapropter meritò Aestate per vomitum, Hyeme autem per aluum magis vacuandum est, cùm bilis ob tenuitatem suam feratur sursum, pituita verò ob grauitatem deorsum deturbetur.

XIX.

Υπὸ κυβῶς καὶ ἀπὸ κυβῶς, ἱργῶδες αἱ φαρμακείαι.

Sub Cane & ante Canem difficiles sunt medicationes. §. 4.

Medicationes, hoc est, per medicamentum purgationes, & omnes aliæ magnæ & insignes, euacuationes, quomodocunq; fiant, molestæ sunt, graues, & noxiæ omni æstui magno: nam multi purgati hoc tempore incidunt in febres, & natura ex æstui imbecillis magis ex purgatione dissoluitur: praua etiam hoc nomine est purgatio, quòd calor ambientis in partem tra-

hat extrinsecam, contrariam ei ad quam medicina ducit humores. Medicamentis tamen benignè & leniter purgantibus (qualia non fuerunt tempore Hippocratis) vti possumus, si visum ita fuerit, & res exigat.

XXI.

Τὸς ἰχθύες καὶ διαιτίας αἰὶν φαρμακείας, ὑπερδιόχους καὶ καὶ.

Graciles & facilè vomentes purgare superius, cauentes Hyemem. 6. 4.

Magna ex parte graciles sunt biliosi. Si igitur hoc accesserit vt sint ad vomendum faciles, per superiora purgandi sunt, nisi obstat Hyems: nam purgamus Hyeme sæpius per inferiora.

XXII.

Τὸς δὲ δυσχερεῖς καὶ μέσους διαίτησιν καὶ, ὑπερδιόχους καὶ καὶ.

Vomentes verò difficulter, & mediocriter carnosos, per inferiora, cauentes Aestatem. 7. 4.

Qui mediocriter carnosus non facilè vomunt, non sunt cogendi vt vomant, ne vas aliquod rumpatur in pulmonibus: sed purgandi sunt per inferiora, nisi impediat Aestas:

hoc

hoc enim tempus per superiora purgationem magis requirit.

X X I I.

Τὰς δὲ φθισώδεις, ὑποτελλομένους τὰς ἀνά.

Tabidos, per inferiora, cauentes superiora. 8. 4.

Phthisi obnoxios purgamus deiectione, nec ad supernas per vomitum purgationes unquam ducimus, veriti scilicet instrumentorum quæ respirationi inferuiunt imbecillitatem: Et ne pulmonis ulcera, propter commotionem illam quæ vomitus excitat, irritentur.

X X I I I.

Τὰς δὲ μελαγχολικὰς ἀδροτέρως τὰς κάτω, τὰ αὐτὰ λογισμῶ τ' ἀναίτια ἀποπείνεις.

Melancholicos verò plenius per inferiora, eadem ratione contraria apponentes. 9. 4.

Bilis, quia repit sursum, purganda est vomitu. Quia humor melancholicus graui tendit deorsum, per inferiora, valentiore medicamento, purgandus est deiectione, ut quò vergit uterq; humor, eò per loca conuenientia ducatur.

X X I I I I.

Φαρμακὸν δὲ ἐν τοῖσι λίαν ὀξέσιν, ἢ ὀργῇ,
 4 4 αὐτῇ

αὐθιμίαν· ζεονίζει γὰρ ἐν τοῖσι πυλῶσι κα-
κόν.

Medicari in valde acutis, si materia turget, eadem die tardare enim in talibus malum est. 10. 4.

In morbis peracutis qui statim circa primos dies in summo vigore sunt futuri, utendum est initio medicamento purgante, si materia turget: nam in eiusmodi morbis malum est cunctari, ne scilicet robur dissoluatur, febris caliditas augeatur, aut ad aliquod membrum principale decumbant quod qui per corpus vagantur humores, et mortem repentinam inducant.

XXV.

Οκίσσοισι καλῶσι λευκτερίωδες, χυμῶνος φαρμακῶσαι αὐτῶν, κακόν.

Quorum alui intestinorum leuitate laborant, hyberno tempore per superiora purgari, malum. 12. 4.

Lienteria causa, imbecillitas facultatis re-
tentricis ventriculi aut intestinorum est, aut
distillatio multa pituite, qua velut oblita
sunt tunica ventriculi, unde lubrica fiunt.
Fit interdum et lenitas intestinorum ex ali-
qua exulceratione cuius humor acris et te-
nuis est causa: hic, etsi per superiora purgari
debet,

debet. quoniam huiuscemodi humores magis fluitare soleant, quam ad inferiora secedere, non tamen hoc Hyeme faciendum est, sicuti etiam superius est dictum. Pituitosus verò humor quando adhaeserit intestinum, nunquam est per superiora purgandus, hoc est, per medicinam vomitoriam. sola enim euomendi natura apta sunt, quæ in ventriculo continentur: eorum verò quæ continentur in intestinis, nihil potest per vomitum euacuari.

X X V I.

Πρὸς τὰς ἰλλυθόρας γῆσι μὴ ῥηϊδίως ἔσται
κεκαιρομένοισι, ὡς τὸ πόσιος ὡς ὑγροίνῃσι καὶ
σύμπετε πλεόνον τροφῇ, καὶ ἀναπαύσει.

Qui non facilè per superiora purgantur, ad veratrum admittendi sunt pleniorre cibo & quiete corporibus ante potionem humectatis. 13. 4.

Qui non de facili per superiora purgari videatur, non oportet huiusmodi hominem ad helleborum ducere antequàm præparetur: hoc autem fiet, si per continuos vomitus assuescat is qui sumpturus est helleborum, ad promptè vomendum: Quod melius procedet prius humectando corpora: humectabuntur autem plurimo alimento atque quiete. Nam hellebori sumptio periculū convulsionis afferret ijs qui-

hinc nerui sunt aliaq; corporis partes exsiccate.

XXVII.

Ἐπὶ πῶς ἔστι ἰλλέβορον πρὸς μὲν τὰς κινή-
σεις τῶν σωμάτων μᾶλλον ἄλλοις, πρὸς δὲ τὰς
ὑπνους καὶ μὴ κινήσεις ἥσους. δηλοῦν δὲ ὅτι ἡ ταυτὴ
λίη οὐκ κίνησις τὰ σώματα πρὸς αὐτῇ.

Cum biberit quis helleborum, ad mo-
tiones quidem corporum ducere magis,
ad somnos verò atque quietem minus.
Indicat autem nauigatio turbari motio-
ne corpus. 14. 4.

Non tantum post helleborum, sed & post
omne medicamentum prodest ad descensum
humorum exercitatio. Indicat nauigatio: non
enim mare tantum prouocat ad vomitum, sed
& in mari corporis agitatio. Caterū in somno
& quiete naturales facultates magis agunt, ac
purgans medicamentum quantum in ipsis est
concoquunt, eumq; actionem frangunt.

XXVIII.

Ἐπὶ ὅσῳ μᾶλλον ἄλλοις τῷ ἰλλέβορον, κίνη-
σις τῶν σωμάτων. ἐπὶ δὲ πᾶσι, ὑπνους πρὸς ὅτι μὴ κίνησις.

Cum voles helleborum magis duce-
re, moue corpus: cum veiò sistere, somnū
inducito nec moueto. 15. 4.

Non est absque ratione quòd ea quæ sistunt
purgatio

purgationem sint contraria ijs quæ cient vomitum. Si igitur motiones ciebant, sistent quietes, & multò magis somnus, in quo vires animales quiescunt, tum quæ per sensus feruntur, tum etiam quæ per musculos, in motibus voluntarijs.

XXIX.

Ελλέβορ ἐπικίνδυνος εἶσι τὰς ἁρμὰς
ὀνίαις ἔχει, σπασμὸν γὰρ ἐμποιεῖ.

Carnes sanas habentibus helleborus
periculosus, facit enim convulsionem.
I 6. 4.

Corpus sanum cognoscitur ex illæsis actionibus, quæ sunt à quatuor humorum proba temperie. Hi si se habent secundum naturam, nec inuenit medicamentum vllum humorem noxiū in quem agat, partes sanas colliquat & depascitur, vt secretum succum familiarem sibi, quamvis probum, attrahat. Sed hæc attractio violenta quàm sit periculosa, demonstrat convulsio quæ ferè humiditatibus absumptis consequitur.

XXX.

Ἀπυρίτη ἰόντι ἀποσιῶν, ἔκχεδωγμὸς κ'
σχετόδωτος, ἔσόμεναι κπικρέμματα, ἅντα φαρμακείας δίδωται σημαίνῃ.

Eum

Eum qui non febricitat, cibi fastidium, morsus oris ventriculi, vertigo, & oris amaritudo, purgatione indigere per superiora significat. 17. 4.

In eo qui febre vacat, appetentia deiecta, morsus oris ventriculi, vertigo, oris amaritudo, hi casus sunt communes humorum omnium mordacem habentium naturam, & qui alta petunt. Quare in huiusmodi dicit Hippocrates significari medico, quod purgare debeat per superiora, vomitione: iuxta id quod alibi dixerat: Quod natura vergit, eò ducere.

XXXI.

Τὰ ὑπὲρ τῶν φρενῶν ὀδυνημένα, ὅσοι κα-
θάρσις διορίζεται, αὐτὰ φαρμακείας διοδοῖαι ση-
μαίνει: ὅσοι δὲ κατω, κατω.

Dolores qui sunt supra præcordia, quicunque egent purgatione, medicari oportere per superiora significant: quicunque autem infra subsistunt, per inferiora. 18. 4.

Secundum humorum infestantium motiones oportet etiam facere evacuationes, ita ut dolores qui superius sentiuntur, per vomitiones: qui verò inferius, per medicamenta subducentia curentur. In pleuritide tamen, peripneumonia, & dolore capitis, non est cien-
dus

duſ vomitus : quia materia committens illos
improbos non eſt in ventriculo, nec in via per
quam vomitione excernatur.

XXXII.

Οκόσοι ἐν τῇσι φαρμακῶσι ποσίνσι μὴ διψῶ-
σι, καὶ ταυρόμενοι ἐς παύονται περὶ τὴν διψήσασιν.

Qui medicamentis purgati non si-
tiant, non cessant priusquam sitiant.
19. 4.

Finis iustæ purgationis est sitis, quando va-
cuatus ventriculus per medicamentum pur-
gatorium siccatus est : Sitis enim fit à siccitate
et inopia frigidi & humidī. Sufficiens autem
est ea quæ ex evacuatione provenit siccitas hæc
efficere, ac præterea ea quæ est medicamenti
purgantis vi habentis aliquam, et si non ma-
nifestam sensui, tamen latentem acrimoniam
atq; aciditatem.

XXXIII.

Ἀπυρέτοιςιν ἴσπιν ἐν γένειται τρέφος, ἐ γυ-
νάτων βάρει, ἐ ὀσφύος ἀλγυμῶ, κάτω φαρ-
μακείας δειδῶσαι σημεῖα.

Non febricitantibus si tormina acci-
derint, & genuum grauitas, & lumborū
dolor, purgari per inferiora oportere
significatur. 20. 4.

Facien

Facienda sunt euacuationes pro impetu & motione humorum noxiorum, quò per naturam impelluntur.

XXXIII.

Υποχωρήματα μέλαινα, ὀκρίου αἷμα μέλαινα, ἀπὸ αὐτῶν ἰόντα καὶ ἔνι πυρετῷ καὶ ἀνδρῶν περὶ τῷ, κάκιστα. Ἐὐκρίων ἂν τὰ χρώματα ὑποχωρημάτων πλείω ποτηρότερα ἢ, μᾶλλον κάκιον, ἐκὸ φρεμάκη δὲ, ἀμύνον, καὶ ὀκρίων ἂν πλείω χρώματα, ἢ ποτηρά.

Deiectiones nigrae sanguini atro similes & sponte procedentes, siue cum febre, siue sine febre, pessimæ: & quantò colores pravi fuerint plures, deterius. A medicamento verò procedentes, meliores sunt, idq; quantò plures fuerint colores, non pravi. 21. 4.

Deiectio hominis sani subfulva est, mollis, coherens, & non valde graecolens: alia qualitates quantò plures fuerint, tantò peiorem indicant deiectionem. Color aduersionis & corruptionis est niger, sicut albus similis assumptis cibis, crudis. Multi quidem deiectionum colores pravi, sponte natura procedentes, multarum atq; malarum in corpore dispositionum sunt signa: aduerti verò à medicamento habente plures humorum species euacua-

re, nihil absurdum significant, sed praevaluisse naturam ostendunt, quae vitiosos humores, vix cum medicina superavit.

III.

Νοσημάτων ὁρότων ἀρχαῖων ἢ καὶ μέ-
λαινα ἢ ἀνω ἢ κάτω πέλθῃ, πυέσιμον.

Morbis quibuscumque incipientibus, si atra bilis vel supernè vel infernè exierit, lethale. 22. 4.

In morborum initio nihil excernitur natura conatu aut lege quae superflua non consuevit euacuare nisi cocta fuerint: Sed si quid tum excernitur, quum nulla adhuc apparent coctionis indicia, certum est id morbi vi fieri, & humoris malitia, à quo natura vehementer irritata cessit. Quo enim tempore à causis morbum facientibus natura grauatur, & adest cruditas humorum, tunc aliquid vtiliter euacuari est impossibile. Siquidem oportet coctionem praere, subsequi verò discretionem, & postea euacuationem. Itaque post morbi coctionem cum aliquis humor vitiosus secretus excernitur, tunc corpus à natura expurgari, bonaque fieri euacuatio rectè dicitur: Si verò aliter excernitur sine signis coctionis, exitialis est casus. Quare cum in morbi principio semper sint signa cruditatis, mala existimanda est

humorum

humorum talium in principio euacuatio.

XXXVI.

Οκόσοισιν ἐν νησημάτων ὀξείων, ἢ ἐν πολυχρονίων, ἢ ἐν τραυμάτων, ἢ ἄλλως πως λεπτωμένοις χολὴ μέλαινα, ἢ ὀκρίον αἷμα μέλαν ὑπέλθῃ, τῇ ὕστεράν η ἀποθνήσκουσιν.

Quibuscunque per morbos acutos vel diuturnos, aut vulnera, aut quemuis alium modum extenuatis, nigra bilis aut veluti sanguis niger per inferiora suble-derit, postridie moriatur. 23. 4.

Viribus ob aliquem morbum vehementer imminutis, si atra bilis, hoc est, bilis non naturalis, aut humor melancholicus, hoc est, atra bilis naturalis exierit, mortem in proximo esse denuntiat huiusmodi euacuatio. Nam cum natura sit imbecillis adeo ut non possit concoquere neq; discernere, neq; ut convenit, excernere quæ ita prava existunt, ea mortis molestiam in posterum non differunt, propter virium imbecillitatem & morbi magnitudinem. Porro distinctio inter humorem melancholicum & atram bilem faciliè deprehendi hinc potest.

XXXVII.

Δυσπνείη ἢ ἀπὸ χολῆς μελαίνης ἀρχήσας θανάσιμον.

Diffi

Difficultas intestinorum, si ab atra bile inceperit, lethalis est. 24. 4.

Dysenteria magna ex parte fit à bile flava, abrasis primum propter humorum acrimoniã intestinũ, deinde etiam exesis, adeo vt exulcerentur. Hac intestinorum difficultas saepe quidem sanatur: sed quæ ab atra bile fit, insanabilis est omnino, cum nihil differat à cancro exulcerato. Cancer autem internus occupans intestina, quia nihil imponi sibi quod adhaereat patitur, & quia semper ab alimenti superfluitatibus tangitur, est insanabilis.

XXXVIII.

Αἷμα αἶμα μὲρ ὀκτώτων αἶν ἤ, κακόν. κάτω δ, αἵματον μέλας ὑποχωρίον.

Sanguinem quidem ferri suprà, qualiscunq; sit, malum: infrà autem, bonum, cum niger delicitur. 25. 4.

Sanguinis excretionem, qua fit non per nares, sed per os, ait omnino esse malam, qualiscunque fuerit is qui excernitur sanguis, hoc est, siue spirituosus, siue rubens, siue flavus, siue niger, siue aquosus, siue crassus: nam apertionem alicuius vasis in superiori parte, aut rupturam significat, idq; in viris præcipuè. Potest enim salubriter reddi sanguis in mulieri-

bus

bus quibus purgationes menstruae confiteruntur: ut patet lib. 5. Aphorismo 32. Et in alijs etiam nonnunquam vtiliter excernitur, ut in mutilatis et cacochymis. Infra verò sanguinem atrum ferri per hæmorrhoidas, quando homini natura multum talem accumulauerit sanguinem, bonum: ut manifestum esse potest ex aphorismo 11. lib. 6. Cum verò dixerit antè deiectiones nigras esse pessimas, hæc autem nigræ deiectiones per hæmorrhoidas, vtilis, hinc planum fit à nigris deiectionibus distinguendas esse hæmorrhoidas.

XXXIX.

Ἡ ἐν τῷ δυνάμει ἰσχυρῶς ὀγκώσας αἱ σάρκες ἐμπορεύονται, θανάσιμον.

Difficultatem intestinorum habenti, si veluti carunculæ deliciantur, lethale est. 26. 4.

Quando magna partes intestinorum excernuntur in dysenteria, ut possimus eas carnes nominare, lethalem ait esse morbum, cum neq; caro concrefcere, neq; cicatrix obduci in tali possit exulceratione.

XL.

Οκέουσι ἐν τῇσι περιττῇσι αἱμορραγίῃ πολλῇ ὅς ὀγκώσεν, ἐν τῇσι ἀναλήψῃσι φυτίοισι αἱ

κρίδαι καθυγχαίνονται.

Quibus febricitātibus sanguinis fluxerit multitudo quacunq; ex parte, cūm reficiuntur, iis alui humectātur. 27. 4.

Propterea quòd cum sanguine multo multum caloris nativi et spirituum exhalavit, & quod remansit, conficiendo alimento non sufficit: ob id ex cruditate sequitur humiditas & lubricitas alui, durans donec vires suas natura recuperaverit.

Σ Λ Ι.

Οκόσοισι χολάδια τὰ ἀσχωρήματα, κωφάσιος γινώμενης πάντων. καὶ οκόσοισι κώφωσις, χολαδίῳ γινώμενῳ πάντων.

Quibus biliosæ sunt deiectiones, hæ superueniente surditate cessant, & quibus surditas adest, superuenientibus biliosis deiectionibus, cessat. 28. 4.

Non de ea surditate quæ ex habitu difficulter soluitur, sed de ea quæ repente in febribus vel aliter fit, accurrente ad cerebrum bile, sermo ipsi est. Ipsa siquidem bilis cūm meatus auditorios occupaverit, efficit surditatem: Cūm verò hinc ipsa natura expellente, ad excretionem pervenerit, soluit surditatem, & alium deicit, materia videlicet surditatis è
e 1 supernis

superius ad inferiora translata. vide aphorismum 60. lib. 4.

X L I I.

Ἰδρῶς πολὺς ἐξ ὕπνου ἀνδρὸς φανερῆς αἰτίας
 χρομένιος τῇ σάρκει, σημαίνει ὅτι πλεῖστοι τρο-
 φῇ χρεῖται. ἢ ὃ τροφὴν μὴ λαμβάνοντι τῷτε
 χεῖν, σημαίνει ὅτι κενώσιος εἶναι.

Sudor multus ex somno factus absq;
 causa manifesta corpus vti pluri cibo
 significat: Si verò cibum non accipien-
 ti hoc accidat, scire oportet quòd eua-
 cuatione indiget. 41. 4.

Sudoris multitudo absq; causa manifesta,
 altera duorum causarum fit, vel propter ci-
 borum qui sunt recenter assumpti, immode-
 rantiam: vel illorum qui antea. Quod si pro-
 pter recenter assumptos, prohibere oportet ne
 plures assumant. Quod si propter prima assum-
 ptos, euacuate.

X L I I I.

Αἱ ἀποχρεμψίαι αἱ ἐν βίῳι πυρετοῖσι μὴ
 διαλείπουσι πηλιδίαι, εἰ αἱματώδεις, καὶ δο-
 σάδεις, καὶ χολαῖδεις, πάσαι κακαί. ἀποχωρεῖ-
 σαι δὲ καλῶς, ἀγαθαί, καὶ κτλ. τὰς διαχυρήσεις,
 καὶ κτλ. τὰ ἕρπ. ἢ δι' μὴν τὸ συμφερόντων ἐκ-
 κείνηται. Διὰ τῶν τίπων τῶντων, κακόν.

Excretio.

Excretiones in febribus non intermittentibus, liuidæ, cruentæ, fœtidæ & biliosæ, omnes malæ. Sed si prosperè excernuntur, siue per aluum, siue per vi-
nas, bonæ. Si verò aliquid eorum quæ non confert excerni, per hæc loca ex-
cernitur, malum. 47. 4.

Indicia quòd aliqua benè excernātur, ma-
xima sunt & cōstio & bona tolerantia: cum
ipsis verò & morbi species, & cum his tem-
pus anni, & regio, & ætas, & natura agro-
tanti. Quæ omnia concurrunt ad hoc, ut fa-
cile fiat ager, & leuetur morbus. Liuidæ de-
iectiones, partium vnde excernuntur, mortifi-
cationem: Cruentæ, vasorum abertionem
aut erosionem à biliosis humoribus factam si-
gnificant: fœtidæ, putrefactionem: biliosæ,
abundantiam bilis in continuis febribus. osten-
dunt. excretiones autem etiam per se prave
si benè exeant, bonæ: nam partem malè affe-
ctam expurgant, quæ fieri solent peracta iam
cōstione & agro facile tolerante. Sed si ali-
quid eorum, quæ non iuuant, hoc est, quæ non
leuant morbum excreta, excernitur, non bonū.

X L I I I I.

Οὕτως ὡς καὶ ποτὶ τὴν γυναικῶν, οὕτως
τὴν ἀνδρῶν σημαίνει.

Mistio noctu plurima contingens, parvam significat deiectionem. 83. 4.

Docet nos & alui fluenti & astricta remedia. In quibus enim supra modum alui humida deprehenditur, q̄s potum minorem exhibebimus, ac praterea viam ad resicam parabimus: In quibus verò sicciior, plus dabitur potus, & distributionem eim, quantum fieri poterit, prohibebimus ne ad vias vrinae transmittatur.

XLV.

Αἵματος πολλῷ ῥυέντος παρασμός, ἢ λυσιμὸς ἐπιζυγόμενος, κακός.

Vbi sanguis plurimus fluxerit, singultus aut conuulsio superueniens, malum. 3. 5.

Singultus ventriculi, conuulsio articulorum etiam est, cum sanguinis multa profusione multi calorem nativi & spiritus sit exhalatio: unde vires deiecta, vix reparantur ex conuulsione.

XLVI.

Ἐπὶ ὑπερκαθάρσει παρασμός ἢ λυσιμὸς ἐπιζυγόμενος, κακός.

Ex nimia purgatione conuulsio aut singul

singultus superueniens, malum. 4. 5.

Ex repletione convulsio sanabilis est per evacuationem : ea verò quæ fit ex immodica inanitione, quam partium nervosarum siccitas insequitur, non faciliè admittit curationem : quoniam siccitatis remedium est difficillimum, & morbi acuties non patitur moram, sed subitum exitium affert. Convelluntur autem qui ultra modum purgantur, non alia ratione, quàm qui sano existentes corpore helleborum assumpserunt.

XLVII.

Εν τῇσι χροσίησι λευκίησιν ὀξυρσμία ἐπι-
στροφία μὴ στροφία πρῶτον, σημεῖον ἀσθεν.

In longis leuitatibus intestinorum si ructus acidus superueniat, qui prius non erat, signum bonum. 1. 6.

Lienteria seu leuitas intestinorum est passio per quam cibi celerrimè, priusquàm per-
mutationem accipiant, dilabuntur. Hac si ab imbecillitate est facultatu retentrici & concoctrici ventriculi & intestinorum, ob aliquam eorum intemperiem, deiectiones habet absq; dolore. Si verò ab humorum acrimonia superficiem intestinorū abradente, cum dolore permeat cibum & potus. Hic autem ipsi sermo est de ea leuitate quæ ex intemperie orta, re-

ventriculi facultatis imbecillitatem sequitur: Cui si succedit ructus acidus, significat calorem nativum augeri, & cibum assumptum tantisper in ventriculo retineri, donec mutationis collisionisve principium accipiat, & naturam sui tandem officij reminisci.

XLVIII.

Εἰ τῇσι μακρῇσι δυστηγείῃσι αἱ ἀποψίδαι κακόν, καὶ οὐκ οὐκ πύρετος κακίον.

In longis difficultatibus intestinorum cibi fastidium, malum: & cum febre, peius. 3. 6.

In dysenterijs longis & difficultatibus intestinorum, si ventriculus, ipsis compatiens, nec appetit nec probè concoquit, id significat partem eorum humorum acrimiam à quibus exulcerantur intestina, ad os ventriculi efferi, qui mortificationem ipsi ventriculo ac nutritici facultati comminantur: Si vero una cum fastidio febris adueniat difficultati intestinorum, duorum alterum est, vel putredo aliqua est circa ulcera, vel magna inflammatio, atq; ita egri se habent exitiāliter.

XLIX.

Υπὸ διάρροιας ἔχοντες μακρῇσι ἀπὸ ταυτῶν μέγιστον ἐπιγινόμενος λόγος τῇ διάρροια.

Longo

Longo alui profluvio laboranti spontaneus vomitus superueniens morbum soluit. 15. 6.

In diuturno alui profluvio vomitum utiliter monet natura, qui in contrarium retrahendo malum sanat: hoc unum est eorum quæ rectè à natura facta medicum imitari oportet.

I.

Οκόσα ῥήγματα ἐκ τῆς κοίτης εἰς τὰς ἀγκῶνας κατεβαίει, φλεβοτομή λύει.

Quæcunque ruptiones ex dorso ad cubitum descendant, venæ sectio soluit. 22. 6.

Quoniam ruptiones ipsas descendere unum eorum est quæ fieri queunt, intelligendi sunt dolores in ruptione excitati ex defluxu humorum in eam partem decumbentium: qui si euacuentur per venæ sectionem in cubito existentem, quando huc apparent fluentes, fiet mali solutio. Est enim præceptum eius, secundum quod humores repunt, facere euacuationes per loca conferentia.

I I.

Οκόσοι ἔμπυοι ἢ ὑδρωπικὸὶ καίτοι ἢ τίμιοι, ἐκείνους τῷ πύκι καὶ τῷ ὑδατος ἀβρόν, πάντως ἀπόλλυο.

ε ς Qui

Quicumque suppurati aut aquam inter-
cutem patientes vruntur aut secantur, si
pus aut aqua vniuersim effluxerit, om-
nes moriuntur. 27. 6.

*Omnes euacuationes quæ semel vniuersum
educunt, periculosas esse docet exemplo suppu-
ratorum & hydropicorum: Nam puri in sup-
puratis, & in hydropicis aqua vniuersa eua-
cuatio lethalis est: quippe una cum humore,
spiritus vitalis vacuatur, atque è vestigio defi-
cit anima, & vires debilitantur, & debilitas
istâ remedium præsens cum non habeat, mo-
riuntur. Neque hoc fit propter pus, quod omnino
malum est & noxium, sed quia simul cum pu-
re spiritus multi ex vasis arteriosis exeunt,
unde periculum. Hydropici verò periclitantur
etiam ab aëre frigido, qui plurimus subit lo-
cum aqua confertim euacuata, & reliquum
calorem natium extinguit. Idem est pericu-
lum mulieribus quæ nuper pepererunt.*

L I I.

Τραυλοὶ ὑπὸ Διγέρσεως μάλιστα ἀλίσκονται
μακρῆς.

Balbi ab alui profluuiis maximè ca-
piuntur. 32. 6.

Contingit quibus qui natura balbi sunt alte-
rum

rum horum, aut cerebrum habere humidum
aut linguam, vel utrunq; . Et cerebro quidem
talem sortito temperaturam, defluere ab eo
multas humidas superfluitates par est, atque
inde fluentes in ventrem suscipi : unde &
longis profluvijs homo capitur. Lingua verò
admodum humida natura existente, & ven-
triculum talem esse par est, ut qui alteram tu-
nicam communem habeat cum lingua. Imbe-
cillu autem ex humiditate ventriculi propria
passio est diuturnum profluviu.

L I I I.

Δυσουρίη φλεβοτομή λύφ. τίμηρ δι τὰς
αἰσ.

Difficultatem urinae vena secta iuuat,
secare verò interiores. 36. 6.

Difficultatem urinae, eam videlicet qua
propter inflammationem fit aut multitudi-
nem, eius vena sectio soluit, qua in poplite
& malleolo est : hac siquidem vena, partium
quae infra iocur sunt, vteri potissimum &
vesicae, malum confert. Huc pertinet Apho-
rismus 49. lib. 7.

L I I I I.

Οκρόσισι φλεβοτομή, ἢ φαρμακείη συμφέ-
ρει, τυτίς αἰσθηκοὶ τῷ ἡρὸς φλεβοτομῇ
ἢ φαρμακείῃ.

Qui

Quibuscunque venæ sectio vel medicatio conuenit, hos Vere purgare vel venam incidere oportet. 47. 6.

De ijs qui adhuc sani sunt, sed agri (nisi euacuentur) sunt futuri, nunc ipse sermo habetur. Ver enim cum sit temperatissimum, hos oportet ut anticipemus adueniente Vere euacuare, vel per venæ sectionem, si plenitudinis passionibus subiiciuntur, vel per purgationem, si eis quæ ex corruptione pronemunt. Nam venæ sectio commune auxilium est eorum, qui ex plenitudine fiunt, morborum: Purgatio verò eorum qui ab humoribus praua aliqua qualitate affectis ortum habent. Nonnullis siquidem confert humores pituitosos euacuare, nonnullis verò amaram bilem, nonnullis atram, nonnullis serosam superfluitatem, secundum naturam earum quæ consueuerunt superuenire passionum. Quod ut exemplo planum fiat, Aliquis singulis annis incidit in melancholiam, nisi purgetur, is, si ex contemptu aliquando purgationem omiserit, et morbum non anticipauerit, symptoma morbi presentis. Quare non Vere modo, sed etiam Autumno purgatio ei anteuertenda est.

L V.

Ἐπὶ ἰμίτῳ λυγρῇ καὶ ὀφθαλμοὶ ἱρυθροί, κακός.

A vomitu, singultus & oculorum rubor, malum. 3. 7.

Qualis est passio conuulsio musculi, talis est singultus stomachi, qui aduenit, humoribus infestantibus nonnunquam totum ipsum ventriculum, nonnunquam os eius & gulam: quos per vomitiones abijciens, statim à singultu liberatur. Qui si neq; per has cessauerit, duorum alterum ostēdit, vel scilicet cerebrum (nervorum principium) vel ventriculum pati non mediocrem inflammationem. Rubor vero oculorum utrāq; sequitur dispositionem, sed precipuè illam qua existit in cerebro.

LVI.

Ἐπὶ αἰμῆτος πῦρ πνεύματος ἢ καὶ αἰμῆτος κακόν.

A profluuiio sanguinis, desipientia ac conuulsio, malum. 9. 7.

Desipientia post sanguinis fluxum non bonus est casus, etiam si sola contigerit, multò autem minus conuulsio, vel si absq; desipientia facta fuerit. Maximum verò malum est ambarum conuentus, ubi etiam ex immoderata euacuatione conuulsio casus est admodum exitialis. quippe, quum fiat ab inanitione, defectum & siccitatem corporis, magnamq; virium imbecillitatem significat.

LVII.

Ἐπὶ ἀκέραιᾳ ὑποχειρήσει δυσεντερία, κακόν.

A deiectione syncera, difficultas intestinorum, malum. 23. 7.

Deiectiones synceras solet Hippocrates nominare impermixtas aquosa humiditati, qua solum habent syncerum illum, qui infra deicitur, humorem: siue sit flava bilis, siue atra. Nihil igitur mirum si in talibus deiectionibus aliquod intestinum exedatur ab humore, qui suo transitu, morsus, erosiones, & exulcerationes efficit: unde dysenteria.

LVIII.

Ἐκ φαρμακότητος ἀσπομένης, θανάτῳ δίδυ.

Ex medicamento potione conuulsio lethalis est. 25. 7.

Medicamenti potiones & medicationes consuevit Hippocrates nominare eas tantum, qua purgantibus fiunt medicamentis. Quod verò conuulsio, qua fit istis supra modum euacuantibus, lethalis existat, iam dictum est abundè, significat enim siccitatē insanabilem.

LIX.

Οκλίσειον ἀφρώδεια : ἀ διαχωρήματα ἐν τῇ
σι

α διαρροίῃσι, τυλλέουσιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ταύ-
τη κατὰ ῥέειν.

Quibus in alui profluviis excrementa
spumosa sunt, iis ex capite pituita de-
fluit. 30. 7.

Hoc indistinctè dictum est : Fiunt enim
aliquando excrementa spumosa pituitoso hu-
more ex capite ad ventriculum defluente:
sunt autem & vasis, quæ ad ipsum perue-
niunt, ilium effundentibus. Conflari etiam in-
terdum possunt in ipso ventriculo cùm vnam
habeant, ut ita dicam, causam continentem,
antecedentes verò plures. Est autem huius pi-
tuitæ causa continens spiritus flatuosus, dum
humori commiscetur vehementem habens mo-
tum & inaequalem, ita quòd ipse dirumpitur,
& pituitam frangit in multas partes ac par-
uas ampullas. Ipsius verò motus causa est pro-
pria natura, & interdum multitudo calo-
ris: sic enim & in his quæ elixantur apparet
spuma, & in Mari violentis ventis agitato.

L X.

Οκόσοι αἷμα ἱμῖναι, ἐν μὲν ἄνδρ' πυριτοῦ
πυτήριον· εἰ δ' ἕωκ' πυριτὰς, κακόν. Διεσπύον
δὲ τοῖσι ψυχλὺν, καὶ τοῖσι στυγνῶν.

Quicūq; euomunt sanguinem, si sine
febre quidem, salutare: si verò cum fe-
bre,

Bre, malum. Curare verò acerbis & refrigerantibus. 37. 7.

Febre vacantibus liquet nullam adesse inflammationem in loco unde emittitur sanguis. Quare vel alicuius vasis ore adaperito fit sanguinis vomitus, vel ex ulcere quidem, sed sine inflammatione. Quare id bonum, hoc est minus malum, censendum est. Curantur enim quæ sunt absq; inflammatione ulcera, facile acerbis. Quæcunq; verò cum inflammatione sunt simul ac febribus, non solum curari non possunt, sed ne sic quidem permanere: semper enim maiora fiunt ac maligniora.

LXI.

Οκόσοι ἔμπυοι καίον) ἢ περνοῦνται, ἢν μὲν τὸ πύον καθαρόν ᾖ ἢ καὶ λευκόν, ἀφεργίονται. ἢν δὲ ὑφαίμεον καὶ βορβορώδες, ἢ δυσώδεις, ἀποδύνονται.

Quicunque suppurati videntur vel secantur, si pus purum fluxerit, & album, euadunt: si verò subcruentum & sæculentum & fœtidum, pereunt. 45. 7.

Suppuratos nominat quibus inter thoracem atque pulmonem acervatum est pus: hec si purum effluxerit, & album, post vñtionem aut sectionem, euadunt: significat enim quòd natura valida fuit & morbum devicit: si
verò

verò prius quod effluit, subernentum, seculentum & sœtidum fuerit, pereunt: significat enim morbi ac putredinis victoriam, facultatumq; casum ac naturæ ruinam.

LXII.

Στεκνυθῆναι καὶ δισχεῖν θώρηξ καὶ φλεβοτμήν λυφ. τέμνει δὲ τὰ εἰσω φλέβας.

Vrinæ stillicidium, & mingendi difficultatem vini potio & venæ sectio soluit, incidere verò interiores. 49. 7.

Stillicidium urine quod ab intemperie fit, præsertim frigida, & mingendi difficultas quæ à crassis humoribus & flatuoso spiritu fit, vini potione solvantur: Nam vinum suo calore frigiditatem ex hisce dispositionibus discutit, ac obstructione liberat meatum. inflammatio verò si accedat, venæ eius quæ in poplite est aut malleolo, sectione sanabitur.

LXIII.

Τοῖσι σώμασι τῶν ἐν ἡρώεσσι τὰ σπέρματα ἔχουσι δὲ λυμὸν ἐμπροσθεν. λυμὸς γὰρ ἐκτραφὴν τὰ σπέρματα.

Corporibus carnes humidæ habentibus famem adhibere convenit: fames enim corpora siccatur. 59. 7.

Quòd quidem omnia quæ exsiccant sint passionum humidarum remedia, est manifestum : Siquidem contraria contrariorum remedia sunt. Quòd autem & moderata fames ex accidenti corpora exsiccet : est minimè dubium : nam calor nativus non habens quo pasceatur, carniū humiditatem absorbit.

LXIIII.

Ἰδρῶς πολὺς θερμὸς ἢ ψυχρὸς ῥίωι αἰεὶ, σημαίνει ἔχει πλεονασμὸν ὕδατος. ἀπάγει αὐτὸν ἢ τῷ μὲν ἰσχυρῶς, αἰωθεῖ, τῷ δὲ ἀδυνάμει, κάττωθι.

Sudor multus, calidus vel frigidus, semper fluens, repletionem humorum esse significat : abducere igitur oportet, robusto quidem, supernè, debili verò, infernè. 7.

Quòd necessarium sit superfluas corporis humiditates evacuare, est manifestum. An verò robustiū supernè tantum, debilibus autem infernè, id dignum est animadversione : nam hac ratione roboris, & debilitatiū non videtur esse distinguendus remediorum usus, sed humores eo ducendos esse quò sua sponte repunt, facileq; vacuantur. Ideo censetur hic Aphorismus unus ex adiectis.

L X V.

Καὶ εἴσι τὰ ὑποχωρήματα, ἢ ἐλάσης εἴκει
 καὶ μὴ κινήσης αἰνεῖ ὑφίσταται ξύσματα καὶ ἢ
 ὀλίγα ἢ, ὀλίγη ἢ νοῦσος γίνεται. ἢ δὲ πολλὰ,
 πολλή, φυτίοις συμφέρει ὑποκαθῆται τὴν
 κοιλίην. ἢ δὲ μὴ καθάρη ποιήσας διδῶς τὰ
 ροφήματα, ὅσοι ἂν πλείω διδῶς, μᾶλλον
 βλάψῃς.

Et quibus deiectiones si stare permi-
 seris & non moueris, veluti strigmenta
 subsistunt, & si pauca sint, paucus est
 morbus : Si multa, multus : iis con-
 fert alui purgatio. Quod si aluo non
 purgata dederis sorbitiones, quanto plu-
 res dederis, tantò magis nocebis. 7.

Hic tam nominum quàm verborum vsus
 improprius ostendit fuisse imperfectum præ-
 sentem Aphorismum, atq; in ordinem suppo-
 sitionum meritò redigendum esse.

L X V I.

Ὅσοι ἂν κάτω ὡμὰ διαχωρή, ὅπχολῃς
 μαλαίτης ἔγινῃ, ἢ πλείω, πλείων, ἢ ἐλάσων,
 ἐλάσων ἢ νοῦσος.

Quibus infra cruda deiciuntur, atra-
 bilis inest : Si plura, maior : si pauciora,
 minor est morbus. 70. 7. 58, 7

Huius scriptor voluit ostendere, quibus cra-
 f 2 da

da deſciuntur , in ijs instrumentis qua co-
quendi vim habent, eſſe atram bilem, ex qua
refrigerata deterius concoquunt.

LXVII.

Οκτώ κ' ἐν τῷσι καὶ πέντε κ' ἐν τῷσι καὶ
πέντε καὶ ἑπτά κ' ἐν τῷσι καὶ ἑπτά κ' ἐν
σπέρματι , καὶ ἢ πη ἀπὸ τῆς φύσεως ἐκβαίνει τὸ
σῶμα , ἢ ὀλίγη , ὀλίγη ἢ νύκτος γίνεται . ἢ δὲ
πολὺ , πολλή . ἢ πᾶν πολὺ , θανάσιμον τὸ
τῷ ὄντι .

Qualiscunq; aut per vesicam , aut per
aluum, aut per carnē, aut per aliā quam
vis corporis partem excretio recedens
à naturæ modo , si parum quidem re-
cedit , parua est ægrotudo : Si mul-
tūm , magna : Si admodum multa , le-
thalis.

Cum sanitas sit mediocritas quedam , in
omnibus corporis excretionibus parum à na-
turæ modo recessus , vel in qualitate
vel quantitate , paruum quidem ,

et magnus magnus , sed ad-
modum multus lethalis

lem morbum

indicat.

*

HIP



HIPPOCRATIS

APHORISMORVM

PARS SECVN-

DA;

In qua exponuntur ij qui locis affectis conueniunt, primum capiti, dein reliquis particulis sigillatim.

Capiti.

IΑ ὁποῖον τὴ κεφαλῇς ὀδυνημένῳ, ἢ ἐν μετὰ πρὸ ὀρθῇ φλεψὶ τμηθεῖσθαι, ὠφελίς.

Dolenti posteriorem capitis partem, recta in fronte vena secta prodest.

68. §.

Non solum studet Hippocrates, ubi sit opus euacuare, sed etiam cum auersione. Auersio autem ad contraria fit: secundum longitudinem quidem, infra supraq;: secundum latitudinem verò, ad dextram & sinistram: secundum profunditatem, ad anteriora & posteriora. In dolore itaq; partis capitis posterioris, quando humor affligens in capite continetur,

f. §. vena

vena recta in fronte secta prodest, hoc est, ea
 vena quæ secundam rectitudinem filamentorum
 respondet ei quæ partem affectam alit:
 Sicuti & in anteriori dolore capitis vena in
 occipite secta iuvat. Sic enim diuturnæ ocu-
 lorum fluxiones sæpius sanatae sunt ex occipite
 sanguine misso, una cum cucurbitula usu.
 Porro si plethoricum esset corpus, non esset
 huic remedio locus, nisi prius liberatis obstru-
 ctionibus & purgato corpore uniuerso.

II.

Κεφαλῇ ποταίνῃ καὶ περιδυνίῳ, πύον ἢ
 ὕδωρ ἢ αἷμα ῥυεῖ καὶ τὰς ρῖνας, ἢ καὶ τὸ στόμα,
 ἢ καὶ τὰ ὦτα, λόφ' τὸ νύσσημα.

Caput dolenti & vehementer labo-
 ranti, pus vel aqua, vel sanguis effluens
 per nares, aut os, aut aures, morbum sol-
 uit. 10. 6.

Quando contigerit dolorem capitis fieri, vel
 propter inflammationem, vel humorum cru-
 dorum multitudinem in capite acervatorum,
 tunc inflammatione suppurata, & humore
 excreto, solutio fit morbi. Si verò propter spi-
 ritum flatuosum, aut bilem mordacem, aut
 omnino ex intemperatura dolor acciderit, per
 alia curabitur: Quippe flatus extenuantibus
 & discutientibus, bilis, medicamento eam
 purgante,

purgante, & intemperatura remedijs eam alterantibus, sanabitur.

I I I.

Ο πόσεισις ὑγιαίνουσιν ὁδωσάαι γίνονται ἐξ αἵφνης ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ παραχρῆμα ἄφωτοι γίνονται & ῥέχουσιν, ἀπόλλυνται ἐν ἐπὶ αἱ ἡμέρῃσιν, ἢ καὶ πρὸς ἐπιλόβῃ.

Quicunq; sani dolore capitis repente capiuntur, & statim muti fiunt & stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit. § 1. 6.

Quibus, adhuc sanis, dolor in capite repente accidit cum vocis & actionum voluntarium lesione, q̄ versantur in magno vite periculo, atq; eò maiore, si stertant, & eū sensus unā cum motu perierit: hoc enim est indicium apoplexie manifestum: cuius causam referre oportet non solum ad spiritum flatuosum, sed etiam ad materiam univērsim fluentis multitudinem, quam ad cerebrum fuisse delatam indicant casus dolori supervenientes, qui multam pituitam acervatam esse in ventriculis cerebri commonstrant. Ob id febris succedens, ut quæ calfacit, extenuat atq; resoluit spiritum flatuosum & pituitosos humores, hoc periculo si qua res alia liberare potest.

IIII.

Δύο πόνοι ἄμφοτερόθεν μὴ κτ' ἐν αὐτῷ
τόποι, ὁ πρὸς ὁπότε ἄμφοτεροῖ τ' ἵππον.

Duobus doloribus simul factis, non
eodem loco infestantibus, vehementior
alterum obscurat. 46. 2.

Si duo dolores eodem tempore, eodemq; in
loco molesti sint, ἢ quidem augment loci affli-
ctionem, cum neuter lateat agrotantem : Si
verò sint in locis diversis simul, ut in capite
vnum, alter in brachio, tunc vnum ab altero
obscurari contingit, cum vis sensibilis tota ad
vehementiorem ducatur ac distrahatur. hinc
tacite moneamur, ut quando res ita contigerit,
urgentiori succurramus dolori, non neglecto
tamen altero.

V.

Γάλα διδόναι κεφαλαλγέσι, κακόν. Κακὸν
ἔκ' πυρεταῖσι, καὶ οἷσι ὑποχόνδρια μετέω-
ρα ἀφ' ἐνδοστέων, καὶ τοῖσι διφώδεσι. Κακὸν
ἔκ' οἷσι χολαῖς καὶ ἀσχωρήσεσι, καὶ ἐν τοῖσι
ὀξεσι πυρετοῖσι ἔστι, καὶ οἷσι ἄμφοτεροῖ ποικί-
λα ἀσχωρήσεσι γίνεσθαι. Αἰσθάνεται ἔκ' τοῖσι φθασί-
σι καὶ λίαν ποικίλ' πυρετοῖσι διδόναι γάλα,
καὶ ἐν πυρετοῖσι μακροῖσι καὶ βληχεοῖσι μηδε-
νός τ' ἀποσημειώσθαι παρὲν, παρὰ
λόγον ἔκ' ἐκτετακτοῖσι.

Lac dare caput dolentibus, malum: malum verò & febricitantibus, & quibus hypochondria suspensa murmurant, & siticulosi: malum autem & quibus in febribus acutis biliosæ sunt deiectiones, & quibus sanguinis multi deieccio facta est. Convenit autem tabidis qui non multum febricitant, & in febribus longis & parvis, si nullum ex supradictis signis affuerit, & præter rationem consumptis. 64. 5.

Quando in iis qui integra sanitate fruuntur videmus lac capiti dolorem asserre, & ilium inflare: nihil mirum quòd iis qui iam caput dolent vel suspensa habent, hoc est inflata & flatuosa ilia, sit inimicissimum, ventrem siquidem flatibus implere consuevit, & quia facile enaporat, caput petit ac dolorem auget. Hac ratione quidem bonum est febricitantibus, quia frigidum humidum: Sed hac ratione malum, quia facile acëscit & corrumpitur in ventriculo, prompteq; vertitur in bilem, & quia flatulentum, generat vapores, qui elati in caput, ipsum replent & tendunt. Sitibundum etiam est inimicum, & iis quibus biliosa deiciuntur, & acutè febricitantibus: nam in vniuersum didicimus, quòd celerrimè ab omnibus causis calidis lac ad fumum

f s

mosum

mosum alteratur. Rationabiliter itaq; dicitur
 hi passionibus lac plurimum aduersari. Con-
 uenit autem tabidis qui non valde febrici-
 tant: conuenit & in febribus longis & par-
 uis: conuenit etiam ijs qui alia ex causa su-
 pra modum sunt extenuati, quibus est neces-
 sarius cibus bonus generans succum, & qui
 citò per venas distribuatur, si nullum ex su-
 pradictis signis, ut capitis dolor, febres acutæ,
 tumida hypochondria &c. obsiterit.

V I.

Επί πολλῇ ἰς πλὴν κεφαλῇ ἐκ πολλῆς, ἢ
 παραφροσύνης, κακόν.

Ex capitis ictu obtupescencia & de-
 sipientia malum. 14. 7.

Desipientia quidem agnoscitur loquenti-
 bus agentibusve nihil consentaneum rationi:
 obtupescencia verò, quando neq; aliquid
 dicunt neque agunt, sed aperti oculi quieti
 manent, similes ijs qui ex timore sunt attoniti.
 Hec sunt indicio quòd ictus intrà cerebrum
 penetraverit.

V I I.

Οκόσοις δ' ἂν ὁ ἐγκέφαλος σιωπῇ ὑπὸ ἱνὸς
 εὐφάσιος, ἀνάγκη ἀφάνους γινώσκειν παρα-
 ρήμους.

Quibus

Quibus cerebrum aliqua ex causa concussum est, eos repente mutos fieri est necesse. § 8. 7.

Mutos appellare consuevit, qui iacent eodem modo quo apoplectici, sine sensu pariter & motu voluntario. Hic affectus ab alijs quidem causis fieri potest, sed nunc de eo loquitur qui concussionem cerebri sequitur ab aliquo violento casu vel ictu. Contrahitur enim vi animalis in seipsam, in talibus dispositionibus à motu periculoso molestata, & proinde quiescit. Atq; ideo donec se rursus ipsa vi collegerit, mutum atq; immobile totum iacet quod ita afficitur animal.

VIII.

Οκόσοις ἂν σφακιλιθῇ ὁ ἐκίφαλος, ἐν τρισὶν ἡμέρησιν ἀπόλλυται. ἢ δὲ ταύτας διαφύγῃσιν, ὑγιείς γίνονται.

Quibus cerebrum sphacelatum est, in tribus diebus pereunt: Si verò hos euaserint, sani fiunt. § 9. 7.

Si sphacelus est corruptio substantia vniuscuiusq; partii quæ sphacelari dicitur, non contingit hunc, qui ita egrotat, persanari. Quo fit ut abutantur hoc verbo ad significandam non completam corruptionem, sed huius dispositionis inceptionem. Sicut enim

gan

gangranam, iam ita completam ut pars sit inter mortua, sanare est impossibile, dum verò adhuc sit, possibile est: Sic & sphacelum, dum quis in eum incidit, quanquam mortificationem carnosæ parti quæ provenit ex magnitudine inflammationis, quam propriè medici gangranam nominant, etiam sphacelum Græci vocabant. Quòd verò cita sit ex ipso mors, est manifestum: nempe quoniam morbus est gravissimus, & pars maximè princeps. Quòd si ægrum mors in tribus primis diebus non anticipaverit, sperandum est morbum declinare, & vires esse fortes quæ corruptionem vincere possint.

I X.

Οὐλόσι ποτέ οὐτ' ἐν τῷ σώματι, τὰ ποτὶ τὸ πόνον οὐκ αἰσθάνονται, τυτίοισι ἢ γράμμοισι.

Quicumque dolentes parte aliqua omnino dolorem non sentiunt, his mens ægrotat. 6. 2.

Dolentes hic intelliguntur habentes aliquam affectionem dolorificam: nam verè dolor non est absq; sensu, quum sit planè nihil aliud dolor, quàm rei contristantis & in contrarium naturæ habitum mutantis repentina perceptio: Quòd dormientes si pungas vel co-

laphis

laphis cadat, non doleant, idè fit quia eorum apprehensio id non animaduertit. Proinde in dolore sunt alteratio subita, vel solutio continui, impressio in parte quæ nata est sentire, & apprehensio illius impressionis: Vnde fit vt dolentes & non sentientes repugnantia sint, nisi intelligas dolentes, hoc est, habentes affectus dolorificos, seu qui dolores excitare consueverunt: huiusmodi affectus si adsint & ab ægroto non sentiantur, ei mentem lasam esse significant.

X.

Οκότειν ἂν ὁ ἐγκέφαλος ἀλγοῖ, ταπείνῃσιν ἀνάγκη πυρετὸν καὶ χολῆς ἐκρίναι ἐπιχρίναι δαί.

Quibuscunq; præciditur cerebrum, iis necesse est febrem & bilis vomitum superuenire. §. 6. 6.

Vulnerato cerebro succedit febris ea ratione communi qua quolibet membro principali patiente inflammationem, subsequitur febris. Vomitus autem bilis fit compatiens ventriculo, propter eius cum cerebro communicationem, ore præsertim ipsius, ad quod terminatur ex cerebro quedam effatus digna nervorum coniunctio.

XI.

Εἰ ὁ νοσήσας ἄνθρωπος πόρον ποιῇ, θανάσιμον,

ἢ ὁ ἀφιλίη, ὢ θανάσιμος.

In quo morbos somnus laborē facit,
mortale: Si verò iuuat nō mortale. 1. 2.

Somnus eo tempore quo non conuenit (ut
in principijs accessionum, in quibus horror vel
rigor, vel exteriorum partium refrigeratio con-
tingit) si nocet, nihil nouū, aut graue aliquid
portendit, ut qui non consuevit esse tunc uti-
lis, verūm quo in tempore morbi plurimūm
conferre solet somnus, ut in declinatione, in eo
si præter id quod nihil prodest, etiam nocet,
mortem non absq; ratione significat. Nam per
somnum calor ad intima receptus & quātum
fieri potuit auctus, cūm tamen causas morbum
efficientes euincere præ imbecillitate sui aut
humorum prauitate nequiverit, ostendit quòd
natura, quæ post somnum leuata non est, sed
ex eo peius habet quàm antè, fortiori malo suc-
cumbit. Ex somno autem læsiones sunt, quòd
fibræ aut non dissoluntur, aut etiam exacer-
bantur, & quòd dolores intenduntur, & fla-
xiones multiplicantur, & crescunt inflamma-
tiones. Quidam autem inter dormiendum de-
lira loquuntur, & ubi expergescēti fuerint,
multo tempore in delirio perseuerant. Quos-
dam somnus grauissimus dormientes occupat,
& vix cūm punguntur excitantur. Hæc verò
comitia

contingūt propter humorum prauitatem, qui, dum per somnum minimè concoquuntur à calore naturali, perniciem magnam indicant. Si verò euicti fuerint à natura, & somnum inuerit, hinc sanitatis indicium habebunt, dummodo signa alia salubria eodem conspirent.

X I I.

Οταν παρρησιασθῇ ὁ ὕπνος, ἀγαθόν.

Vbi somnus deliriū sedat, bonū. 2. 1.

Quoddam velut exemplum particulare subiungit antecedenti sermoni, periculosioris morbi nomine alios etiam intelligi volens, quos, si somnus sedauerit, naturam victricem esse significabit.

X I I I.

Υπὸς, ἀρετῆς, ἀμφοτέρω τῷ ματρίον μᾶλλον γινώσκοντες κακόν.

Somnus atq; vigilia utrunq; à modum excesserit, malum. 3. 1.

Non solū de somno & vigilia hoc verum est, sed & de admonendis, sumendis, facien-
dis, educendis omnibus, in quibus quicquid mediocritatem excesserit nocivum esse solet.
Quemadmodū somnus longus dicitur, qui mo-
dum

dum natura convenientem excedit : ita gra-
uis, qui præterquàm quòd immoderatus est,
habet etiam difficilem expurgationem, qua-
lis in Comate soporifero videri potest : fit au-
tem huiusmodi somnus refrigerato cerebro : quæ
refrigeratio cum fuerit fortis, mixta quidem
humiditati, lethargicas passionés inducit : cum
siccitate verò, eas quæ Catochæ seu catalepses
aut deprehensiones vocantur. Caterùm immo-
dica vigilia, quæ vel ex sola intemperie cali-
da cerebri, vel ex humoris biliosi abundantia
cum siccitate fiunt, hoc habent mali, quòd spi-
ritus vitales unà cum calore naturali dissi-
pant, cruditates pariunt, cibi & potus coctio-
nem impediunt.

XIIII.

Ἐπὶ ἀγρυπνίᾳ σπασμὸς ἢ παραφρεσίων
καὶ ἄλλοι.

A vigilia convulsio vel desipientia,
malum. 18. 7.

Cum vigilia sint ex ijs quæ maxime euac-
uant & exiccant, convulsio autem fiat ab
evacuatione & repletionem, nihil mirum si vi-
gilia immoderatas comitetur ipsa convulsio,
ac interdum desipientia, ratione immodice
siccitatis, & quæ in longis vigilijs biliosior
reddatur sanguis.

XV.

Αἱ δὲ τόποι ἀλλοιοῦσι τὰ σώματα καὶ ὑγρὰ
 γίνονται, καὶ βαρύνονται, κατηραίνονται ποῖτοι, καὶ
 τοῖσι σώμασι δυσκίνησιν, καὶ τὰς κινήσεις ὑγρὰ
 γίνονται.

Austrinae constitutiones diffundunt
 corpora & humectant, auditum obtun-
 dunt, capita aggrauant, & vertiginis fa-
 ciunt, oculis atq; corporibus difficilem
 motum praestant. 17. 3.

Australis constitutio hoc magnum malum
 affert, quod languida corpora reddit & ad
 opus omne minus habilia. Non paruum etiam
 malum est aggrauatio capitis & difficilis au-
 ditus. De vertiginibus autem quid dicere oportet?
 utpote quae proxima sunt morbi comitia-
 libus, & his quos apoplexias nominant. Verti-
 go enim est velut obtenebratio quae fit humo-
 ribus cum crasso vapore per caput moto, &
 ideo praecedit epilepsiam & apoplexiam. Dif-
 ficilem etiam operatur & oculorum & totius
 corporis motum: Nam humectato cerebro, &
 nervis multa humiditate expletis, necesse est
 ut in motibus voluntariis sequatur pigritia.

XVI.

Επὶ πνεύμονι φλεγμῇ, κακόν.

A pulmonis inflammatione, phrenitis,

g. malum.

malum. 12. 7.

Inflammatiō pulmonū à calido humore excitata, multos vapores trāsmittit ad caput, ijs cerebrum implet, & facit phrenitidem, malum priore deterius.

XVII.

Ἀπόπληξις δὲ μέγιστε γίνονται ἡλικίῃ τῇ ἀπὸ τεσσαράκοντα ἐτίων ἄρξῃς ἐξέκοντα.

Apoplexiæ in ætatibus maximè fiunt à quadragesimo anno vique ad sexagesimum. 57. 6.

Non omnem apoplexiam, sed quæ ex atrabile fit, contingit aduenire ijs qui hanc agunt ætatem quæ est à quadragesimo anno vsq; ad sexagesimum, quoniam in ijs maximè abundat atræ bilis humor, qui ventriculos cerebri sua crassitie obstruens, hanc ipsam efficit.

XVIII.

Δύο δὲ ἀποπληξίαι ἰσχυρὰ μὲν ἀδυνάτοι, ἀδυνάτα δὲ ἰσχυροί.

Soluere apoplexiam fortem, impossibile: debilem verò, non facile. 42. 2.

Hic Aphorismus est prognosticus, docens medicum, ne temerè curationem eius apoplexiæ attentet quæ curari non potest. In apoplexijs totum corpus sensu priuatur & motu, so-

huius restat anhelitus, qui si & ipse prohibeatur, maxima est apoplexia, quæ curationem non admittit: nam vita consistere non potest sublata respiratione. Omnes autem apoplexiae fiunt vi animali non potente defluere ad partes infra caput existentes, idq; aut propter aliquam dispositionem similem inflammationi quæ in ipso est cerebro constituta, aut ventriculis ipsis oppletis humore pituitoso. Verùm causæ magnitudinem, morbi etiam magnitudo consequitur. Magna siquidem vel parva lesio respirationis vehementem arguit vel leuem apoplexiam: atq; illi quidem nulla salus, huic autem etsi aliqua, non potest tamen nisi dubia promitti.

Cerebro & nervis.

I.

Τῶν ἐπιληπτικῶν ᾤσι νεοῖσιν ἀπαλλαγὴν αἰμιταβολαὶ μάλιστα τ' ἡλικίης, καὶ τ' τόπων, καὶ τ' βίῳ ποίησι.

Quicumque iuvenes morbo comitiali laborant, mutatione maximè ætatis, & temporum, & locorum, & victuum quoque liberantur. 45. 2.

Quia iuuentutis cùm mutatur, cedit ætati considentie, quæ minus calida est, & ob id

ineptior ad superandum humorem illum frigidum & crassum, legatur in textu: Quicumque pueri, non iuvenes: Succedit enim pueritia iuuentuti multò calidior. Neque verò mutationes qualibet morbum solvunt comitiales, sed quæ calidiorum & sicciorum corporis habitum efficiunt, quæ nimirum ad contrarium transferunt. Morbus enim comitialis proximus est quodammodo apoplexiæ, cum idem locus in utroque patiatur, & idem humor in causa sit, frigidus enim & crassus est humor ambobus. Verùm apoplexiæ ob omnimodam carentiam illius potentia quæ ad nervos defluit, unde abolitio sensus & motus: Epilepsia verò, propter motum vitiosum (nervorum principia seipsum quatiente, quò id quod noxiū est excutiat) generatur. Aetatis ergo, locorum, temporum & victuum mutationes ad contrarium liberant huic malo obnoxios pueros: quia contraria contrariis curantur.

II.

Τὰ ἐπιληπτικὰ ὀκλόσοισι πρὸς τῆς ἡῶς γίνε-
ται, μετὰ τεσσιν ἔχῃ. ὀκλόσοισι δὲ πάντα καὶ εἰσ-
σιν ἰτίαν γίνεται, τέττοις τὰ πολλὰ ζῶοντο-
σθένει.

Quibuscumque morbi comitiales fiunt ante pubertatem, mutationem accipiunt: quibuscumque autem anno vigesimo quin-
to,

to, ferè commoriuntur. 7. 5.

Nunc solùm eius mutationis meminit quæ ex ætate accidit, à qua docti, & formam vitæ, regionum, & temporum rationem unà cum alijs remedijs inueniemur. Quippe morbo comitiali non liberantur omnes ex ætatis commutatione, in eam quæ calida est & sicca, nisi & in alijs rectè se gesserint. Sed si omnibus alijs magna diligentia adhibitis presidijs, mutatione ætatis morbus hic sanetur, certè is maxime sanabitur, quem tempore pubertatis sanari contigerit. Qui verò ultra pubertatem processerit, aut post vigesimum quintum annum acciderit in iuventute, ætate calida sicca, is profectò durat magna ex parte ad finem usque vitæ. Nam iuuentus contraria quàm eum non profligarit, quomodo sequens ætas similis, nempe frigida humida, ad exitum adducet quem veluti similem sibi, conseruare nata est?

III.

Περὶ τοῦ ἐπὶ ἀσθενείᾳ βίβλιον γράψας, ἢ ἀσθενείᾳ ἐπὶ πυρετῷ.

Febrem conuulsioni superuenire melius est, quàm feбри cōuulsionem. 26. 2.

Cùm sanum aliquem repente conuelli acciderit, huiuscemodi conuulsionē fieri ex repletionē partium nervosarum est necessarium.

Etenim nervi replentur frigidis & glutinosis humoribus, unde contracti versus originem suam nobis nolentibus convulsionem patiuntur. Hisce igitur febri sponte natura superveniens solita est magna ex parte calfacere, extenuare, digerere superfluam humiditatem, atque adeo convulsionem ipsam sanare, affectus affectum. Si verò ex febribus ardentibus totum corpus exsiccetur, & nervi deinde ex siccitate convulsio accidat, hoc maximum est malum & penè insanabile, quoniam longum tempus exigitur ad consummatam nervorum siccitatem remouendam: quinimo habitualis humiditas, si semel absorpta fuerit, vix unquam recuperari potest: morbi autem acerbitas inducias non admittit, sed vires dissolvit, & subitum exitum affert.

I I I I.

Υπὸ σπασμῶν ἢ τεταίνε ἐνεχλαμίνῃ πυρετὸς ἐπιγινώσκῃ, λυτὸ τὸ νόσημα.

Qui à convulsione aut distensione tenetur nervorum, febre superveniente liberatur. §7. 4.

Cum morbi ex repletionem, curentur evacuatione, rectè supervenit convulsioni febris, quæ suo calore digerat aut absorbat materiam illam crassam convulsioni ex repletionem facta: Nam bona ratione dictum est superius, convulsiones

ulsiones quæ febres antecedunt non esse lethales, eas autem quæ sequuntur, vt quæ sunt à siccitate, valde perniciosas esse. Porro conuulsiones sunt numero tres, Opisthotonus, tensio ad posteriora: Emprosthotonus, tensio ad anteriora: Tetanus, æqualis tensio.

V.

Σπασμὸς ἢ ἐκ ἰσχυρῶς, θανάσιμος.

Conuulsio à veratro, lethalis est. 1. 5.

Conuulsio passio est inuoluntaria, nervosis partibus ad similem dispositionem venientibus quam etiam in motibus voluntarijs assumunt. Hæc primaria ratione dicta, duas habet causas, plenitudinem & inanitionem seu exsiccationem. Sicut enim foris videmus lora & chordas tendi vbi multa turgent humiditate, aut vbi exsiccantur vehementius æquo (nam propter hanc causam sæpe rumpuntur) sic in corporibus nervosis par est fieri non raro conuulsionem. Verum præter hanc, alia est conuulsio, quæ per consensum partium alicuius accidit, non ob materiam quæ implere possit nervosas partes, neq; ob inanitionem, sed à qualitate quadam, partibus videlicet quæ communicationem habent, alteratis & compatiensibus. In itaq; qui helleboro purgati sunt, ista conuulsio videtur accidere posse, utpote per

ipsam vomitus vehementiam nervis laborantibus, ob consensum quem habent cum ore ventriculi: quæ convulsio per consensum lethalis non est. Cum verò sit ob immodicam vacationem, aut pharmaci efficaciam ex nervis etiam humiditates attrahentis, ac ipsorum substantiam violentius exsiccantis, hæc una sanari vix unquam potest, quòd sicca intemperiei consummata remedium nullum sit in aegris, non magis quàm senij in sanis.

VI.

Επί τραύματι σπασμός επιγινώσκος, διασσιμεον.

Convulsio ex vulnere lethalis est. 2. 5.

Convulsiones ex vulneribus factæ, ratione sequentis ipsa inflammationis, ubi partes nervosas attigerit, magna ex parte lethales sunt.

VII.

Ὡς μὲν ὅταν ἐξαίφνης ἀφανὸς τις γένηται, σπασμοῖς ἀποθνήσκει, ἢ μὲν πυρετὸς ἐπιλάβῃ, ἢ ἐς τὴν ὥρην ἐλθὼν καὶ ἢ αἱ κρυπαῖλαι λύονται, φέγγει.

Si ebrius quispiam repente obmutuerit, convulsus moritur, nisi febre corripiatur, aut ubi ad horam pervenerit qua crapulæ solvuntur, vocẽ recuperet. 5. 5.

Vinum

Vinum generosum omnes partes nervosas replet facile, corripit & cerebrum (nervorum principium) unde convulsio & totius corporis stupor accidit. Convulsioni verò succedit mors, nisi febris supervenerit, quæ suo calore coquat, absumat, & dissipet illud humidum: aut nisi hora qua crapula solvuntur, illo stupore liberatus iterum loquatur: Nam solutio lingue argumento est quod victrix natura totam materiam frigidam vel extenuavit vel discusserit.

VIII.

Οκόσοι ὑπὸ τετάνῃ ἀλίσκονται, ἐν τέσσαρσιν ἡμέρησιν ἀπόλλυνται. ἢν δὲ ταύτης διαφύγωσιν, ὑγίαις γίνονται.

Quicunque Tetano corripuntur, in quatuor diebus pereunt: Si verò hos effugerint, sani fiunt. 6. 5.

Fieri non potest ut in morbis peracutis, cuiusmodi est distentio, indicatio differatur in longum tempus. In primo igitur circuitu dierum indicatoriorum hæc passio indicatur ad mortem vel ad salutem, non tolerante natura diutius tensionis laborem: sed si ultra diem quartum progrediuntur, certissima spes est naturam superasse morbum.

IX.

Τὸ διεμὸν βλάβῃ ταύταις τοῖσι πλείονας

ζεομαίνονται, ἄρσεν ἰκθύνωσιν, νύκταν ἀ-
κρίττον, γνώμης νάρκωσις, αἰμορραγίας, λή-
ποθυμίας, ταῦτα οἷσι θάνατος.

Calidum, ubi quis sæpius eo utatur,
hæc mala affert, carniū effœminatio-
nem, neruorum incontinentiam, mentis
torporem, profluuia sanguinis, animi
defectiones, quibus succedit mors. 16. 5.

Vsus immodicus aqua calida in balneo, car-
niū effœminationem affert, hoc est, molliū
aut laxitatem, neruorum imbecillitatem: ca-
lidum enim externum dissoluit & trahit ad
cutim calorem internum, unde imbecillitas
succedit neruorum pariter & cerebri, substan-
tia videlicet ipsius dissoluta. Excitat & san-
guinis profusiones, à calore laxatis & dilata-
tis venis: Sanguinis autem profusiones im-
modicas, in quibus multi spiritus dissipantur,
animi defectiones sequuntur: has subsequi so-
let mors, nonnullas quidem citius, alias verò
tardius. Proinde monemur in omnibus rebus
quantūvis bonis videndum esse quatenus:
etsi enim sum cuiq; modus est, tamen magis
offendit nimium quàm parum.

X.

Τὸ δὲ ψυχρὸν πρᾶσμις, λιτάτης, μελασμις,
καὶ ῥίση πρὸς ἰάσιν.

Frigi

Frigidum conuulsiones, distentiones, liuores & rigores febriles efficit. 17. §.

Frigidum indurat ex concretionē, siccatur etiam, (ut apparet in gelu) unde spasmus accidit refrigeratis & induratis nervis. Sicut enim non oportet ipsorum substantiam ab immodico calore dissolui, sic neq; ultra modum conuenientem refrigerari & in vnum cogi ac cohiberi. Ad hoc ex refrigeratione fit cutis liuore & nigrore decolorata: sunt & rigores, qui, prohibita transpiratione, dum corpus externo frigore obrigescit, febres excitant.

X I.

Επὶ ἧ ὄκνη ἐπὶ πᾶσι ἀνδρὶ ἑλκίος ἐστὶν ἀσθενέων θέρει & μίση, ψυχροῦ πολλοῦ κατὰ χυσις ἐπανάκλησιν θερμῆς ποιεῖται. Θέρμῃ δὲ ταῦτα ῥύεται.

Nonnunquàm in Tetano sine vlcere, iuvene bene carnosio, Aestate media, frigida aquæ multa perfusio caloris reuocationem facit. Calor autem hæc sanat. 21. §.

Iuuenibus temperatis in Aestate media, aspersio frigida cutem refrigerat & constringit, quæ constricta calorem colligit & augeat: calor autem per antiperistalsin auctus conuulsioni remedio est, si fuerit ager iuuenis ac mediocris

diocri corporis habitu præditus in aëre calido:
Nam aqua frigida occursum ut vincit & ex-
tinguit calorem imminutum, ita colligit, cum
fortis est, ipsum diffusi prohibens. Calor ergo
per se passionem hanc sanat: Aqua verò per
accidens. Porro non hîc intelliguntur ea quæ
cum ulcere sunt conuulsiones, ut quæ nun-
quam ab aqua frigida sanari queant. Quod ma-
nifestum est ex eo aphorismo: Frigidum ulceri-
bus mordax dolorem facit insuppurabilem.

XII.

Οκόςσιον οἰδήματα ἐφ' ἑλκυσὶ φαίνονται, ἢ
μάλα σπώνται, ἢ δὲ μαίνοι. τετρίων δ' ἀφανι-
θέντων ἐξαίφνης, τοῖσι μὲν ὅπιοθεν σπασμοί,
τίτασοι, τοῖσι δ' ἑμπεσοδὸν μαίγια, ὁδύται πλο-
εῖ ὁξεία, ἢ ἐμπύσεις, ἢ δυσεντερία ἢ ἐνυθρῆ ἢ
τὰ οἰδήματα.

Quibus tumores in ulceribus appa-
rent, ij rarò conuelluntur neq; insaniunt:
si verò repentè euanescent, iis quidem
quibus à tergo ulcera fuerint, conuul-
siones & distentiones accidunt: quibus
verò in anterioribus partibus ulcera
fuerint, mania, aut lateris dolor acutus,
aut suppuratio, aut dysenteria si rubri
fuerint tumores. 65. 5.

Quibus tumores in ulceribus apparent, ij
rarò

tarò conuellantur neq; insaniunt, quia materia conuulsionis circa vlcera ipsa haeret, nec ad uernosas partes aut cerebrum transmittitur. Si verò tumores repente euanescant qui prius apparebant in dorso, conuulsionem excitabunt in neruosis partibus maximè: posteriora siquidem neruosa sunt, anteriora venosa atq; arteriosa. Qui autem in anterioribus partibus euanescent, insaniam, si humor feratur ad caput, inducent: aut lateris dolorem, si idem ad thoracem conuertatur. Sed si non dissoluatur humor, intra thoracem & pulmonem se recipiente puris materia, suppurationem facient. Caterum ad intestina translatis humoribus noxijs dysenteria accidet cruenta, si tumores rubri fuerint.

XIII.

Σπασμὸς γίνεται ἢ ὑπὸ πλεθράσιος, ἢ κατάρσιος. ἔτι δὲ καὶ λυσιμέος.

Conuulsio fit vel ex repletionem, vel inanitionem. Ita verò singultus. 39. 6.

Quemadmodum conuulsio duas habet causas; plenitudinem & inanitionem, nimirum uernis crassa materia oppletis, aut supra modum exsiccatis, & ad suum principium contractis, ita & singultus. Singultus enim quasi quaedam conuulsio est ventriculi cibos cum saltu

salta motuq; concussio retinentis. Nam ventriculus eo motu tentat ea quæ sunt in ipsius ore penitus impacta expellere, subindeq; validè excitatur, ut eo succussu quod nocuum est vacuetur. Potest tamen fieri singultus & ab alijs causis, ut à corruptis in ventriculo cibis, à mordacibus humoribus, à frigiditate, &c.

XIIII.

Ἐπὶ καύμῳσι ἰχυροῖσι σπασμὸς, ἢ τέτανος, κακόν.

A vehementibus æstibus convulsio aut distentio, malum. 13. 7.

Nonnulli quidem æstus idem quod febres intellexerunt. Nonnulli verò æris ambientis fervorem ita nominari dixerunt: Alij pro cauterijs & escharis: & omnes verum dicunt: superveniunt enim hi omnibus haudquam in bonum, Tetani ac convulsiones propter nervorum siccitatem, quas diximus esse pessimas.

XV.

Αἱ παραφροσύναι, αἱ μὲν μὲν γέλωτες καὶ ὄργαι ἀσφαλισταί, αἱ δὲ καὶ ἀσθῆς, ἐπιτφαλίσται.

Desipientiæ quæ cum risu fiunt, securiores: Quæ verò serio, periculosiores. 53. 6.

Fiunt omnes desipientiæ patiente cerebro, siue per seipsum, siue per compatiendi rationem, differunt autem inuicem per causas ipsas efficientes: Nam quæ fiunt à sanguine parùm adastò, aut à sola caliditate sine humore vitioso, similes sunt eis quodammodo quæ ex ebrietate contingunt cum risu. Quæ vero ex flaua bile seriò perficiuntur, ipsaq; multùm exusta, ut iam magis ad atræ bilis naturam accedat, sunt insaniæ valdè furiosæ & periculosæ, quoniam à prauo humore procreate sunt. Duplex enim cum sit atræ bilis, vna quæ est veluti fax sanguinis, quam, cum volumus exquisitè loqui, nondum atram bilem nominamus, sed humorem melancholicum: nominibus verò abutentes atram bilem aliquando etiam vocamus, quoniam si non prius vacuetur, paulò post atræ futura est. Ceterùm altera est ex flaua bile superassata genita, quæ omnium est pessima, & vnde saeuissima nascuntur symptomata. Desipientiæ quæ ab hoc humore gignuntur sunt periculosiores.

XVI.

Τοῖσι μαρτυμένοισι κισσῶν ἢ αἰμορροΐδων ἐπιγενομένων, τὴ μανίης λύσις.

Insanientibus si varices vel hæmorrhoides superuenierint, insaniæ solutio. 21. 6.

Hic

Hic insaniam, quæ propriè melancholia dicitur, vocat, non illum qui fit ex bile furorem. Est autem varix cum vena latiores sunt in femore & cruribus: quod ex crasso & melancholico humore contingit, adeo quod pellente natura ad partes ignobiliores eos qui insaniam efficiunt humores, & præsertim cum melancholici fuerint ac crassi, varicum aut hemorrhoidum generatio sequitur, & insania solutio.

XVII.

Επὶ μεγάλῃ δυσεντερίᾳ, ἢ ὕδρωϊ, ἢ ἰκτερίᾳ, ἀγαθόν.

A furore difficultas intestinorum, vel aqua inter cutem, vel mentis alienatio, bonum. 5. 7.

Difficultatem quidem intestinorum, vel aquam inter cutem transmutationis ratione esse furoris sanationem, non est extra rationem, cum à capite noxi humores transferantur ad inferiora. Mentis autem alienatio, quæ est motus ac vehemens perturbatio, qualis accidit iis quibus paulò post adfutura est crisis, significat quod natura in hoc est, ut humorem peccantem discretum paulò post euacuet per indicationem.

XVIII.

Ἡ φέβος καὶ δυσθυμία πολλὰ χρόνον δια-
πλήττει.

τιλὴν, μελαγχολικὸν τὸ φῆναι.

Si timor atque mœstitia longo tempore perseverant, melancholiam significant. 23. 6.

Metus & mœstitia si longum tempus perseverent absq; causa manifesta externa, sunt atra bilis casus manifesti: Sed si propter aliquam causam incipientes deinde inueterascent, insaniam melancholicam portendent. Nam plures visi sunt furore correpti, qui ab excandescencia, vel ira, vel mœstitia principium habuere, ipso scilicet corpore ad id inclinato ut in talem passionem incideret.

XIX.

Τοῖσι μελαγχολικοῖσι προσήμειον ἐστὶν αἱ δειπνικνόμενοι αἱ ἀποσκῆψιν ἢ ὑποπαθέειν ὃ σώμμετος ἢ ἀπασμὸν, ἢ μανίαν, ἢ τύφλωσιν σημαίνει.

In morbis melancholicis ad partes corporis decubitus humorum sunt periculosi: aut enim apoplexiam, aut convulsionem, aut furorem, aut cæcitatem significant. 36. 6.

Si materia illa, quæ committit morbum melancholicum, transferatur in nervos, convulsio: si in ventres cerebri, apoplexia vel furor: præsertim cum supra modum exusta fuerit:

si in oculos, cecitas: atque sic pro vario decubita
materia diuersi morbi excitantur.

Oculis.

I.

Οδυνὰς ὀφθαλμῶν ἀκρεῖς ποτὶν, ἢ λυγρὸν
πυρρὸν, ἢ φαρμακεῖν λυγρὸν.

21
φλεβοτομία

Dolores oculorum meri potio, aut
balneum, aut fomentum, aut venæ se-
ctio, aut medicamentum, purgatorium
soluit. 31. 6.

Non sunt hæc usurpanda remedia sine de-
terminatione, cum oculorum dolores aliqui
meri potu soluantur, alij balneo, nonnulli
venæ sectione aut medicamento. Nam quibus
sanguinis crassioris copia in oculorum vena-
lis continetur sine plethorica dispositione in
toto corpore, quæ vini potu iuuantur, utpote quod
excalficere, diffundere sanguinem, et sui mo-
tus rebolementia obstructions aperire ac dige-
rere possit. Balneum autem confert ijs in qui-
bus cum nulla cruditatis signa appareant, nec
sit plenum corpus, in oculos tamen influunt
acres humores, qui balneo dulci aquæ fusi aut
excernuntur aut certè diluti mitigantur. Porro
fomentum calidum locus est, ubi fluxum constite-
rit, ut discussio fiat eius quod in oculorum tu-
nicâ superfluum derelictum est: vel si aliquid
adhibeo

adhuc influit, fomentum adhiberi potest, non ut causa salubris, sed ut qualis sit agri dispositio certius inde cognoscatur. Hic (ut ubiuis alibi) cautè se gerat medicus, ne dum fomento dolori medetur, alteram fluxionem irriter. Nam qua ratione fatus potest id quod in oculis continetur discentere, eadem potest ex vicinis attrahere nouam fluxionem. Prodest ergo vel tanquam causa sanitatis oculorum, vel tanquam signum ad dignotionem, unde nos dispositionem agri comprehendentes ad totius corporis euacuationem perueniamus: ipso quidem sanguine redundante, per venæ sectionem: sed malicia humorum infestante, per purgationem eius qui molestus erit: neq; enim est difficile admodum distinguere cacochymiam à plethora.

I I.

Οδυνὰς ὁφθαλμῶν ἀκέραι ποῖσας καὶ λεί-
πας παρὰ τὴν θερμότητα, φλεβοτόμη.

Dolores oculorum post meri potio-
nem & aquæ calidæ balneum, venæ se-
ctione curato. 7.

Cùm tria hæc remedia nusquàm in una
dispositione conueniant, hic Aphorismus vi-
detur ex ijs unus esse qui fuerunt interiecti:
neq; enim vinum neq; balneum tolerat ple-

thorica dispositio absq; maximo detrimento, verum hæc auxilia sunt sanguinis crassi in aliqua parte compacti, cum non adest totius corporis repletio. Quare si absq; plenitudine dolor fiat propter obstructionem ac compactiorem crassi sanguinis, tum balneum utile erit & vinum, inutilis autem vena sectio: si verò plenitudo fuerit, utilis quidem erit vena sectio, inutile autem balneum & vinum.

III.

Οφθαλμοὶντα ἰπὸ διαρροῆς λαφθῆναι, ἀ-
γαθόν.

Lippientem alui profluuium corripit, bonum. 17. 6.

Que rectè à natura fiūt, ea medicus imite-
tur in lippitudine, aluum subducens, ut humor
à quo fit talis affectus, ad inferiora deriuetur.

IIII.

Συγπεῖν δὲ καὶ καὶ τὰς ὑποφάσις τῶν ὀφ-
θαλμῶν ἢ τῶν ὑποφάσις ἢ τῶν ὑποφάσις
ταῖς ὑποφάσις τῶν βλεφάρων ἢ λάρυ-
νξ ἐκ διαρροῆς τῶν ὀφθ. ἢ ἐκ φαρμακωποσίας
φλαυροὶ τὸ σημεῖον καὶ διακρίσεως σφόδρα.

Considerare oportet oculorum in
dormientibus inspectiones: nam si quid
album commissis palpebris subinspi-
tur,

tur, neque ex alui profluuiio aut medicamento potione istud contingat, malum est signum & lethale valde. § 2. 6.

Cum oculi per somnum integrè claudi non possunt, sed albedinis aliquid in aperto relinquunt, id (modo ne præcesserit immodica quedam euacuatio) significat palpebrarum siccitatem, aut potentia ipsas mouentis imbecillitatem extremam in cerebro.

Naribus.

I.

Οἱ τοὶ πῖναι ὑπερτέρας φύου, καὶ ἡ γὰρ ἡ ὑπερτέρας, ὑπὸ αἰνῶτος νοσησὶν πορ. οἱ τοὶ δὲ τὸ ἀνασῶτα, ὑπερτέρας.

Quibus nares natura humidiores, & genitura humidior, minus integra sanitate fruuntur: Quibus verò contrà accidit, salubrius degunt. 2. 6.

Qui laborant humida intemperie pluribus morbis sunt obnoxij: nam distillationibus ex parua occasione capiuntur: & si superfuitas eis ad inferiora descendat, partes subiectæ faciliè offenduntur, fauces, guttur, aspera arteria, pulmo, gula, ventriculus. Tussis itaq; in ipsis fieri, & difficiles anhelitus, & anginas cruditatesq; & ventris profluuia, est necessa-

rium. Præterea corpori vniuersi humiditas febribus putridis & alijs morbi à putredine nati obnoxia est, necnon gravitati capitis, quæ subindè comitiam morbum inuehit. Qui verò sicci sunt, quæ dolent minus sæpe quidem, sed periculosius. Porro nares humide vel sicce cerebri dispositionem indicant. Semen autem genitale cum decidat ex omnibus corporis partibus, fidele testimonium habet de temperatura totius corporis. Alioqui ex temperatura partis vnius, frustra aut non nisi dubiè pronunciaremus de totius corporis temperamento, ut Phidias statuarius ex vngue leonem totum æstimantes: ut docetur in libro de temperamentis.

II.

Βραχὺς καὶ λόγος τοῖς σφοδρὰ πρὸς βῆ-
σιν ἔστιν κινῆσι.

Raucedines & grauedines in valde senibus coctionē non admittunt. 40.2.

Raucedines & grauedines, quæ sunt destillationes, illæ quidem à capite ad fauces, hæ verò ad nares, coctionem vix admittunt in valde senibus propter caloris naturalis imbecillitatem & virium: sed ipsos senes ferè comitantur ad mortem, ut alia morborum genera quæ ex frigidis humoribus ortum habent, tussis, asthmata, nephritis, arthritis, coxendi-

tam dolores, &c.

III.

Υπὸ λυγρῶν ἰχυρῶν πικρῶν ἐπιγενόμενοι
λύκοι τ' λυγροί.

Singultienti sternutamenta si super-
uenerint, tollunt singultum. 13. 6.

Autor ipse est singultum ut convulsionem
fieri vel ex inanitione vel plenitudine. Quan-
do igitur à plenitudine fit (magna autem ex
parte ita fit) violento opus est motu, ut ve-
luti conclusæ ipsum efficientes humiditates
diffidentur atque euacuentur: hoc autem facit
sternutatio. Sternutando enim non solum ce-
rebrum, sed & ventriculus ob nervos ad eum
derivatos vehementer concutitur.

III.

Πικρὰς γίνονται ἐκ τ' κεφαλῆς, διαδιρμαι-
νομένης τ' ἐγκεφάλου, ἢ διευγραιομένης τ' ἐν
τῇ κεφαλῇ κινῆ. ὑπερχεῖται γὰρ ὁ αἷρ ὁ ἐννέων
ἔξω, ψοφαὶ δὲ ὅτι δι' αὐτῆς ἡ διέξοδος αὐτῶ
ἐστίν.

Sternutamentum fit ex capite, cere-
bro calfacto, aut humectata capitis par-
te inani. Aër enim intus contentus ex-
trà erumpit, sonat autem quoniam per
angustum exit. 51. 7.

Hic de sternutamento agit quod habet sue generationis principium, naturam appetentem flatuosum spiritum ex capite excernere. Fit enim rarefactus is qui sunt in capite humoribus & natura impetu excretis. Rarefieri verò ipsis accidit concalsactis: calsiunt autem nativo calore excitato & aucto, ob cuius imbecillitatem prius erant superfluitates aggregatae. Cum igitur ait: calsactis eo quod est in capite inani, maxime quidem intelligere oportet de eo qui est in ventriculo cerebri, atque etiam de ambiente ipsum extrinsecus aëre: facile enim est & illi per cerebrum, primum quidem ad ipsos ventriculos, hinc verò subire ad nares. Quia verò vniuersim excidit, & per angustum narium meatum, sonitum edi Hippocrates inquit.

Oris & linguae.

I.

Εν ᾧ τῆσιν ἡλικίῃσι τριάδε συμβαίνει, τῖσι μὲν μικροῖσι ἔργοις παθόντοισι ἄφθαι, ἑμῖσι, βήχει, ἀγρυπνίᾳ, φόβοι, ὀμφαλῇ φλεγμονῇ, ἀπὸ τῶν ὑγρότητες.

In ætatibus autem talia contingunt: Puerulis & recens natis oris vlcera (quæ aphthæ vocantur) vomitus, tussis, vigiliæ, pauciores, vmbilici inflammationes, aurium humiditates. 24. 3.

Aphthæ

Aphthas Græci vocant vlcera quæ superficiem oris occupant ob mollitiem maximè facta instrumentorum, quæ neq; tactum neq; lacrimis sustinent qualitatem, quod non parvam in se serosam continet partem. Hac autem pars vim habet abstergerendi. Quare non mirum si in corporibus mollibus quasdam superficiarias facit exulcerationes.

I I.

Ἡ ἢ γλῶσση ἐξ ἀφρῆς ἀκραίης γίνῃ ἢ ἀπὲς
πληκτῶν ἢ ὁ σώματος, μελαγχολικὸν τὸ τριῶν
γίνεται.

Si lingua repentiè incontinens fiat, aut aliqua corporis pars stupore elanguit, tale est melancholicum. 40. 7.

Incontinentem linguam nominat quæ infirma est ita, ut non possit articulata edere vocem, aut immobilem & omnino resolutam, sicut corporis partem stupidam, etiā resolutam dicit. harum autem passionum eam causam indicat esse, quæ quartani est circuitus: melancholicus enim humor crassus & lentus haud aliter ac pituita sua crassitie, nervos sensuum & motum à cerebro deferentes obstruens impedit, ne vi sensifica & motrix ad linguæ aliarumq; partium musculos pervenire queat.

Dentibus.

1.

Τὸ ψυχρὸν πόλικοι ὀσίοισι, ὀδόντι, νύκτι, ἐγκράτῃ, νύκτι, νύκτι. τὸ δὲ θερμὸν ἀφίκοι.

Frigida inimica ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medullæ: Calida verò utilia. 18. 5.

Omnes hæ partes frigida sunt, quia exan-gues: iuvantur tamen modico contrariorum usu: Quo sit ut calidum sit q̃s convenientius.

Gutture & faucibus.

1.

Ὁκόσοισι κυνάλῃω ἀφύγῃσι ἐς τὴν ἀνέ-
μοιαν πέπτῃ, ἐν ἑπτά ἡμέρησι ἀποθνήσκουσιν.
ἢ δὲ ταύτας ἀφύγῃσι, ἐμπυοὶ γίνονται.

Qui ab angina liberantur, his ad pul-monem malum transit, & intra septem dies moriuntur: Si verò hos evaserint, suppurantur. 10. 5.

Si humor angine transferatur ad pulmo-nes, id exitio esse plerumque ante septimum diem indicat, egro videlicet suffocato ab hu-moribus eò delatis: Si verò id tempus efflu-xerit absq; alio malo fluxione in pus conuer-sa, suppurari, & non mori. Quibus autem ipsum pus non, ut decet, subinde repurgatur,
hos

hos tabidos fieri contingit.

I I.

Υπὸ κυνάρχης ἔχομένη οἴδημα γνέσθαι
ἐν τῇ τραχήλῳ, ἀγαθόν : ἔξω γὰρ τρέπεται τὸ
ῥέυσμα.

Angina correpto si tumor fiat in col-
lo, bonum : foras enim morbus deduci-
tur. 37. 6.

Sermo verus est, & causa in promptu, si-
quidem humores noxios ab internis ad exter-
na transferri conducit.

I I I.

Υπὸ κυνάρχης ἔχομένη οἴδημα & ῥύθνημα
ἐν τῇ στήθι ἐπιγενόμενον, ἀγαθόν, ἔξω γὰρ τρέ-
πεται τὸ ῥέυσμα.

Ab angina habito tumor & rubor in
pectore superueniens, bonum : extra
enim vertitur morbus. 49. 7.

Hic Aphorismus non dissimilem habet cum
precedente sententiam.

I I I I.

Ἡ ὑπὸ πυρετοῦ ἔχομένη, οἴδημα γὰρ μὴ ἰδὸν
ῥεῖ ἐν τῇ φάρυγγι πρὶς ἰξαίφνης ἐπιγίνῃ,
θανάσιμον.

Si febricitanti, nullo existente in fau-
cibus

cibus tumore, strangulatio subito accidit, lethale. 34. 4.

Cum vehemens febris indigeat pro refrigerio cordis plus quam par est calfacti, abundantius inspiratione, fit ut in presentaneum vitam discrimen adducantur febricitantes, qui repente suffocantur, ob eum defectum inspirationis, qui fit vel à convulsione musculorum laryngis, vel ab inflammatione in faucibus aut gutture facta, vel quia siccitate tenduntur ipsi muscoli: praesertim cum nullus tumor existit in faucibus. Tumorem enim & ruborem apparere aut in externas partes converti, id quidem significat cynanchen minus periculosam esse, & humores noxios à partibus nobilibus ad ignobiles transferri à natura.

V.

Ἡ ὑπὸ τῆς πυρετοῦ ἰσχυρῆς ὁ τεράστιος ἐξαιφνης ἐπισχεφῆ, & μέγιστος καταπίνει δύω-
ται, οἷδ' ἡμῶν μὴ ἴσως, θανάσιμον.

Si febricitanti collum repente pervertitur, & vix potest deglutire, tumore nullo apparente, lethale. 35. 4.

Cum neque ore aperto in faucibus, neque extrinsecus apparuerit tumor, hominem verò febrientem contigerit non posse devorare, ver-
tebris ad anteriorem regionem cervicis luxa-

tu, symptoma est lethale, proueniens ex inflammatione musculorum gulam munientium, aut gulae ipsius. Est enim communio quedam partibus istis per ligamenta & per nos cum spinali medulla & membranis ipsam ambientibus, ac praeterea ossibus vertebra- rum quae his extrinsecus adiacent. Extentis itaque ad partes inflammatas ligamentis & nervis, trahi vertebrae vel intrò vel ad latus est necessarium.

VI.

Τῶν ἀπυγχωρῶν καὶ κατωδυσμῶν, μηδέ-
πω ὅ τεθνηκότων, ὅτε ἀναφέρουσιν οἷσι ἀν-
φρὸς ἢ ἀπὸ τοῦ σώματος.

Qui strangulantur & moriuntur, non-
dum tamen mortui sunt, non redeunt
ad vitam quibus spuma circa os fue-
rit. 43. 2.

Qui à causa vel externa vel interna stran-
gulantur, nondum tamen viribus omnibus
privati, rarò ad sanitatem redeunt qui spa-
mante ore conspiciuntur. Spuma enim pulmo-
nis violentiam significat, quam patitur dum
animal suffocatur.

VII.

Ὅτε φάρυγξ νοσέῃ, ἢ φύμαλα ἐν τῷ σώματι
ἐκφύεται, τὰς ἐκκρίσεις σκίπῃτο. ἢ γὰρ χολ-
αίαις

ἀώδεις ἴωσι, τὸ σῶμα ξυνοσεί, ἢ ὃ ὁμοίαν
 τῆσιν ὑδαίνουσι γίνωνται, ἀσφαλὲς τὸ σῶμα
 τρέφει.

Vbi fauces ægrotant, aut tubercula
 nascuntur in corpore, excretionēs inspi-
 cere oportet : Nam si biliosæ fuerint,
 corpus vnà ægrotat : Si verò similes sa-
 nis, tutum est corpus nutrire. 15. 2.

Ore aphthis aut alijs vlceribus afflictato,
 vel tuberculū in corpore natū, excretionēs in-
 spicienda sunt : Nam si biliosæ fuerint aut
 atrabiliarie, aut etiam phlegmaticæ, significāt
 non tantū ad cutem herere ipsos humores
 prauos, sed & intus esse. Quocirca purgationi
 tam potius insistendum quàm nutritioni,
 quoniam impura corpora quò magis nutries eò
 magis ledes. Si verò excretionēs sint sanis si-
 miles, tunc significant naturam omnes prauos
 humores ad cutem expulisse, ac nihil intus
 reliquisse mali, Quare sine periculo corpus
 huiusmodi vitiosis humoribus vacuum nu-
 triri.

Pulmonibus & pectori.

I.

Οἱ οὖτοι αἷμα ἀφρώδες ἀναπύουσι, τυτίουσι
 ἐκ δὲ πνέμετος ἢ ριαιότη ἀναγωγὴ γίνεται.

Qui sanguinem excreant spumofum,

ius de pulmone educitur. 13. §.

Sanguis qui è pulmone educitur spumofus, est similis visceri quod leue est, rarum, aërium, spirituosum, & veluti ex spuma quadam sanguinis concreta conflatum. Qui verò sanguis è ventre aut thorace effluit, natali quidem similis est, adeo ut hoc verè dici possit, sanguis spumofus solius pulmonis vlcera indicat: non autem verè, laeso pulmone ex necessitate spumofus expuitur.

I K.

Τὰ ψυχρὰ οἷον χιὼν, κρύσταλλος τῆς σήθου πολέμια, βηχέωι κινήκεν, αἰμορροϊκὰ, καὶ ἀρροϊκὰ.

Erigida, qualis nix & glacies, pectori inimica, tussis mouent, sanguinis profusum & destillationes. 14. §.

Immodicè frigida omnia, sicut nix & glacies, thoracis partibus sunt inimicissima, cum & tussis moueant, & rasis disrupti sanguinem sæpius manare faciant: & ex capite destillationibus thoracem offendant atq; pulmonem, quas etiam excitant nix & glacies cerebrum refrigerantes.

I I I.

Κατάρροις ἐς τὴν ἄνω κοιλίαν ἐκπύονται ἐν ἡμίστην αἵματι.

Destit

Destillationes in ventrem superiorem
suppurantur intra viginti dies. 38. 7.

Ventrem superiorem nominat hic thoracem
in quo pulmo continetur, & in quem à capite
destillatio fertur per asperam arteriam. Sup-
puratur autem magna ex parte in viginti die-
bus, nempe 14. aut 17. aut ad summum vige-
simo die: Semper enim Hippocrates diem vi-
gesimum indicatorium facit, non vigesimum
primum.

IIII.

Ἐπὶ περιπνευμονίᾳ φρενίτις, κακόν.

A peripneumonia delirium, malum.

12. 7.

Peripneumonia inflammatio est pulmo-
nis cum febre acuta, cui si delirium succedat,
vaporibus à pulmone ad caput delatis, ma-
lum est duplicatum.

V.

Οἱ σπῆλαι ὕβρις ἢ ἀσθμαὶς ἢ βραχὺς χρόνος
αὐτῶν ἢ ἄλλου, ἀπολλύνται.

Qui gibbi ex asthmate fiunt aut tussi
ante pubertatem, moriuntur. 46. 6.

Qui ante pubertatem ex asthmate aut
tussi gibbi facti sunt, eos citò interituros esse
dicit: quia thorax in his cum diminuaturs aut
saltem

saltem non augeatur, pulmones autem & cor per atatem increſcant, tanta anguſtia premuntur ea quæ reſpirationi obſerviant inſtrumenta, ut neceſſe ſit ex difficultate ſpiritus hominem brevi tempore interire. Gibboſitas eſt doſi in poſteriore exteriorémve partem diſtortio. Lordoſis, gibbus ad anteri-
 ra, malum eſt priori contrarium: ſit enim ubi in anteriorem partem diſtortio contingit, ita ut in dorſo cavitas fiat, in peſtore autem tumor. Scolioſis eſt ubi in latus vel dextrum vel ſiniſtrum diſtortio ſit. Omnibus quidem commune ſponte ita affecti, hoc eſt, quibus ſine ictu vel caſu ſpina paſſa eſt, tales fieri propter dura tubercula & concoqui difficilia.

VI.

Ἐπὶ αἵματος πύσι πύσι πύσι, κακόν.

A ſanguinis ſputo puris ſputum malum. 15. 7.

Non omne ſputum ſanguinis, ſequens habet ſputum purulentum, ſed quod malignum exiſtit: tale autem eſt omnino à pulmone.

VII.

Ἐπὶ φύματος εἶναι ῥέξιως ἔκλυσις, ἔμειψις, καὶ λήποψυξις γίνεται.

A tuberculi intus ruptione exolutio,
 vomitio,

vomitio, aut animi defectio fit. 8. 7.

Vt suppurationum ad ventriculum ruptionem sequitur vomitus, sic ad pulmones tussis, & ad intestina puri deiectio. Communis autem omnium ruptionum, quaecumque in partem decumbant, est virium lapsus & animi defectus, propter vitalis spiritus excretionem.

VIII.

Επί πύρι πύσι, φθίσις κ' ῥύσις. Ἰπὴν δὲ π' πύριον ἴχεται, ἀποθνήσκουσιν.

- A puris spuito tabes & fluxus: quum verò spitu retinetur, moriuntur. 16. 7.

Phthisin nominat aut tabem totius corporis cum parva febre extenuationem consequentem insanabilia pulmonis ulcera. Per fluxum autem intelligit vel capillorum defluxum, vel alui fluxum: utrunque enim consuevit euenire cum tabidi ad extremum mali perducuntur, alterum ex siccitate, alterum ex potentia imbecillitate. Ceterum eoque tabidi viuunt dum pulmonem expurgare possunt per ea quae expuendo excernuntur. Cum verò non expuunt præ imbecillitate, sed puri copia in pulmone coaceruata viam spiritus obstruit, strangulantur.

IX.

Τοῖσιν ὑπὸ τῆς φθίσεως ἐνοχληθῆσονται, ἢ τῆς πύσεως ὅσους ἂν ἀποδύσωνται βαρὺ ὄζη ἐπὶ τὰς ἀνδρογυνας ἐπιχειρόμενον, καὶ αἱ τρεῖς ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέωσι, θανάσιμοι.

Qui tabe molestantur si sputum quod extussiunt graue olet iniectum carbonibus, & capilli à capite defluunt, lethale. II. 5.

Tabidorum sputum, quod per tussim excreatur, carbonibus impositum si grauiter olet, ostendit extremam humorum qui sunt in pulmone putrefactionem: Si verò & ex capite capilli defluant ita affectu, lethalis etiam nota est, quæ vltimi alimenti defectum ostendit, ac virtutis naturalis magnam imbecillitatem, atq; aliquando humorum corruptionem.

X.

Φθίσις γίνεται μέλιστα ἡλικίῃσι τῆσιν ἀπὸ ἐκτακαίδεκα ἐπὶ τὴν μίσην, καὶ τρεῖς ἀκονταί.

Tabes fiunt præcipuè ætatibus à decimo octauo vsq; ad trigésimum quintum. 9. 5.

Vicinus errore magis morbofi sunt iuuenes quàm senes: Ab ætate ergo non est hoc malum, sed ab intemperantia.

XI.

Οκείσουσιν ἂν φθισῶσιν αἱ τεύχεα δὲ τῆς κεφαλῆς ῥίωσιν, ὅτε διαρροίης ἐπιπροσόδους αὐτοῖς ποσὶν ὀφθαλμοῖς.

Quibuscunque tabe laborantibus capilli à capite defluunt, ij alui profluuium superueniente moriuntur. 12. 5.

Defluuium capillorum superueniens alui fluxui tabe ab ulcere pulmonis laborantibus, is prostermit vires quæ ex ipso casu sunt valdè imbecilles, vnde coniungendum mortem imminuentem esse.

XII.

Υπὸ φθίσιος ἐχόμενα διαρροίαι ἐπιπροσόδουσι θανάτῳ.

Tabe laboranti profluuium alui superueniens, lethale. 14. 5.

Hic simpliciter dicit esse lethale alui profluuium in tabe, tanquàm illud solum sufficiat mortem significare, non tamen ita è propinquo neq; tam cūr secuturam, sicuti cū defluuium capillorum adiungitur.

XIII.

Ἀρμόζει δὲ τοῖσι φθινώδεσι μὴ λήναι πολλὰ ποσὶν ὀφθαλμοῖς διδόναι χαλὰ.

Tabb

Tabidis lac conuenit, iis uidelicet qui non valdè febricitant. 64. 5.

Ex vlcere pulmonis tabidū lac conuenit, quia prout quod in pulmone est coaceruatum abstergit, vlcera eiusdem conglutinat, ac agros nutrit. Conuenit autem dummodo non adsit magna febris, dolor capitis, aut hypochondriorum tumor.

Hypochondrijs, Epigastrio,
& ventri.

I.

Εν πάσῃσι τῇσι νόσοισι τὸ περὶ τὸ ὀμφαλὸν καὶ τὸ ἥττω πάχος ἔχει βέλτερόν ἐστι. τὸ δὲ σφόδρα λεπτόν ἐστι κατετηγός, μοχθηρόν. Επισφαλὲς δὲ τὸ τοῦτον καὶ πρὸς τὰς κατὰ κατὰρσιν.

In omnibus morbis, partes quæ ad vmbilicum & imum ventrem sunt, crassiores esse melius est: plurimum verò extenuari & contabescere, prauum. Ad purgationes etiam quæ per inferna fiunt, hoc idem tutum non est. 35. 1.

Hypochondria optimum est absq; dolore esse, & mollia & equalia. In his autem quæ carnosæ sunt & crassæ, hæc meliora sunt: Quæ verò tenuia, mala: & tanquàm signa & tanquàm causa. Signa enim sunt partium quæ

contabuerunt, imbecillitatis: causa verò, quòd ciborum concoctio bona non fiat in ventre, neq; sanguificatio in hepate. Nam à crassitie abdominis calor natus augetur, à quo partes subiectæ calfactæ cibum benè concoquunt, & bonum generant sanguinem. Porro qui easdem partes colliquatas & extenuatas habet, non sustinet inferiores purgationes. Oportet enim omnes quæ infrà thoracem sunt partes robustas esse, ut benè purgationibus seruiant: alioqui magna incommoda patiuntur à vi medicamentorum.

II.

Οχέουσις ἰσχυρότερα μετέωρα ἀναβρο-
ρίζονται, ὁσφίος ἀλγύναντες ἐπιχειροῦνται αἱ
καὶ λίαν τετίοισι καθύλασσονται. ἢ μὴ φύσιν
καταρραγίῳσι ἢ ἔρρι πλεῖστος ἐπέλθῃ. ἐν πυρε-
τίσι δὲ ταῦτα.

Quibus hypochondria inflata mur-
murent, lumborū dolore succedente, iis
alui humectantur, nisi flatus erumpant,
aut urinae copia prodeat: hæc verò in fe-
bribus accidunt. 73. 4.

Si hypochondria à flatuoso spiritu inflen-
tur atq; adeo murmurent, lumborumq; dolor
succedat, alui paulò post humectantur: quippe
cum spiritu commixta est modica humiditas,
quam

quam spiritus mobilis secum ad alium ducit, nisi fortè humiditas & spiritus ab invicem separentur, & humiditas quidem per urinam, spiritus autem per intestina vacuetur. Idq; in febribus accidit quæ ipsæ morbi sunt, non aliorum morborum symptomata. In febribus enim cum imbecillus sit calor natus, fit ut minus rectè coeli cibi in flatus maximè resolvantur.

I I I.

Οκόσμοις ἀεὶ τὸ ὑποχόνδριον πόνοι γίνεται ἄτερ φλεγμονῆς, τῆ ποίσι πυρετὸς ἐπιχειρόμενος λόφ τὸν πόνον.

Quibus dolor circa hypochondrium fit citra inflammationem, ijs febris succedens morbum solvit & dolorē. 40. 6.

Cum dolor aliquis hypochondrium occupaverit, nec sit is ab inflammatione nec à morsu excitatus, relinquitur, ut sit vel propter obstructionem, vel propter spiritum flatulētum, vel aliquam intemperiem inaequalem: Quo fit ut febre succedente crassos humores obstructiōnem efficientes extenuante, flatuq; discutiente, atq; intemperiem frigidam corrigente, dolor huiusmodi solvatur.

I I I I.

Ἡ ἐπίπλοσις ἐκείνη, ἀνάγκη ἀπὸ κακίας.

Si omentum ceciderit, necesse est ut putrescat. § 8. 6.

Omentum dictum à Græcis Epiploon, à Latinis etiā Rete, ventriculo insidet & calorem eius innatum fouet ac uetetur. Hoc si per vulnus ventris inferioris excidat, putrescit post longum tempus si non ligatum fuerit & excisum antequam reponatur. Pars autem sincera separabitur ab infecta, ligatura fili è serico, quod postea extrahetur, deinde sciñdetur infecta pars ac sincera reponetur.

V.

Τὰ ἀλγήματα τὰ κατὰ τὴν κοιλίην γενόμενα, τὰ μὲν μετῴρα, καὶ φώτερα. τὰ δὲ μὴ μετῴρα, ἰσχυρότερα.

Dolores ventris sublimes, leniores: qui verò non sublimes, fortiores. 7. 6.

Sublimes hîc dolores appellat qui supra peritonæum quasi in superficie sunt, qui verò infra, hoc est in ipsis intestinis atque ventriculo, & in profundo, non sublimes. Porro dubium non est quin affectus interni multò periculosiores sint externis, nec tam facile partibus principatum aliquem obtinentibus adhibentur remedia.

VI.

Ἐν τῇ κοιλίᾳ αἵμα κατὰ πρὸς φύσιν ὥσιν.

ἀνάγκη ἐκπνεῖσθαι.

Si in ventrem sanguis præter naturam effunditur, necesse est suppurari.

20. 6.

Si vase rupto vel aperto præter naturam, sanguis effunditur in aliquam capacitatem, necesse est ut corrumpatur.

VII.

Επὶ ὁδῶν πολυρροῇ τῶν φεῖ τῶν κελίων ἐκπύσεις.

A ventris diuturno dolore suppuratio fit. 22. 7.

Cùm ventris dolor à frigore, vel inæquali intemperie, vel flatibus, vel mordacibus humoribus excitatus, non possit in longum tempus extendi, si omnia circa ægrum opportunè fiant. Reliquum est igitur, si diu duret, ut ab inflammatione suam habeat originem, quæ processu temporis suppurabit, nisi hominem morte præripiat.

VIII.

Επὶ ὁδῶν ἰσχυρῇ τῇ φεῖ τῇ κελίων ἀκρωτηρίων ψύξις, κακόν.

In forti dolore ventris partium extremarum frigiditas, malum. 26. 7.

Fit partium extremarum frigiditas pro-

pter dolorem vehementem medias corporis partes occupantem, ob quem natura in seipsam contrahitur, & ad eam consequitur sanguis, non solum extremas corporis partes derelinquens, veluti pedes & manus & caput, sed & cutim uniuersam.

I X.

Οκόσσισι μεταξὺ τῆ φρενῶν ἔ τ' γαστρὸς φλέγμα ἀποκλείεται, καὶ ὁδὴν παρὰ τοῦ ἔχου διέξοδον εἰς ὑδὲ πύλω τῶν κελυῶν, τυτίοισι καὶ τὰς φλέβας εἰς τὴν κύστιν τραπίτες τῆ φλέγγου, λύσις γίνεται τ' νόσου.

Quibus inter ventriculum & septum transversum pituita concluditur, doloremq; infert, utpote quæ ad alteram cavitatem exitum non habet, iis, per venas ad vesicam conuersa pituita, morbus soluitur. § 5. 7.

Per locum in quo concluditur pituita, illud scilicet laxius est intelligendum quod est quidem infra septum, sed intra membranæ abdominis interioris eam partem quæ ad epigastrium attinet: Pituita igitur ibi conclusa cum dolore, ad venas per vias oculos fugientes, rursus à venis ad vesicam transferri à natura potest, prius sufficienter extenuata.

Lateri.

Lateri.

I.

Οπόσοι πλῆθει καὶ γινόμενοι, ὅσην ἀνακα-
ταργυνται ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησι, τυτί-
σιν ἐμπύημα μεδίσανται.

Quicunq; morbo laterali laborantes
in quatuordecim diebus non repurgan-
tur, ij ad suppurationem vertuntur. 8. 5.

Nominat purgationē ac repurgationē eam
qua fit per sputa, euacuationem humorum fa-
cientium morbum lateralem. Tempus autem
praefinit, in quo si non fiat huiusmodi purgatio
per sputa, morbus laterali in suppurationem
conuertitur, pure scilicet inter pulmones ex
thoracem effuso, atq; ita morbi fit in alium
morbum conuersio.

II.

Οπόσοι ἐν τεσσαρὶνδεκα ἡμέραις γίνονται,
ἢ ἀνακαταργῶσιν ἐν τεσσαράκοντι ἡμέρησι
ἀφ' ἧς ἂν ἡ ρήξις γίνηται, παύονται. ἢ δὲ μὴ,
eis φθίσιν μεδίσανται.

Quicunque ex morbo laterali suppu-
rantur, si in quadraginta diebus purgan-
tur à die qua fit ruptio, liberantur: si ve-
rò non, ad tabem transeunt. 15. 5.

Pleuritidi si per sputa non purgetur ante
quar

quartumdecimum diem, succedit suppuratio, suppurationi verò tabes, nisi in quadraginta diebus à rptione & puris effusione purgatio fiat per spuitiones, quam solutio morbi consequitur. Sed si non purgetur per sputa intra dies quadraginta, qui terminus est indicationis acutorum ex decidentia, transit ad tabem, nam pure processu temporis putrescente, necessarium est pulmonem exedi exulcerarive. Porro ulcera pulmonis comitatur macies ea corporis quæ tabes appellatur.

III.

Τῶν ὀδυνῶν καὶ ἐν πλάτῃσι, ἔν τινι, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραισι, ἢ μᾶλλον διὰ φέρωσι, καὶ μεγάλῃσι.

Dolores laterū & pectoris, aliarumq; partium num multum prævaleant differant' ve, considerandum. 5. 6.

Hoc aphorismo admonemur ne temerè precipitemus sententiam de aliquo affectu ascribendo curandove, priusquam eius causa cognita sit, eius differentia, & natura partis affectæ, ne cum capiti sit medendum, redamiam curare videamur. Non enim simpliciter partium dolores considerare oportet, neq; arbitràdum eandem esse temporum rationem, aut similem in omnibus hominibus dispositionem:

veluti

veluti si prius quidē Dion, postea verò Theon
costam doluerit, non eodem modò se vtrunque
habere existimandum, sed considerare oportet
nunquid maximè invicem in dolore differant,
an quodammodo similes existant. Iñ autem
hoc ex duobus perspicuum, ex doloris specie,
& ex vehementia: ex specie quidem si pun-
genti simili, vel tendenti, vel torporem in-
ducenti, vel grauanti, vel lancinanti, aut ro-
denti, vulueranti, vel continui, vel cum in-
termissione, vel equali, vel inaequali. Secun-
dum autem vehementiam, quā sit maior aut
minor aduertendum.

IIII.

Υπὸ πλῆθους ῥίπδος ἢ ὑπὸ περιπνευμονίας ἰχ-
μεῖνα, ἀγέρῃσιν ἱπτανομένη, κακόν.

Pleuritide & Peripneumonia corre-
pto alui profluuium adueniens, ma-
lum. 16. 6.

Vehementer laboranti pleuritide vel pe-
ripneumonia profluuium alui superveniens
malum est: significat enim hepar ob consen-
sum quem habet cum partibus respirationi
inservientibus, ita malè affici, ut præ imbecil-
litate non possit ad se attrahere alimentum,
neq; convertere in sanguinem. Verùm in me-
diocri pleuritide atq; mitiori peripneumonia
profluuium alui potest prodesse ratione eva-
cuatis.

evagationū, præsertim ubi in morbis signa co-
 litionis apparuerint.

IV.

Οἱ ἀξυρισμάδες ἔκ πάσης πηλοῦς καὶ γί-
 νοῦται.

Qui acidum eructant, non valde mor-
 bo laterali corripiuntur. 33. 6.

Lateralis morbus, licet ab alijs humoribus
 ortum habeat, ferè tamen est à bile flava sem-
 per aut sola aut cum alijs mista : ructus autem
 acidus à pituita & frigidityte, corruptis scili-
 cet in ventriculo cibi à frigore & pituitosis
 humoribus. Ob hanc igitur causam qui acidum
 ructum habent, aut quibus superabundat
 natura pituita, raro à morbo laterali cor-
 ripiuntur.

VI.

Ἐπὶ πηλοῦς καὶ πεπνυμένῃ, κακίον.

A morbo laterali inflammatio pul-
 monis, malum. 11. 7.

Quando non potest in qui morbum latera-
 lem facit, in coctis humor contineri totus, pars
 eius aliqua ad pulmonem fertur, vnde pleuri-
 tidi superuenit peripneumonia, malum priore
 deterius, utpote quod nobiliorem partem oc-
 cupet.

Ventri

Ventriculo & cordi.

I.

Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις καὶ ἰσχυρῶς ἀνδραγαθεῖς ἀνδράσιος, ἐξαπίνης πελώταισι.

Qui frequenter ac fortiter absq; causa manifesta animo deficiunt, de repente moriuntur. 41. 2.

Non omnes qui deficiunt animo, repente moriuntur, nisi saepius hoc patiantur, & fortiter, & sine causa manifesta. Nam mulier longum in balneo tempus commorata frequenter animo deficiebat, ob temporis diuturnitatem: Alteri idem accidebat si per horam lauabatur, nisi aliquid panis assumpsisset: quibus os ventriculi debile erat, aut exactissimo sensu præditum. Verum non erat hoc mortis signum, cum causam haberet manifestam. Sed qui ex nulla tali causa saepius ac fortiter animo deficiunt, quod ob virtutis vitalis imbecillitatem hoc patiuntur. Etenim quibus robur vitale infirmum est, animi verò affectiones ob imperitiam fortes, quæ animæ essentia facile dissolui potest. Cæterum ut propriis affectu cor laborare solet, quem cardiaca syncope consequitur, sic ex stomachi vitio syncope eos affectus insequitur quibus os ventriculi (stomachum nonnulli appellant) infestatur. Porro vitiusq; pariu,

partis, tum oris ventriculi, tum cordis, hæ dispositiones. aut à forti duntaxat intemperie, aut venenoso humore, nonnunquàm ab erysipelate, aut inflammatione, aut alio quopiam præter naturam tumore fieri solent : quas interdum mors repentina comitatur.





HIPPOCRATIS

APHORISMORVM


PARS TER-

TIA,

In qua ij præcipuè exponuntur qui instrumentis facultati naturali seruientibus conueniunt.

Primum intestinis.

I.

 Κόσμοις σφόδροι κ' αεί τ' ὀμφαλὸν πόνοι, κ' ὀσφύος ἀλγῆμα, μὴ λυόμενοι μήτε ὑπὸ φαρμακείης μήτ' ἄλλως, εἰς ὕδρωπα ἐκέρων ἰδρύνεται.

Quibus adsunt tormina & circa umbilicum labores, & lumborum dolor, qui neq; à medicamento neq; aliter soluitur, Hydrops siccus contrahitur. 11. 4.

Tormina fiunt & propter morsum vehementem & spiritum flatuosum qui non habet exitum, sed in intestinorum inuolucris est interceptus. Quòd verò dolores ad tales dispositiones consequantur, nemini dubium. At cum circa umbilicū ac lumbos se firmauerint,

neq; à medicamentis sumptis, admotis, iniectis, purgantibus, digerentibus, anodynis, neq; alijs solvuntur auxilijs, quædam est earum partium habitualis intemperies, quæ magna ex parte perseverans in Hydropem transit qui tympanias appellatur, ab eo videlicet quod inventer percussus talem sonum edat qualem tympana. Hippocrates nominavit hoc morbi genus Hydropem à tumori similitudine, non tamen humidi tumori ut ascitem. In tympania est tumor à flatulento spiritu, in ascite ab humoris aquosi copia. Videtur autem à maiori frigiditate generari aquosus Hydrops, quem ascitem vocant, quoniam velut in vtre quodam in peritoneo humor continetur: à minori autem tympanias. Neq; enim humida substantia in flatuosum aërem sine calore aliquo potest transmutari.

II.

Ἐπὶ δὲ χαλῶ φλεγμονῇ τοις καὶ ἐπὶ ὀσίῃ φλεγμονῇ, καὶ ἐπὶ νεφροῖσι ἐμπύουσι τραχηλὶ ἐπιζῶνται.

Recto intestino & vtero inflammatione affectis, renibusq; purulentis, urinæ stillicidium accidit. § 8. §.

Stranguria Græci, Latinis urinae stillicidium dicitur, non est aliud quàm ubi guttatim distillat urina, atq; assiduam ad mingendum

dum irritationem inducit. Recto igitur intestino & viro inflammatione laborantibus, non mirum si vrinae stillicidium accadat: nam per compatiendi rationem vesica etiam una cum ijs malè afficitur, adeo ut ceruice eius compressa, & vi retentrice dissoluta, non possit urinam retinere: ijs siquidem patientibus, vicinitatis ratione pati vesicam est necessarium, ut quæ & intemperiei particeps sit & inflammationis, & prematur à tumoribus præter naturam qui vicinis partibus insunt. In purulentis autem renibus, prius ad vesicam delatum eam sua acrimonia mordicat, atque facultatem expultricem irritans excitat ad excretionem.

III.

Ο πόσοισιν ἐκ στραγγισμῆς εἰλεὸς ἐπιγίνεται, ἐν ἑπτὰ ἡμέρησι ἀπόλλυται, ἢ μὴ πυρετοῦ ἐπιγινόμενου ἄλλως τ' ἔρον εἶναι.

Quibus ileos superuenit à stranguria, intra septimum diem moriuntur, nisi febre succedente vrina satis effluat. 44. 6.

In ileo nihil deijcitur, ne si quidem quis acerrimo utatur clystere: stercus autem in morituris vomitu reijcitur. Quòd igitur astricto podice, et interclusa via vrinae, hæc passio fiat, & quòd in tenuibus intestinis accadat, non

autem crassū, omnes fatentur: sed unde hoc vitij contrahitur semel dici non potest, alijs in hunc morbum incidentibus ex continua ciborum corruptione ac cruditate, quam obstru-ctio in tenui intestino ferè consequitur: alijs ex frigore, vel ex frigida potu immoderato: nonnullis ex inflammatione, vel scirrho, vel abscessu: quibusdam ab indurato stercore & circa tenue intestinum impactio: quandoq; ex plagis & ictibus; nonnunquam ex lethalium medicamentorum potione, atq; aliàs alijs ex causis. Sed quantum ad huius aphorismi expositionem attinet, multitudinem crudorum humorum vnà cum multa frigiditate melius est eorum quæ in ileo contingunt symptoma-tum causam arbitrari: Sic enim febris suc-cedens, medicina est huius dispositionis, & re-tentarum vrinarum euacuatio. Novimus si-quidem illis morbis conferre febrem qui ex frigiditate fiunt, aliquando sola, aliquando cum humoribus crudi pituitosis, & statuosis spiritibus.

I I I I.

Ἐπὶ εἰλαδί ἐμπίπτει, ἢ λυγρὴ, ἢ σπασμὸς, ἢ πα-
ρεφροσώη, κκεκίνη.

Ab ileo vomitus aut singultus, aut conuulsio, aut delirium, malum. 10. 7.

In ileo nihil descendit ad inferiora, & hoc est

est proprium inseparabile passionis huius : vomitus autem non semper adest, sed quādo exitiales sunt : & si vehementius distorqueantur, stercus eis superiora petit, atq; singultunt. Quidam verò desipiunt & conuelluntur, com patiente cerebro stomachi passioni. Hac verò mihi fieri videntur intestinis, in quibus talis passio existit, à se expellere stercus appetentibus, & non potentibus se exonerare, propter factam in partibus inferioribus obstructionem, sed coactis contra naturam violenter moueri, & ad loca superiora materiam noxiam extrudere.

Hepati.

I.

Οχόσιον ἥπαρ ἀεροδυνάται, πυτίοισι
χυρὶν ἐπιτερόδρος λύει τὴν ὀδυνήν.

Quibus hepar vehementer dolet, iis febris superueniens soluit ægritudinem. § 3. 7.

Ei dolori hepatis qui est à flatuoso spiritu, febris superueniens est auxilio, utpote quæ flatum dissoluat & discutiat sua caliditate. Ei verò qui est ab inflammatione si febris noua superueniat, tantum abest ut medeatur, ut plurimum etiam obesse credatur adueniente calore calorem inflammationis qui febrilis erat

adaugente.

II.

Ἐπὶ δὲ ἥπατι φλεγμαίνοντι λὺγξ ἰπζόνται.

Iecoris inflammationem singultus sequitur. § 8. 5.

Ob ventriculi consensum cū hepate, & nervorum utriusq; partis cōmunicationē, hepate inflammationem patiente, singultus accidit ventriculo, non quidem semper, sed cū ad maximam inflammationem hepar attollitur.

III.

Ἐπὶ φλεγμονῇ τῇ ἥπατος λὺγξ, κακόν.

In hepatis inflammatione singultus, malum. 17. 7.

Communium nervorum ratione, qui sunt benisissimi, stomachus hepati compatitur tum cū inflammatione maxima & pessima laborat hepar: nonnunquam etiam bile multum calida & multa in huius visceris inflammationibus genita, ac confluyente ad intestinorum principium: qua superfluitante atq; ad ventriculum recurrente, contingit os eius morderi atq; ideo singultire.

IIII.

Ἐν τῶν ἰκτερικῶν τὸ ἥπαρ σκληρὸν γινέται.

Idem

ἄσθαι, πονηρόν.

Hepar durum effici regio morbo correptis malum est. 42. 6.

Cum morbus regimi fiat ab hepatis obstru-
ctione, & fiat aliquando per modum criseos,
ipsa natura humorem exuperantem in venis
contentum ad cutem expellente: morbum re-
gimii hoc loco dicit qui fit ex hepatis inflam-
matione, durities enim ostendit in eo scir-
rhum esse, vel inflammationem, quorum
utrumque malum est.

Οἰόσθαι τὸ ἥπαρ διάπυον καίοντα, ἢ μὲν
τὸ πύον καθαρόν ῥυῆ ἢ λευκόν, περιγίγνεται. ἐν
χρῆσιν γὰρ τὸ πύον τάλισσιν ἐστίν. ἢν δ' οἶον ἀμύδρ
γῃ ῥυῆ, ἀπέλθῃ).

Qui iecore suppurato vruntur aut se-
cantur, siquidem pus purum effluxerit &
album, euadunt, his enim pus conclusum
in membrana est; si verò velut amurca
effluxerit, intereunt. 43. 7.

Ipsæ causam dixit ob quam nonnulli pe-
reunt suppurati, nonnulli verò euadunt. Qui-
bus enim in tunica est pus, nihil patiente sub-
stantia hepatis, saluantur: Quibus verò usque
ad carnem hepatis corruptio perlingit, non

absq; ratione moriuntur. Quòd autem amar-
cam Græci nominent faciem olei, & quod ta-
lem par est esse incoctam putredinem hepatis,
liquet unicuiq;.

VI.

Τοῖσι ὑδρωπικῶσι τὰ συνόδρα ἔλκια ἐν τῇ
σώματι, ἐρσιδίως ὑγιάζει.

Aqua intercutem laborantibus, ulce-
ra quæ in corpore fiunt, non faciliè sa-
nantur. 8. 6.

Docuit ipse in libro de ulceribus, non prius
ad cicatricem ulcera perducì, quàm omnino
exsiccentur: hoc autem non faciliè fit in Hy-
dropibus, ob humiditatis immoderantiam,
necnon ob sanguinis boni penuriam.

VII.

Τοῖσι ὑδρωπικῶσι βὺξ ἐπιγεγομμένη, κακίη.

Aqua inter cutem laborantibus tussis
superueniens, malum. 35. 6. Item 48. 7.

Superuenire passionibus alias passiones
prisci medici dicere consueverunt, quæ ratio-
ne ipsius passionis adauctæ contingunt. Neq;
enim cùm ex alia sit occasione in homine aqua
inter cutem patiente, tussis signum est exitia-
le, sed quando ipsius morbi ratione. Cùm enim
in passione tali aquosa humiditas tantam
adaucta

adansla fuerit, ut iam asperam arteriam occupet, tussis superueniens periculum suffocationis adfert.

V I I I.

Οκίσσισι ἀν τὸ ἥπαρ ὕδατι πλησθεὶς εἰς τὸ ἐκίπλεν βραχὺ, τελείοισιν ἡ κριλὴ ὕδατι ἐμπιμπλήσται, καὶ ἀποθνήσκουσιν.

Quibus hepar aqua plenum in omentum eruperit, iis venter aqua repletur, & moriuntur. § 5. 7.

Si quando contingat vesicas aqueas quæ circa iecur generantur, rumpi, aqua effunditur ad locum membranae abdominis interioris, ad epigastrium, in quo etiam aqua hydropicorum continetur. Ad omentum autem non potest è ruptis illis vesicis aqua effluere, nisi ipsum aliquo modo exedatur: est enim solidum & firmum undiquaque, ita ut nihil in ipsum incidere possit nisi ex ventriculo, colo intestino ac liene, illisq; partibus unde ipsum enascitur. Ventrem autem aqua impleri, non de illo ventre dictum est in quo cibi recipiuntur, sed de tota cavitate quæ est infra thoracem, secundum quod significatum ventresi nominantur, & mulieres dicuntur gestare ventrem. Porro aqua ad eum locum effusa, moriuntur tum hi tum hydropici, nisi per medicamenta purgantia humiditates superfluas, &

præterea per epithemata, quæ vim habeant
ciendi urinam, & in vapores soluendi talem
humorem, beneficio naturæ & artû serventur.

IX.

Υπὸ ὕδατος ἐχομένα τοῦ καὶ τὰς φλέβας
καὶ ἐκκρίνῃ ὕδατος πυύρος, λύσις.

Aqua inter cutem correpto si aqua,
quæ in venis est, ad ventrem defluerit,
mali fit solutio. 14. 6.

Hoc exemplum est unum earum quæ sponte
& utiliter sunt evacuationum, si aqua hy-
dropicorum à iecore ad intestina derivata per
alium excernatur: spontaneum autem dici-
mus, non quod sine causa fit, sed sine causa no-
stra fit: Quando enim data medicina aquam
educente talis fit evacuatio, nequaquam hanc
spontaneam nominamus. Quare cum sic uti-
liter euacuetur aqua hydropicorum à natura,
hæc in operibus suis tunc imitabitur medicus.

X.

Ὅσοι ἐμπτῶι ἢ ὑδρωπικῶι κείονται ἢ πύ-
ρονται, ἐκρύντες τῷ πύρῳ καὶ τῷ ὕδατι ἀδρός,
πάντως ἀπόλλυνται.

Quicunq; empyi aut hydropici vrun-
tur, aut secantur, si pus aut aqua vnuer-
sum effluerit, omnino moriuntur. 17. 6.

Valde periculosa sunt quae semel vniuersum educunt vacuationes. Nam omne nimium & repentinum est naturae contrarium, Quapropter paulatim euacuandum est.

XI.

Ἦν ὑπὸ λευκοῦ φλέματος ἰσχυρὰ ἀφάρ-
ροια ἐπιζήνται ἰσχυρῇ, λύει τὴν ἰσχυρὰν.

Ei qui leucophlegmatia detinetur, si ventris fluxus superuenerit vehemens, à morbo liberatur. 29. 7.

Speciem aquae inter cutem leucophlegmatiam nominant, quae alba pituita dicitur: haec soluitur alui profluvio vehementi (dummodo hoc non accadat ab imbecillitate facultatis retentricis) nimirum ad aluum delabente eo qui morbum faciebat humore pituitoso.

Felli & Lienì.

I.

Οἱ ὑπερώδεις, οὗ πένυη πλεγματώδεις εἰσιν.

Qui regio morbo laborant non admodum flatuosi fiunt. 72. 5.

Flatuosos dicit qui colligunt in ventre multitudinem venti flatuosi, qui vel per ruellum vel flatus excernitur, vel remanet & extendit quae inibi sunt. Fit autem hoc nonnunquam

quàm ob debilitatem, & partium ad ventriculum attinentium imbecillitatem, nonnunquàm verò ex pituitoso & frigido humore. Hi itaq; qui propter pituitosum humorem flatuosi sunt, contrarij sunt regio morbo laborantibus, utpote biliosis: nam icterus fit à bile flava calida sicca, flatus fiunt à materia frigida humida: Quo fit ut icterici ex humorum exuperantia natura non fiant flatuosi, nisi forte id accidat ob imbecillitatem partium.

II.

Οκόσοι πολλώδεις ὑπὸ δυσεντερίης ἀλίσκονται, τατίοισιν ἐπιγινώσκουσιν μὲν κέρως τὴν δυσεντερίης, ὕδρωψ ἐπιγινώσκουσιν, ἢ λευτερίης, καὶ ἀπόλλυνται.

Quicumq; lienosi à difficultate intestinorum capiuntur, iis supervenientem lōgam difficultatem intestinorum, aqua inter cutem, aut levitas intestinorum excipit, & moriuntur. 43. 6.

Lienosi, hoc est, in liene tumorem habentes ex melancholico humore natum, difficultate intestinorum superveniente, liberantur à morbo, quando ratione evacuationis humorum melancholicorum lienis insertorum, talis difficultas evenerit. Sed quoniā sæpius huiusmodi evacuationes ultra modum extenduntur,

tur, & noxia sunt laborantibus, conuenienter Hippocrates quem finem habeat hæc intestinorum difficultas ostendit: lasis siquidem intestinis transitu vitiosorum humorum, vires eorum laborant, & temperies natui caloris aboletur. Ob hanc igitur causam & leuitas intestinorum ex ipsorum latione superuenit, & aqua inter cutem: nam iecur larga & multa euacuatioue debilitatur & refrigeratur, coarscitur item ventriculus, vnde mors, prostrata eius virtute.

I I I.

Τοῖσι σπληνώδεσι δυστερὲς ἐπιγενομένη, ἀγαθόν.

Lienosis difficultas intestinorum superueniens, bonum. 48. 6.

Lienosis intestinorum difficultas est auxilio, cum per eam vacuantur crassi & melancholici lienem obsidentes humores. Id in superiore aphorismo dictum est abundè.

Apo.

I.

Αἱμορροΐδες ἐν δύνει χρόνιαι, ἢν μὴ μέλα φυλαχθῇ, κίνδυνος ὕδρωπι ἐπιγενέσθαι, ἢ φθίσιν.

A diuturnis sanato hæmorrhoidibus
fi

si vnà nō seruatur, periculum est aquam inter cutem, vel tabem aduenire. I 2. 6.

Hæmorrhoides fiunt ob multitudinem & crassitudinem sanguinis ora venarum, quæ terminantur ad anum, aperientis, hepate ad ipsas reponente facem & aliquando sanguinem melancholicum. Si quis igitur ei hoc intercludat iter, nec vnā ex hæmorrhoidibus relinquat apertam, periculum est ab hydropē vel tabe. Regurgitat enim sanguis ille crassus & feculentus, qui per hæmorrhoidas solebat fluere, in totum corpus. Si in hepar, & vi præpolleat, calorem natium extinguet, ac ita peribit sanguificatio, vnde hydrops: Si in pulmones ruat, excitabit vlem, vnde phthisis accidit. Quare non frustra consulit vnā saltem seruare hæmorrhoidem, ut per hanc euacuetur seculenta ac vitiosa materia hepatis, præsertim in quibus solita est tempore longo per tales venas excerni.

II.

Τοῖσι μελαγχολικαῖσι καὶ τοῖσι νεφριτικαῖσι
αἱμορροΐδεις ἐπιγινώσκειται, ἀγαθόν.

Melancholia & nephritide laborantibus hæmorrhoides superuenientes, bonum. II. 6.

Quod mulieribus est purgatio menstrua, hoc
melan

melancholia morbo laborantibus est purgatio per hamorrhoidas, in quas sese exonerat lien, si quando humore melancholico grauetur. Venes etiam cum ab humore crasso & terreo nephritide vexantur, ex fluxu hamorrhoidum sentiunt non mediocrem lenamen.

Renibus.

II.

Τὰ νεφροὶ καὶ ἰκτέρα καὶ τὰς κύστιν ἀλγύμενα, ἐξωδῶς ὑγιάζονται πρὸς πρὸςδοῦνται.

Renum & vesicæ vitia in senioribus difficulter sanantur. 6. 6.

Vix sanantur in quibusvis, quoniam renum opus & vesicæ indefinens est, quietem autem requirit sanatio: & quia excrementū acre exacerbare natum est, siue vlceris, siue inflammatio, siue aliqua alia passio in ipsis constiterit. Verum in senibus non tantum renum & vesicæ vitia difficulter sanantur, sed & omnes alij morbi, præcipuè longi, qui maxima ex parte comitantur eos ad mortem: Concoqui enim non possunt ob virtutis imbecillitatem & nativi caloris inopiam.

II.

Οὐδὲν οὖν ἢ νεφροῖσι καὶ κύστιν ἔχοντα τὰ προση-
μῶτα συμβαίνει σημεῖα, πόνος ἢ πρὸς τὴν μύσιν
τῆς

τὰς ραχμαίους γίνονται, ἢν μὲν πρὸς τὰς ἐξω τό-
πους γίνονται, ἡ ἀπόστημα πρὸς δέχου ἐσθλόν
ἔστω. ἢν δὲ μᾶλλον οἱ πόνοι πρὸς τὰς εἰσω τόπους
γίνωνται, καὶ τὸ ἀπόστημα πρὸς δέχου ἐσθλόν
μᾶλλον εἴστω.

Quibus autem morbo renali labo-
rantibus mala signa accidunt, doloresq;
circa spinæ musculos fiunt, siquidem
circa loca exteriora fiant, abscessus quo-
que exterius futuros expecta: si verò do-
lores magis circa loca interiora fiant,
etiam abscessus expecta futuros inte-
rius. 36. 7.

Qui longo tempore nephritici sunt, dolo-
resq; circa spinæ dorsivæ musculos sentiunt,
ἢ abscessus accidunt: ἢ autem interni exter-
nivæ futuri sunt pro vario positu musculo-
rum. Nam siue retrò siue antè se firmaverit
dolor, illic quoq; abscessum futurum expecta.

Vesicæ.

1.

Κύαν διακρίνῃ, ἢ ἐκίφαλον, ἢ κεκοίτην,
ἢ φρένας, ἢ τῶν ἐντέρων ἢ τῶν λεπτῶν, ἢ χολικῶν,
ἢ παρὰ θανάτῳ δὲς.

Vesica discissa aut cerebro aut corde,
aut septo transverso, aut aliquo ex tenui-
bus

bus intestinis, aut ventriculo, aut iccore, lethale est. 18. 6.

Vesica vsq; ad spacium interius diuisa, mortem inuitabilem affert: tale siquidem vulnus coalescere non potest, quod sit in parte nervosa, tenui, & exangui.

I I.

Τὰ Δὲ τὸ κύριον Διχχωρίοντες ὁρᾷ δὲ εἰ εἴα τις ὑγιαίνουσαν ὑποχωρεῖται. τὰ ἥκιστα οὐδ' ὄμματα πυρέσει, ταῦτα νοσηδύστερα. τὰ δὲ ὄμματα γίνονται ὑγιαίνουσαν, ἥκιστα νοσηδύ.

Quæ per vesicam excernuntur inspicere oportet an talia sint qualia sanis excernuntur. Quæ igitur minimè similia sunt iis, hæc morbosiora: Quæ verò sanis similia sunt, hæc minimè morbosa. 18. 7.

Quicquid præter naturam est, quantum recessit ab eo quod est secundum naturam, tantam habet prauitatem: Vrina dicitur optima quæ sanorum vrinis simillima est, & quæ sedimentum album, leue, & aequale habet, significat salubrem securitatem, & morbum paucò tempore duraturum: Quæ verò contraria est, & nullam subsidentiam habet, aut aliam habet à supradicta, mala est, & cruditatem significat.

De vrinis.

III.

Οκόσοι πὶ δι' διασηκότα τὰ ἔργα γίνονται, τέ-
τοις παρεχὴ ἰσχυρὴ ἐν τῇ σώματι ἵπν.

Quibuscunque vrinæ distantes sunt
aut inæquales, iis turbatio vehemens in
corpore est. 33. 7.

Per inæquales aut diuulsas vrinas intelligi
vult substantiæ vrine inæqualitatem, qua
rectè dixit fortem significari perturbationem.
Nam superante natura, omnia equaliter
vnita sunt: morbificis verò causis illi seditiosè
reluctantibus, illud quod vincitur quidem
atq; concoquitur aliam habet formam, quod
verò reluctatur, aliam.

IIII.

Οκόσοισιν ἔργα παχία, θερμοδύνα, ὀλίγα
αἵμα ἀπυρίτρισι, πλῆθος ἐπιπλῶν ἐν τῇ πύ-
λιντι, ὡφελίη. μάλα δὲ τὰ ταῦτα ἔχοντες
οἶσιν ἐξ ἀρχῆς ἢ πρὶν παχίαι ὑπόκεινται ἰσχυρῇ.

Quibus adhuc febricitantibus vrinæ
sunt crassæ, grumosæ, paucæ, multitudo
earum tenuis superueniens iouat: præ-
cipuè verò tales veniunt, quibus ab ini-
cio, vel non ita multò pòst, sedimentum
inest. 69. 4.

Non simpliciter vrinas crassas dixit, sed
et grumosas adiecit, duorum alterum osten-
dens, vel crassitudinis quantitatem, vel con-
sistentia inaequalitatem ac diuulsionem, ita
ut plures veluti grumi ipsarum consistentia
circumscripta appareant. Porro non absq; ra-
tione, crassa vel grumosa vrinae sunt multitu-
dine pauca, ut quae vix pertranseant renes per
angustias, veluti per colum defecatorium
emuncta. Cum itaq; maior pars talium hu-
morum malorum fuerit euacuata, et reliquum
simul concoctum, tunc excernuntur multo te-
nuiore prioribus: Tenuiores dico, non tennes
absolute: Nam quae secundum naturam sunt,
neq; tennes existunt neq; crassa, cum haec natu-
ra laborem in segregando et expellendo hu-
morum copiam significent, ille vero morbi et
succorum in venis cruditatem. Sed laudabi-
les medium tenent inter utrumq; excessum,
et cum mediocritatem habeant, crassiores
sunt tenuibus aut aquosis, tenuiores autem
grumosis. Verum ideo multae excernuntur,
quia prius fuere retenta, quo tempore crassa
existentes difficulter exhibant. Fiunt autem et
sine febre tales vrinae, natura expurgante per
renes totius corporis superfluitates; sunt etiam
in febre quae à multitudine et crassitie hu-
morum ortum habet, quorum ratione sedi-
mentum in fundo matulae apparet initio mor-
bi.

hi, non lege natura quæ coctionem initio non perficit, sed ratione gravitatis materie descendenti ad imum. Quo fit ut tale sedimentum boni nihil portendat. Urinæ dijudicantur laudabiles substantia inter tenuem & crassam, colore subaureo, quantitate respondente potui, contentis albis, lenibus, & aequalibus. Contenta trifariam diuisa. Quæ in fundum matula descendunt, hypostasies dicuntur: Quæ ad medium concesserunt, enaeoremata. i. sublationes: Quæ verò ad superficiem peruenierunt, nubes. Porro in hoc differunt, quòd hypostasis, si bona sit. primum obtineat bonitatis locum, enaeorema secundum, & nebula tertium. Præterea enaeoremata materiam tetigisse hypochondria, viscera, & pectus arguunt: Nubes affectum in capite esse. In biliosis autem morbis cum nulla ferè habeatur hypostasis, aut prorsus minima, sat est si enaeorema appareat, aut nubes.

Υ.

Ουόσσιοι ὅ ἐν πυρετοῖσι τὰ ὕρρε ἀναίσταται
 ὑδρὰ οἷον ὑποζυγία, τῆκοισι κεφαλαλγίαν ἢ
 πᾶσι, ἢ περισσύναν.

Quibus febricitantibus urinæ perturbatæ sunt veluti iumentorum, his dolores capitis vel adsunt, vel aderunt. 79. 4.

Urina

Vrinae perturbatae, quales sunt iumentorum aut bouum, dolores capitis praesentes aut paulò post futuros esse denotant. Tales enim fiunt materia crassa ac densa quae à calore agitata in spiritum soluitur, spiritus autem flatuosus unà cum calore promptè fertur ad caput. Non tamen si cui dolet caput aut dolebit, hic statim tales habebit vrinas: fiunt enim dolores capitis etià ex calore solo, nonnunquam verò à flava bile quae vel in capite vel in ventriculo continetur, interdum ex humorum abundantia caput opprimente, vel ex aliqua loci obstructione, vel ex spiritu flatuoso in parte ipsa generato: quorum nullum perturbatam vrinam efficere natum est. Caterùm vrina crassa & perturbata cum sit à succorum multitudine frigidorum & crudorum cum flatuoso spiritu turbationem ciente, non mirum si ob agitationem & evaporationem humorum, dolorem capitis adesse aut breui post adfuturum esse demonstrat. Turbidarum autem vrinarum omnium generalis haec nota esto, conatus naturae coctionem aggredientis, crassi à liquidiore separatio aut propere aut tarde facta, aut prorsus nulla: Tardè quidem vel citò, cum quod subsidit discretum citò vel tardè apparet album, lene, & aequale: Si verò nulla omnino separatio fiat, vel id quod subsidit malum est, significatur imbecillitas natu-

re ope aliqua egentiu ad succos percoquendos, alioqui subacta à materia copia succumbit.

Sed turbida vrina tribus consideratur modis, nam vel turbida multa paulò post residet, vel semper turbida manet : vel pura mingitur : & postea conturbatur. Prima parum aliquid turbulentie inequalis superesse ostendit : Secunda vigere eam adhuc quæ in sanguine est agitationem, & crudorum humorum crassitiem ultra fluctuosam turbationem : Tertia crudi succi coctionem aggredi naturam aut paulò post aggressuram. Sic igitur vrina cum sit sanguinis colatura, aut serosa pars sanguinis à renibus attracta, succorum qui in vasis sunt qualitatem prodit, hoc est, cuiusmodi sit sanguis ostendit, quando si in biliosus sit, serum quoq; eius biliosum esse necesse est, idq; pro utriusq; bilis ratione : Simili modo pituitosum, si is sit pituitosus. Ergo ubi cruentus planè est sanguis, utiq; tenuis aquosaq; vrina cernitur, nihil nec quod sidat, nec quod pendeat in se habens. At ubi is concoctus est, laudabilis in vrina est hypostasis : atq; etiam mehercule quadam tenues superstant, veluti quod in summo lacte colligitur, & quod in summo refrigerati insculi concrevit. Sed si turbida sit, qualis in hoc Aphorismo describitur, crudis refertas venas indicat, non tamen cessare naturam, sed eos valenter concoquere, donec

donec superet, aut præ multitudine humorum ipsa superetur.

V I.

Ο πόσισι εβδομαΐα κρίει, τετίοισι ἐπι-
ήφειλον ἰχθὺ τὸ ἔρει τῇ πετάρῃ ἰερὸν, καὶ τ'
ἄλλα καὶ λόγον.

Quibus septimo die indicatur mor-
bis, iis quarto die nubeculam habet
vrina rubicundam, & alia signa pro por-
tionē. 71. 4

Cum quarta dies sit index, & qualis sit
futura septima nuntiet, quodcumq; signum
concoctionis in ipsa manifestum apparuerit,
futuram septima die indicationem ostendit.
Itaq; non solum rubra aliqua nubes apparens,
antea non visa, indicationem significat, sed
& alba multo magis quam ipsa, adhuc autem
magis & sublimamentum album, leue, aqua-
le & consistens: aut id quod subsidit (si tale
appareat) sufficiens est signum futuræ indica-
tionis. Verum ut alba nubecula vel rubra
bonam, sic nigra in quarta apparens, malam
indicationem in septima die futuram esse de-
monstrat. Soli enim coctionis signis in die-
bus contemplabilibus apparentibus, bonæ in-
dicationes indicantur.

V I I.

Ο πόσισι ἔρει ἀγφάνια, λαδικὰ, ἰσχυρὰ.

μάλιστα δὲ ἐν τοῖσι φρενιτικοῖσι ἐπιφαίνεται.

Quibus urinae perspicuae sunt & albae, malae: praesertim ubi in phreneticis apparuerint. 72. 4.

Urinae quae tinctae non sunt, albae dicuntur, quae si sint etiam in febrientibus transparentes & aquosae, magnam cruditatem significant. Nam cum febris sit biliosa, si natura coqueret, coquendo tingeret multa bile deiectiones, quae tota cum rapitur in cerebrum, febrem auget & phrenitidem excitat. Melius est semper, cum morbus biliosus est, urinas apparere biliosas, ac in alijs suorum morborum qualitatem aliquam representare.

VIII.

Οκόσοισιν ἱλαῖς ἐς τὰ ἄρθρα ἀφίσταται, ῥύεται τὸ ἀποστέματος ἔρρι πολλὸν καὶ παχὺ, καὶ λευκὸν συνόμιον, οἷον ἐν τοῖσι κοπώδεσι πυρι τοῖσι τε περταύοισιν ἄρχεται ἐνίοισι γινώσκου. ἢν δὲ καὶ ἐν τῷ ῥιναῖν αἰμαθρῶα γήση, καὶ πᾶν παχὺ λυάται.

Quibus spes est ad articulos futurum abscessum, liberat ab abscessu urina multa, crassa, & alba prodicens, ut in laboriosis febribus quarto die nonnullis exire incipit: Si vero sanguis quoque à naribus profluxerit, breui admodum leuatur aeger. 74. 4.

Morbi

Morbi longi finiuntur abscessu, vel paulatim natura coquente materiam & expurgante. Quòd si de repente fiat aliqua euacuatio multæ urinae, illa liberat ab abscessu, humore qui decubitus erat in laborantes articulos, unà cum urinis euacuato. In laboriosis etiam febribus, è multitudine crassorum humorum natis, urina multa crassa & alba prodiens in die decretorio, liberat ab abscessu. Quòd si è naribus quoq; sanguis eruperit, tum citissima fit morbi solutio sine abscessu ullo.

I X.

Η αιμαρ η πυον ουρειν, των νεφρων, η τ κυστιος ελκυσιν σημαίνει.

Si sanguinem aut pus mingat, renum aut vesicæ exulcerationem significat. 75. 4.

Sive in renibus, sive in vesica ulcus sit, siquidem in vase aliquo magno ac rupto constiterit, & præcipuè cum aliqua exesione, sanguinis aut puris excretio per urinas sequitur. Vreteres autem qui renes ac vesicam interiacent, oportet unà cum illis intelligere: exulcerantur enim sæpe ijs qui in renibus lapidem habent, quando à lapide aliquo acuto aut admodum aspero in ipsis intersepto excoriantur. Contingit etiam exulcerari penem, unde abs-

que urina pus exit & sanguis. Exit & simul cum urinis aliquando pus disrupto abscessu in aliquo superiorum locorum, ut pulmonum, membrana succingentis costas, & hepatis, cum abscessus materia ad urina instrumenta defertur. Præterea mulieribus est aliquando cruenta urina, quibus menses suppressi sunt, sed sine pure, ut non statim & temerè pronuntiandum sit de locis unde fiat fluxus, quando sanguis aut pus cum urina excernitur. Verùm dolor qui in differentibus accidit locis, & exuentia cum urinis ostendunt maxime qua pars affecta sit.

I.

Οκρόσιον ἐστὶ τὸ ὅθεν παχὺ ἰόντι Capula
μικρὰ, ἢ ὡς αἶμα τείχεος ξυμμιχέονται, ὑγίαι-
ον ἀπὸ τῶν νεφρῶν ἐκκρίνεται.

Quibus cum urina crassa, caruncula parva aut veluti capilli una exeunt, iis à renibus excernuntur. 76. 4.

Caruncula cum urinis mediocriter crassa exeuntes renum quidem partes sunt, quas ob vehementem ulceris erosionem anulsas esse constat. Qui verò veluti capilli exeunt à renibus cum urinis, nullo modo renum partes esse possunt, neque enim fieri potest ut ad talem substantia formam renes quantum exulcerati dispo-

dissoluantur, Ex renibus autem ipsos excerni dicimus, non quòd pars sit substantia eorum, sed quoniam in ipsis suam habuerunt consistentiam: nam ex humore crasso in renibus quodammodo vřlo, substantia capillis similes generata cum vrina simul egeri possunt.

I I.

Οξόουσιον ἐν τῇ οὐρᾷ παχὺ ἐστὶν ἀπορρίπ-
 τεισθαι συνηθισμένον, ὑπερίκειν δὲ χόλιν ψωπίαν.

Quibus cum vrina crassa, fursurea quædam simul prodeunt, iis vesica scabie laborat. 77. 4.

Quando vrina tenuis & aquosa fuerit, non secundum naturam vena se habent: Cùm verò non tenuem, sed mediocrem habuerit substantiam (in quo significato crassam accipere oportet hoc loco) ea qua simul cum tali vrina excernuntur, circa renes aut vesicam passionem ostendunt. Cùm enim ex renibus vrina veniat, in renibus autem percoletur, in vesica verò aggregetur: quicquid in ea præter naturam apparuerit, aut venas, aut renes, aut vesicam malè se habere indicabit: sicuti & nunc fursurea vesicam scabie laborare, quando vena nullum affectum habent. feruntur enim & ex ipsis aliquando fursurea, cùm earum tunica patitur, quemadmodum & vesica.

sica. Non enim alia ratione vena ipsa quam vesica scabie laborantes, furfureos cortices unam cum urinis emittunt: sed distinctio fiet ex tenuitate ac crassitudine urine. Tenuis enim urina venas & totum corpus, non tenuis autem vesicam pati, quoties huiusmodi fursurea cum urinis exhibent, indicabit.

XII.

Ὅσοι ἀπὸ τῶν ἐμῶν αἵματι ἔξουσιν, καὶ ποιοῦσι ἀπὸ τῶν νεφρῶν φλεβίᾳ ῥῆξιν σημαίνῃ.

Quicumque sanguinem repente mingunt, iis à renibus venula rupta significatur. 78. 4.

Cum diuersis ex causis renes cruentam urinam excernant, nam aut propter imbecillitatem renum urinam subinde secernere nequeuntium, aut propter amplitudinem osculorum ex vena cava urinam ad renes excolantium, aut propter erosionem ab acerbis humoribus factam, aut propter vena alicuius renibus ruptionem, mixtio sanguinis accidit. nunquam tamen syncerus, copiosus, & repente cum urina sanguis excernetur, nisi vena ruptio facta sit in renibus: veluti contingit quibus qui graue onus leuarunt, aut valde saltarunt, aut ex alto ceciderunt, aut aliud quippiam tale violentum pertulerunt.

X I I I.

Οκόσοισιν ἐν τῷ ἔργῳ ψαμμώδεα ὑφίσταται.
 τεύχουσιν ἢ κύστις λιθία.

Quibus in vrina velut arenulæ subsi-
 stunt, iis vesica laborat calculo. 79. 4.

Sine in renibus siue in vesica calculi gene-
 rantur, in vrinis subsident arenosa. Ideo man-
 cus esse videtur aphorismus, qui de vesica tan-
 tum mentionem fecit.

X I I I I.

Ἡ αἷμα ἔρειν, καὶ θρόμβους, καὶ τραγυρίην.
 ἔχη, καὶ ὁδὸν ἐμπιπὴν εἰς τὸ ὑπογάστριον, εἰς
 τὸ πτερίλαιον, τὰ πρὸς τὴν κύστιν ποιεῖ.

Si quis sanguinem mingat & grumos,
 & vrinæ stillicidium habeat, dolorq; ad
 anum ventrem, pectinem, & femem in-
 cidat, ea quæ circa vesicam sunt labo-
 rant. 80. 4.

Ea quæ memorat symptomata, si accidunt
 vnà aut seorsum, communia sunt affectibus
 omnium, quæ vrina seruiunt, instrumētorum,
 vesica, renum, vrinariorum meatuum. Porro
 vbi legitur semen, intellige locum inter anum
 & pudendum, inter femineum dictum, Gra-
 ecis Perinaeum.

X V.

Ἡ αἷμα καὶ πῦον ἔρειν, καὶ λιπίδας, καὶ ὁσμὴν
 βαρύν.

βαρεῖν ἢ, τὸ κύστις ἐλκεσθαι σημαίνει.

Si sanguinem & pus minxerit aut squamulas, & grauis odor adfit, vesicæ exulcerationem significat. 81. 4.

Sanguinem quidem & pus mēiere, omnium instrumentorum quæ vrina obseruiunt, sunt signa communia. Odor autem grauis & insuauis, adhuc autem magis squamulae sunt propria vesicæ malè affectæ signa.

XVI.

Οξόσοισιν ἐν τῇ ἐρήθρῃ φύμῃ φύεται, πυρρίοισι Διὰ πυλῶντος καὶ ἐκφυγόντος, λύσις.

Quibus in urinaria fistula tubercula nascuntur, iis, suppuratione facta & eruptione, solutio accidit. 82. 4.

Ob sermonis breuitatem nihil magni hoc haberi aphorismo suspicabitur quispiam: facile enim est unicuiq; intelligere, quòd in meatu urinario qui in pene est (hunc etenim meatum fistulam urinariam nominant) si consistant tubercula, & mox rumpantur, fieri solutionem. Verùm si diligentius animaduertimus, maius aliquid ex eo ostenditur. Contingit enim urinam aliquando retineri ob tale tuberculum, ex cuius diruptione sanitas proculdubio sequetur, doloris & suppressionis vrinae solatio.

XVII.

XVII.

Οὕτως γὰρ πολλὰ γίνεται, σμικρὴν
τὴν ὑποχώρησιν σημαίνει.

Miclio noctu plurima facta, exiguam
significat deiectionem. § 3. 4.

Ergo si des operam ut cesset alui profluuium,
moue urinas, ac minorem potum exhibe: Si
verò cupias astrictam aluium mouere, libera-
lem potum indulge, qui per urinas statim non
coletur. Vnius enim solutio, alterius est astri-
ctio, & contrà.

XVIII.

Οκίσσισι πυρίσσει ἐν τῇσι ἕρσει κριμέν-
δης αἱ ὑποστάσεις γίνονται, μακρὴν τε καὶ ἀρ-
ρωσίαν σημαίνουν.

Quibus febricitantibus urinae sedi-
mina crassioris farinae speciem refe-
runt, diuturnum fore morbum signifi-
cant. § 1. 7.

Qui febricitantes mingunt urinam similem
farinae crassiori, si saluari debeant, viribus exi-
stentibus robustis, non nisi tardè liberantur,
quia crassa materia quae exiguo tempore dis-
cuti non potest, in longum producit agra-
tudinē. Qui verò cum tali urina imbecilliores
fuerint, ac in morbo exitialiter se habuerint,

morte

morte præcipiuntur antequàm ægritudo diutius protrahatur.

XIX.

Οκόσσιοι δὲ χολώδεις αἱ ὑποστάσεις, ἄνω-
θεν δὲ λεπταὶ, ὁξείην ἀρρώσιν σημαίνει.

Quibus verò sedimina nunc sunt biliosa, quæ ab initio fuerunt tenuia, acutum morbum significant. 32. 7.

Quum sedimina vrinarum ab initio tenuia fuerint, & subinde biliosa fiunt, acutum & breuem morbum significant: nam biliosum semper acutos morbos operatur. Biliu autem appellatione sine alia adiectione, cholericus humor intelligitur, vt. atra biliu nomine, melancholicus.

XX.

Οκόσσιςιν ἐν τῷσιν ὕρσοισιν ἰφίσται) πομφόλυγες, νεφελικὰ σημαίνει καὶ μακρὴν τὴν ἀρρώσιν ἔσεσθαι.

Quibus in vrinis superstant bullæ, iis morbum renum, & longum fore significant. 34. 7.

Bullæ fiunt ab humiditate quæ à flatuoso spiritu circum extenditur. Solet autem hoc magis accidere quando humor aliquid tenacitatis habet: tunc enim bullæ ipsæ sunt stabiles.

les & difficulter solubiles. Cum igitur spiritus flatuosus una cum urinis excernitur, signum est frigida agritudinis renum. Quod si frigida est agritudo, ut sit longa necesse est: frigidum enim omne est difficulter solubile, & vix coctionem admittit, atq; ideo diu durat.

X X I.

Οκίστοισι δὲ λιπαρὴ ἢ ἐπίπλωσις καὶ ἀδρὴν, πυρίοις νεφελῶν, καὶ ὀξὺς σημεῖον.

Quibus in vrina pinguedo supernatat & confertim exit, iis renum vitium & acutum morbum significat. 35. 7.

Sive alui excrementum, siue vrina pinguis fuerit, ex colliquatione adipis sit non magis in renibus quàm in toto corpore existentis: quare non propriè morbi renalis est signum, sed consumptionis vniuersi corporis, & commune omnis adipis ab igneo calore colliquati. Verùm hoc discrimen est, in alijs enim partibus corporis adipis colliquati paulatim & non confertim cum vrina exeunt, primùm colliquatione participata à venis illi vicinis, deinde ab ijs quæ continuantur, & rursus ab alijs, donec ad renes perueniant. Adipis verò circa renes colliquati, transsumptio ad vrinas celerrima est, & non paulatim, sed confertim fit, atq; ideo in renibus ipsi dispositio esse mon

m stratus:

stratur: Cui rei & experientiam si diligentius animaduerteris, inuenies consentientem.

Mulierum affectibus qui conueniunt.

I.

Τὰς κυέσας φαρμάκων δὲ, ἢ ὀργῇ, πλεονεχίᾳ καὶ ὑστερίᾳ, ἐπὶ τὰ μὲν αὖν, ἥσασιν δὲ ταύτας, τὰ δὲ νύκτα, καὶ περισσὺν πρὸς διὰ δαδίνουσαι χρόν.

Vtero gerentes sunt medicandæ, si materia turget, quarto mense, & vsq; ad septimum, sed hæc minus. A iuniore autem sætu & seniore abstinere oportet. I. 4

Fætus eandem proportionem habent cum vtero, quam fructus cum arboribus: hi siquidem in prima generatione debilioribus pediculis continentur, & ideo faciliè decidunt quando vehementior ventus ipsos concusserit. postea verò aucti difficilem habent ab arboribus dissolutionem: sicuti rursus cùm perfecti sunt, sponte sua sine vi extrinseca decidunt. Eodem modo & conceptus: in primo quidem tempore quo semen nuper injectum est, si aliquando saltare contigerit mulierem, aut in lubrico cadere, siue quouin alio modo, vel secundum animam, vel secundum corpus moueri, & re-

ri vehementius, facile dirumpuntur: sic & quando iam perfecti sunt: tempore verò intermedio ligamenta habent robustiora: quare mulier utero gerens, potest fortiores motus sustinere sine factus offensione. Quæ omnia Hippocrates noscens rectè inquit: Utero gerentes sunt medicanda, si materia turget, quarto mense & vsq; ad septimum, quod est tempus medium factura, cum factus utero firmiter alligatur. Non tamen omnes quæ hoc tempore indigent purgatione, permittit purgari, sed si materia turget, inquit, hoc est, urget & cogit accelerare. Tractum enim vocabulum est ab animalibus ad coitum incitatu. Nam cum superabundantes humores mouentur, & per totum corpus feruntur, nondum in aliqua parte firmati, tunc ad eos expellendos natura incitatur, & aliquo indiget manum porrigente, & hunc humorum motum ad alium deducente. Eos verò qui aliqua in parte firmati sunt humores non oportet mouere. Sic enim dictum est ab Hippocrate: Quicumq; inflammationes, in morborum principio, medicamento conantur soluere, nihil de eo detrahunt quod acervatum est & inflammatum, neque enim morbus, cum crudus sit, cedit: quæ verò sana sunt, & morbo resistent, absumunt contabesciuntq;. Quod autem dixit, à iuvene factu & seniore oportet abstinere, eo voluit

intelligi, quæ quartum mensem impregnationis nondum attigerunt, aut ad septimum usque progressæ sunt, eas non esse medicandas medicinis purgantibus. Verùm Hippocrati & Galeni saculo, maiore purgabant religione, quia valentiora tantum medicamenta noverant, cuius generis sunt Helleborus, Colocynthis, Scammonium, Turpetum, Hermodactylus, & alia huiusmodi. Nobis autem sunt clementissima medicamenta, quibus uti possumus ipsa re exigente, etiam ante quartum mensem, ut Cassia, Manna, Rhabarbarum, Tamarindum, confectio Catholici, &c. licet post quartum mensem tutius huius utamur. Ut demus ante quartum mensem & post septimum, prægnantes acuto aliquo morbo correptas offendi à medicamento quod suadente necessitate datum est, tamen præstat ista ratione ledi utrumque, matrem scilicet & fætum, quam ut nullo prorsus dato, & matrem & fætum de vita periclitari patiamur.

II.

Γυναίκεσιν ἀρωγὸν ἢ ἐν δρόμοις πυρίη. πολλὰ γὰρ ὅς τις εἰς ἄλλας ζῆσιμης ἀνὴρ, εἰ μὴ καρτερίας ἐν ποίῳ.

Suffitus aromatum muliebria ducit, sæpius verò & ad alia utilis esset, nisi capitis faceret gravitatem. 18. 5.

Mulie

Muliebria dicit purgationes quæ ex utero singulis mensibus & à partu fieri solent. Vbi mulier est matura viro, plus ei natura conficit sanguinis quàm sit ipsi nutrienda ex usu, qui cum incipit esse molestus venis & arterijs, foras erumpit per uterum. Ea tamen quæ propter inflammationem ipsius uteri, vel eversionem, aut aliam similem causam non purgantur statis temporibus, non aliter rectè curabuntur, quàm eam passionem uteri remouendo, quæ suppressionis mensium est causa. Verùm quibus absq; hac passione parcius fluunt menses, aut propter sanguinis crassitiem, aut acetabulorum obstructionem, vel propter horum obserationem, totiusve substantiæ densationem, ijs prouocantur suffitu Casia, Costi, Amomi, Cinamomi, & similium calidorum aromatum, quorum vapor in vasa uteri receptus, obstructiones soluit, extenuat, incidit suo calore lentos humores & ad fluxum apparat. Sed quia vapor calidus est & tenuis, qualitatem malam materialium uteri secum rapit & tollit in caput: vnde grauitas.

III.

Γυναῖκί ἐν γαστρὶ ἰχθύου ὑπὸ λυγροῦ ἢ ὀξείου τοῦ σημάτου ληφθῆναι, θανάσιμον.

Mulierem utero gerentem capi ab aliquo morbo acuto, lethale est. 31. 5.

Non absq; ratione lethale est. Si enim sit cum febre morbus acutus, necesse est esse continuam febrem, talis enim est morbus acutus: & in hoc duplex periculum, vnum quidem ex febre ipsa, alterum ex alimenti defectu. Nā acutus morbus tenuissimum victum exigat, qui periculum abortus adfert, foetu ipso inedia pereunte. Si verò ut seruemus hunc non verebimur crebrò cibum exhibere, febrem continuam victu intempestivo augentes, matrem necabimus. Sed si absque febre morbus aliquis acutus alius gravidam mulierem invadat, veluti morbus comitialis, morbus atrox, convulsio, tetanus, propter magnitudinem morbi & vehementiam fieri vix potest ut laborans evadat. Ergo illi, aut foetui, aut utriq; cadendum, saltem ingens periculum impendet ab aliquo morbo acuto.

III.

Γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλεβορρηδεῖσθαι οὐκ ὀφείλει, καὶ μᾶλλον εἰ μείζον ἐστὶν τὸ ἔμβρυον.

Mulier utero gerens sanguine misso ex vena abortit, & præcipuè si foetus sit grandior. 31. 5.

Gravidis non temerè secunda vena est, propter periculū abortus quod sanguinis missionem immodicam aut intempestivam comitatur, præsertim cum foetus grandior indigeat

alimen

alimento copiosiore, & subtrahatur illud ex quo nutritur per sanguinis eductionem. Verum in acutis morbis, in quibus mater & fœtus unâ periclitantur, incidere potest necessitas venam secandi, & pharvacum exhibendi, modo virtus, ætas, corporis habitus, vietus ratio que præcessit, tempus, Ceterique status hoc ipsum permittant, ne si remedio destituantur, pereant.

V.

Γυναὶκὶ αἵμα ἐμίσση, τὸ καὶ ἀμηνόων παρὰ τὴν λύσιν γίνεται.

Mulieri sanguinem euimenti, menstruis erupentibus, solutio aduenit. 32. 5.

Renulsio in contrarium molienda, sursum scilicet, repentibus humoribus deorsum: deorsum, sursum: intrò, foras: Quod ex natura manifestum est operibus.

VI.

Γυναὶκὶ τὸ καὶ ἀμηνόων ἐκλυπόων, αἷμα ἐκ τῶν ῥινῶν ῥυήται, ἀχαδόν.

Menstruis deficientibus sanguis ex naribus fluens, bonum. 33. 5.

Eadem ex causa, profluvium sanguinis à naribus auxilio est ei malo quod ex suppressis contra naturam mensibus ortum est.

VII.

Γυναικὶ ἐν τῇ ἐχθρῇ ἢ ἡ κυλιν πολλαὶ
ῥυῆ, κίνδυνος ἐκτελεσθαι.

Mulieri in utero gerenti si alvus plu-
rimum profluat, periculum est ne abor-
tiant. 34. 5.

Si mulieri gravida fluat alvus supra mo-
dum, periculum est ne defectu alimenti pereat
infans: non enim tum fit proba coctio, nec cibi
distributio, cum immodicè fluit alvus.

Γυναικὶ ὑπὸ ὕστρικῶν ἐνοχλησθῆναι ἢ δυσχερὲς
εἶναι πλάρυος ἐπιγενέμενος, ἀγαθόν.

Mulieri quæ ab uteri strangulationi-
bus infestatur, aut quæ difficulter par-
tum edit, sternutamētum superueniens,
bonum. 35. 5.

Sternutatione significatur, quòd natura
quæ prius erat sopita & obruta, iam collectis
viribus expurgiscitur & redit ad se. Signum
ergo bonum sternutatio, & causa etiam iuva-
minis est, quia vehementiore concussu partim
quidem naturam excitat, partim verò ex-
cernit quæ partibus corporis firmiter infixæ
hærent.

IX.

Γυναικὶ τὰ κατεμύσσια ἄγιστα εἰ μὴ κα-
τὰ

τὰ τὰ αὐτὰ ἀντὶ γινόμενα, καὶ ἀγνοῖας δέχεται
σημαίνει.

Mulieri menses decolores nec per
idem semper tempus venientes, purga-
tionem indicant esse necessariam. 36. 5.

Mulieri temperata menses debent esse ru-
bicundi: biliosa, flauicantes: melancholica,
nigricantes: Pituitosa, albi. Pro diuersitate
coloris alieni à solito & laudabili, purganda
est medicamento. ducente nunc bilem, nunc me-
lancholiam, nunc verò pituitam; id autem
indicabit mutatio ipsa coloris consueti.

Τὸν αὖτις ἐν γαστρὶ ἰχθυῶν τῶν οἱ μεγάλοι ἰχθυ-
φῶς ἰχθυοὶ γίνονται, ἐκλίσειον.

Mulieri grauidæ si mammae repente
extenuentur, abortit. 37. 5.

Gracilitas mammarum abortum futurum
portendit, ob defectum alimenti: Communes
enim quaedam venæ sunt mammae ac vtero,
quæ ubi parum habuerint sanguinis, fœtu
inde alimentum rapiente, graciles mammæ
relinquunt, & inedia fœtum nonnunquam
perire sinunt, nonnunquam verò eundem ad
excretionem excitant: nam fœtum, indigentiam
vutrimenti non ferens, voluendo sese & cal-
citrando rumpit membranas quibus in vtero

continetur, & sibi ad nativitatē viam parat, ac intempestivè foras exit. Succursurus medicus debet ea dare quæ cito sanguinem generent, & augeant.

XI.

Γυναὶκὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἢν ὁ ἴτερος μακρὸς ἰχθὺς γένῃ διδύμα ἐχούσῃ, θάτερον ἐκλήρωσται. καὶ ἢν ῥᾶ ὁ δεξιὸς ἰχθὺς γένῃται, τὸ ἄρσεν, ἢν δὲ ὁ ἀριστερὸς, τὸ θῆλυ.

Mulieri gravidæ geminos ferenti si altera mātma extenuatur, alterum abortit: Et si quidem dextrā extenuatur, marem: sin sinistra, fœminam. 38. 5.

Existētibz in utero geminibz, altero mare, altero fœmina: si dextra quidem mamma areseat ac extenuetur, mas in periculo est, ob eam quæ prius dicebatur causam, nimirum ob alimentī inopiam: si verò sinistra gracilis fiet, fœmina. Nam fœtus fame excruciatī, appendices & ligamenta dilacerant, atq; hac ratione mulier abortit.

XII.

Ἡ γυναὶκὶς μὴ κύουσα, μηδὲ περικύβητος γάλα ἔχει ταύτῃ τὰ κατὰ μίαν ἐκλήρωται.

Si mulier quæ neque grāvda est neq; peperit, lac habet, huic menstrua defecerunt. 39. 5.

Alimentum trifariam dicitur Hippocrati: est enim quod exquisitè adsimilatum alit . est veluti alimentum, est & quod alere debet, aut quod aliquando alet. Derelictus autem similis quidem nature partis humor aliquis existit, ut in ossibus, medulla: in hepate, sanguis: spiritus humor, in carne pulmonis: & in articulorum compagibus, glutinosus humor: & in testibus & assistentibus anfractibus, semen: & in lingua, saliva: sunt etiam quidam in mammis adenes, vim habentes id quod influit alterandi: cum autem sint exangues & albi, proprium efficiunt humorem talem quale est lac, atq; huius plus faciunt, quanto plus alimenti deferitur ad ipsos, plus autem deferitur octavo & nono mense conceptionis. Fit etiam tale quandoq; licet admodum rarò, cum mulier gravida non est nec peperit, quando ad similem pervenerint communes vene mammarum & uteri repletionem, ex menstruorum retentione: id verò tum accidere potest, cum sanguis, qui euacuabatur per menses, regurgitavit in mammas.

XIII.

*Γυναιξὶν ὀρόσηον ἰς τὰς μαστοὺς αἷμα συ-
πύφεται, μαστὶν οὐμαί, &c.*

Si mulieri coaceruatur sanguis in mammis, furorem indicat. 40. §.

Eorum

Eorum adenum qui sunt in mamma exanguis est natura, & frigida, omne enim exanguie frigidum: Quinetiam eum qui ad ipsos deferitur sanguinem, in lac frigidius sanguine transmutant. Sed si transmutari non potest sanguis eò delatus, aut propter abundantiam, aut propter feruorem eius & prauitatem, furorem indicat: labitur enim biliosissimus per totum corpus, caputq; potissimum petit, ut minimè sit mirum eas mulieres, quibus hoc accidit, in furorem agi, sit enim furor & mania à sanguine bilioso in caput delato.

XIIII.

Γυναῖκα ἢ θήλειαν εἰδέναι εἰ κύβη, ἢ πᾶν καρβαδίον, μέλι, ἢ μελίκερτον δίδόναι πικρὸν, καὶ ἢ μὲν σφόδρα ἔχει ἀεὶ τὸν γαστήρα, κύβη. ἢ ὅ μὴ, οὐ κύβη.

Si nosse velis num mulier conceperit, quum dormitura est à cœna ei aquam mulsam bibendam dabis: Et si cruciatus hanc circa ventrem corripuerit, concepit: sin minus, non concepit. 41. 5.

Mellicratum crudum ventrem & intestina flatibus implet, qui facilem non habentes exitum in muliere quæ concepit, ob vteri compressionem, tormina generant: in ea verò quæ non concepit, flatum quidem à mellicrato fieri possunt,

possunt, sed hi exhalantur absq; torminibus.
hoc tamen signum conceptus certum non est,
nec perpetuum.

X V.

Γυνὴ ἔσθνος εἰ μὴ ἄρρει κούφ, δύχρεος ἐστίν,
ἢ δὲ θῆλυ, δύχρεος.

Mulier si marem concepit, benè colorata est: si verò fœminam, malè colorata. 42. §.

Quæ marem concepit, melius est seipsa colorata, nimirum à calore, quia mas est calidior fœmina. Nec est hoc signum certum: sunt enim & fœminæ viragines, & viri effœminati.

X V I.

Ἡν γυναικὶ κυῖση ἐρυσίπιδας ἐν τῇ ὀστέῃ γίνῃ, θανατῶδες.

Si mulieri gravidæ in utero fiat erysipelas, lethale. 43. §.

Si febris acuta sola fœtum interimere potest, non mirum si erysipelas in utero ex sanguine feruido & bile natum, quod febris acuta consequitur, hoc ipsum efficiat.

X V I I.

Οκόσση παρὰ φύσιν λεπταὶ ἔσση ἐν καρδίᾳ
ἐχθροῖς,

ἔχουσιν, ἐκτετρώσκουσι πρὶν ἢ παχυνθῆναι.

Quæcunque præter naturam tenues existentes utero gerunt, abortiunt priusquam crassescant. 44. 5.

Quantò magis accedit mulier ad mediocritatem, tantò est aptior concipiendo, et in tempore pariendo. Quo fit ut supra modum extenuata, fœtum portare non possit ad tempus legitimum, ob alimenti inopiam: si verò vehementer emaciata post conceptionem crassescat, signum est quod alimentum totum assumitur in mulierem, et sanguis ad conceptus alimentum deputatus, ad eam quæ concepit nutritionem recipiatur. Quare non absque ratione, fœtus sufficienti indigens alimento, corrumpitur.

XVIII.

Οἰόσται ὃ μείζων τὸ σῶμα ἔχουσιν ἐκτετρώσκουσι διμῶνα καὶ τετμῶνα ἄτερ αἰσθησίου φαινήσῃς, ταύτησιν αἱ κατὰ ληθόνες μύξαι μάλιστα εἰσὶ, καὶ οὐ δύναται κατὰ τὸ ὑπὲρ βάρους τὸ ἔμβρυον ἀπὸ ἀπέρρηγνυται.

Quæcunq; mediocri corporis habitu præditæ, secundo & tertio mensibus sine causa manifesta abortiunt, iis acetabula uteri plena mucoris sunt, neq; præ pondere fœrum continere possunt, sed rumpuntur. 45. 5.

Mulier ante quārtum mensem plus obnoxia est abortioni. Quare temperata etiam quæ fuerit, si secundo aut tertio imprægnationis mense abortiat, idq; fiat non ab alimenti penuria, non à fibre vehemente, evacuatione immodica, erysipulate, aut alia quapiam occasione manifesta, ei sunt acetabula plena mutorum. Nam si pituita intercedat mucosa interiorificia illa (Græcè dicuntur cotyledones, quæ sunt ora velut oribus iuncta) faciet ut amplius non hæcant sibi: unde soluta, ut ita dicam, contiguitate, sequitur abortio.

XIX.

Οκόσαι παρὰ φύσιν παχύνει ἔχουσιν μὴ ἐνδεδυμέναι ἐν τῇ γαστρὶ, ταύτησι τὸ ἐπίπλοον τὸ σόμα τῆ ἱστίων ἀσπιδίζεσθαι πρὶν ἢ ἀπλωθῆαι ἐκόςαι.

Quæ immodicè crassæ concipere nequeunt, iis omentum os uteri comprimit, & priusquam extenuentur non concipiunt. 46. 5.

Supra modum tennes concipiunt quidem, sed abortiunt ob alimenti defectum: crassæ verò nimium non concipiunt. Nam omentum cum adipe multo tegens intestina, os internum uteri tantum comprimit, ut genituram non excipiat. Quare nisi ad mediocritatem redeant, concipere non possunt.

X X.

Ἡ ὕστερη ἐν τῇ ἰσχυρῇ ἔγκλειστη ἀλμπύση, ἀνάσκει ἐμμοτον γινέσθαι.

Si vterus, ea parte qua coxæ incumbit adiacet' ve, suppuratur, necesse est emmotum fieri. 47. §.

In vteri suppuratione ad exteriora, necesse est per emmotum fieri curationem, hoc est, linteorum carptū cum idoneis remedijs applicari parti necesse est, ne si absq; linamentis medicamentum imponatur, effluat ipsum, & ex eo nulla percipiatur utilitas.

X X I.

Εὐστυα, τὰ μὲν ἄρσενά ἐν ῥῖσι διζυίοισι, τὰ δὲ θήλια ἐν ῥῖσι ἀριστεροῖσι μάλλον.

Fœtus qui mares sunt, in dextra vteri parte: qui fœminæ, in sinistra magis continentur. 48. §.

Par est vt qui calidior est fœtus, in calidiori vteri parte cōsistat. Calidior autem vteri pars est dextra, eo quòd iocinori è directo subdita sit. Quo fit vt in dextra parte magis consistant mares, fœminæ in sinistra.

X X I I.

Ἐς ὕστερον ἐκπλάσις πλατυκὸς ἐπιλάσις ἐπιλαμῶντι τὴς μυκτῆρας ἐπὶ τὸ σῶμα.

Vt

Vt secundæ procidant , sternutatorio
apposito nares & os comprime. 49 §.

Secunda seu secundina corium est sætum
inuoluens: hæc si post partum remaneret in
utero, odoris granitate caput repleret, & sto-
machum putrefacta euerteret. Quare maturè
excutiendam esse docet, apposito sternutatorio
ex pipere, pirethra, helleboro, vel castorio con-
fecto, vel ex similibus. Sternutamenti enim
violentia & concussione, secundina deorsum
fertur, ore præsertim & naribus oclusis, ve
spiritus ad infernas partes descendens, expul-
tricem vim adiuvet in educendis locis.

X X I I I .

Γυναῖκι τὰ κατὰ μῆνα ἢ βούλῃ ἐπιχρῆν, σι-
κὴν ὡς μεγίστω πρὸς τὰς ἰσθμὸς πρὸς σάλλα.

Si mulieri menstrua fistere volue-
ris, cucurbitulam quàm maximam sub
mammis defige. 50. §.

Sunt communes utero & mammæ vena:
per reuulsionem ergo retrahitur sanguis sur-
sum, affixa sub mammæ ingenti cucurbitula.
Sed non est fidendum vni remedio, tentanda
quoq; sunt & alia, repellentia, astringentia,
emplastica, &c.

ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΤΟ ΧΙΙΙΙΙ. ΕΛΕΓΕΤΟ ΔΕ ΤΟ

Οκόσται ἐν γαστρὶ ἔχουσι, τούτων τὸ σῶμα
 ἔστιν ἐν σπλάγχνοις συμμέμικτον.

Quæ utero gerunt, his uteri os coar-
 ctatum est. 1. 1. 5.

Post conceptionem eam arte clauditur ute-
 ri os, ut ne acicula quidem pateat, ne calor
 nativus factum ipsum fovens expiret, aut ne
 frigus offendens subintret. Adveniente ta-
 men in coitu novo semine, aperitur interdum,
 unde superfœtatio: quæ, licet admodum raro
 fiat, fieri tamen aliquando potest.

ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΤΟ ΧΙΙΙΙΙ. ΕΛΕΓΕΤΟ ΔΕ ΤΟ

Ἡ γυναῖκί ἐν γαστρὶ ἔχούσα γάλα πολὺ ἐν
 τῇ μαστῶν ῥυῇ, ἀδείνεις τὸ ἐμβρυον σημαίνει. ἢ
 εἰ περὶ αἱ μαστοὶ ἴσως, ἐμφύεται τὸ ἐμ-
 βρυον σημαίνει.

Mulieri utero gerenti si lac è mam-
 mis plurimum effluat, imbecillum esse
 fœtum significat: si verò solidæ mam-
 mæ fuerint, saniores esse fœtum in-
 dicant. 2. 5.

Si multum sanguis fertur, ad mammas per
 venas communes utero & mammas, paucus ad
 uterum feretur: Vnde cognoscetur imbecillitas
 fœtus, qui parum sanguinis absorbat. Præterea
 est mala causa, quia citius impudica vacuat

tio noxia est utero gerenti. Liquet autem quòd mulieris gravis mammas neque tenuēs oportet apparere, sicut in muliere non gravis, (hoc enim signum inopiam sanguinis ostendit, & hac ratione fœtus in ipsis corrumpitur) neque adro plenas ut lac effluat, sed tantum inunctescere, ut solida tangentibus videantur. Media enim hac consuetudine inter remittentes, propter nimiam repletionem, & molles ac laxas; propter defectum sanguinis, est laudabilis: mediocriter enim impleta ipsi fœtui satis esse alimentum demonstrant, reliquum verò sanguinis, quo non eget, ad mammas deferri, ut illic in lac mutatum prælo sit infanti, ubi primum in lucem editus fuerit, ut inde alatur.

I X V I.

Ονόμαζ' ἄγ' φθείρει μέλλουσι τὰ ἔμβρυα, τὰ ὀτρύνει ἡ ὑπὸ τοῖς ἰσχυροῖς γίνονται. ἔν δὲ πάλιν οὐκ ἔστι ζῆλον, ὁ δὲ ἡ ἑστὴ ἢ ἐν τῷ ὑπὸ τοῖς ἰσχυροῖς, ἢ ἐν τῷ ἰσχυροῖς, ἢ ἐν τῷ ὀφθαλμοῖς, ἢ ἐν τῷ γένει, καὶ ἡ ἄγ' φθείρουσι.

Quæ abortum facturæ sunt, his mammae extenuantur: Si verò contra duræ fiant, dolor erit vel in membris, vel coxis, vel oculis, vel genibus, & non abortient. § 3. §.

Mammæ tenues omnino præcedunt fœtus

corruptionem. Extenuantur autem vel penuria sanguinis, vel eius transmissione ad uterum dolentem à causa aliqua abortiva. Natura siquidem ad afflicta uteri partem transmittit sanguinem, quo destitutas mammæ contingit arescere ac extenuari. Si verò extenuata, rursus dura fiant propter materiam supernuam quæ illuc ab utero deferitur, dolor mammæ infestabit, aut coxas, aut oculos, aut genua, si in has partes natura reposuerit inutilem materiam, & non abortient, utero scilicet ea materia liberato.

X XVII I.

Οκόσηται τὸ σῶμα τῶν ὑπερίων σκληρόν ἐστὶ ταύτης αἰτία καὶ τὸ σῶμα τῶν ὑπερίων ἐγμύον.

Quibus os uteri durum est, iis coarctari id ipsum necesse est. § 4. §.

Os uteri coarctari commune est signum & tumoris alicuius in eo existentis, & conceptionis in muliere, id quod oportet ex duritie distinguere: Nam gravidæ molle est, & secundum naturam: in quibus autem est tumor præter naturam siue phlegmona similis siue scirrhus, durum.

X XVII I I.

Οκόσηται ἐν γαστρὶ ἔχουσα ὑπὸ πυρετῶν καὶ βαρύνει

ἐκίονται, καὶ ἰσχυρῶς ἰσχυαίνονται ἄνδρ' ὁποῦν-
τος φανερῆς, ἡκίωσι χαλεπῶς καὶ ἐπικινδυνῶς,
ἢ ἐκείνῃ ὥσπου κινδυνεύουσιν.

Quæcunq; mulieres gravidæ à fe-
bris capiuntur, & vehementer sine causa
manifesta extenuantur, difficulter pa-
riunt, & cum periculo, aut abortientes
periclitantur. § §. §.

Mulier grávida febre aliqua laborans ex
vitiosis humoribus antequàm conciperet acer-
uati orta, si plus quàm ratio postulat exte-
nuetur affligatur ve diutius, non audentibus
medicis aliquod auxilium grávida exhibere,
neq; exactam victus rationem imperare, ne
fœtui necessarium alimentum auferatur, non
est mirum si periclitetur ipsa, aut difficulter
pariat, aut etiam abortiat: fœtus enim cum
aliquando nequit obsistere malo, ex febre &
vitio humorũ corrumpitur: nonnũquàm verò
perdurat quidẽ usq; ad tempus partus, sed
cum & ipse valetudinarius sit (ut qui longo
tempore laborauerit) & matrem habeat im-
becilem, non sine periculo paritur. Nam ad
bonum partum, duorum corporum vigore est
opus, & grávida mulieris & infantis.

XXIX.

Ἐπὶ ῥέῳ γυναικείῳ σπασμὸς ἐ λήποθυμῆ
ἢ ἐπιγίγνηται, κινδύν.

In fluxu muliebri si cōuulsio & animi defectus aduenerit, malum. § 6. 5.

Animi defectio commune quidem est omnium immodicæ euacuationis symptoma, conuulsio verò, etsi non cōmunis existat, ad plurimas tamen consequitur euacuationes, & præcipuè si pars quæ patitur nervosa fuerit. Porro utrūq; à purgatione muliebri malum est, nam animi defectio summam virium imbecillitatem ostendit; Conuulsio verò ex siccitate aut inanitione magna ex parte lethalis est.

XXX.

Γυναίκεϊ ἐν γαστρὶ ἐχθρὸν τενεσμός ἐστιν ἀπορροή, κατὰ τὴν φύσιν.

Mulierī utero gerenti si tenesmus superucnerit, facit abortum. 27. 7.

Tenesmus nomen accepit ab ea passione ob quam cum cacare vehementer appetant, continuè exurgunt. Ob talem igitur molestiam totum aliud corpus laborat, & præcipuè matrix, quæ cognata est recto intestino in hoc affectu maximè dolenti. Nihil autem mirum si propter vehementes atq; frequentes exurrectiones, cœceptus abortitur, quando & ex alijs omnibus fortibus motibus atq; doloribus, mulieres grævida solent abortire.

XXXI.

XXXI.

Καταμύωται γυναικῶν παλαιοῦν ἡσσι θυμ-
 βάσαι, καὶ μὴ γυναικῶν ἀπὸ τῆς ὑστερὸς θυμ-
 βάσεως ἡσσι.

Menstruis largius fluentibus morbi
 eueniunt, non fluentibus autem ex utero
 morbi contingunt. § 7. §.

Conuenit quidem inter medicos, ex immo-
 dico fluxu sanguinis menstrui generari sub-
 indè morbos, ut refrigerato totius corporis
 habitu, cachexiam, hydropem, scdum colorem,
 tumorem pedum, ac virium omnium imbe-
 cillitatem. Verum Hippocrates hoc loco dicit
 etiam fieri morbos ex eiusdem fluxus mens-
 trui retentione: menses enim supprimi contingit,
 vel quia vena, ferentes ad uterum menstrua
 purgationem, comprimuntur, vel obstruuntur
 propter crassitiem sanguinis & lentorem, vel
 ob robur vasorum uteri, adeo ut quod influit
 non admittant. Quodcumq; autem horum fue-
 rit, necesse est processu temporis ipsum ute-
 rum pati aut similem inflammationi dispo-
 sitionem, aut erysipelati, aut scyrrho, aut can-
 cro. Quibus denud totum corpus compatitur,
 ut vel decoloratio, vel artuum grauitas, vel
 febres errabunda, vel alius aliquis subsequa-
 tur affectus, pro natura excrementorum in
 corpore accruatorum.

XXXII.

Τυτὴ ἢ μὴ λαμβάνῃ ἐν γαστρὶ. βέλη δ' εἶδ-
ναι εἰ λήψεται, περιχαλύψας ἰμωτίοισι θυμὸν
κρίτω. κὴν μὲν πορεύεσθαι σοι δοκίμῃ ἢ ὁσμῇ
διὰ τῶν στόματος εἰς τὰς ρίνας & εἰς τὸ στόμα, γί-
νωσκει ὅτι αὐτὴ καὶ οἱ ἐαυτὴν ἀγνός ἐστιν.

Si mulier non concipit, scire autem
vis an conceptura sit, pannis circumte-
ctam infernè suffias, & si odor videatur
per corpus ire ad nares & os, scito, quòd
ipsa non ex seipsa sterilis est. 59. §.

Suffitum aromatum collo uteri per infun-
dibulum immissum si non permeet ad nares,
scito corpus uteri frigidum esse nimis, & den-
sum, ac ideo ad concipiendum ineptum.

XXXIII.

Ἡ γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχρύση καὶ καθαίρειται
πορεύονται, ἀδύνατον τὸ ἐμβρυον ὑμᾶναι.

Si mulieri utero gerenti purgationes
procedant, impossibile est foetum esse
sanum. 60. §.

Fœtus nec alimentum trahit, nec probè
nutritur, si copiosè fluant purgationes sin-
gulis mensibus: Siquidem ex menstruo san-
guine fœtus alitur.

XXIIII.

Ἡ γυναικὶ καὶ θάρσους μὴ παραδῶν, μήτε
φρίκης, μήτε πυρετὸς ἐπιγενόμενος, ἅσπερ δὲ αὐ-
τῇ παρὰ πλῆσιν, λογίζεσθαι ταύτην εἰ γαστρί-
ῃ ἐστιν.

Si purgationes mulieri cessent, neque
febre neque rigore superueniente, &
fastidia cibi incidant, iudica ipsam in
utero habere. 61. 5.

Supprimuntur gravidis menses à natura,
ut sint alimentum fœtui. Suppressi ergo sine
causa manifesta significant impregnationem,
quod plurimæ mulieres ipsa experientia duce
didicerunt: Cum enim fastidium cibi patiun-
tur, menses suis suppressi, tunc se concepisse
conyiciunt. Fit autem fastidium cibi eadem
qua pica ratione, laeso ore ventriculi in gravi-
dis. Contingit et nonnullis aliquid tale pro-
pter humores vitiosos totum corpus occupa-
ntes, verum hoc cum horrore et febre patien-
tur, atq; his signis distinguuntur morbose à
gravidis.

XXV.

Ρίμα ἄρχεται γυναιξὶ μὲν ἐξ ὀφθῶος μάλ-
λον, καὶ ἀπὸ γάστρως κεφαλῇ. ἀνδράσι δὲ μάλ-
λον ὀπίσθιν ἢ ἑμπροσθιν ὅτι σῶμα ἔχει, οἷον ἀπὸ

τε πυχίων καὶ μηρῶν. ἅπαρ ἔ φ' ὀξέμεν ἀραιόν.
 δηλοὶ δὲ τοῦτ' ἡ θρίξ.

Refrigerationes incipiunt mulieribus quidem à lumbis magis, & per dorsum ad caput percurrunt, sed & viris in parte posteriore potius quàm anteriore corporis, veluti cubitis & femoribus: Sed & cutis rara: indicio autem est pilus. 69. §.

Partes posteriores non in feminis tantùm, sed & in viris paratiores sunt recipere frigiditatem, quæ celerrimè facta per spinalem medullam, compassione recurrit ad caput, principium nervorum. Partes autem anteriores non ita frigori sunt obnoxie, quoniam calidiorem habent temperaturam: Cuius rei argumentum sumit ex cutis raritate, huius verò ipsius rursus ex pilorum multitudine.

XXXVI.

Γυνὴ ἀριστερὴ. © οὐ γίνεται.

Mulier ambidextera non fit. 43. 7.

Homines qui ambabus manibus pro dextris utuntur sapientius visi sunt, mulier verò nulla ad hunc usq; diem, ob naturæ imbecillitatem: Satius enim habet si sola dextra modicè utatur.

XXVII.

Οὐκ ὅσον ψυχρὰς καὶ πυκνὰς τὰς μήτρας ἔχου-
σι ἐκφυσκῶσι, καὶ οὐκ ὅσον κενεὰς ἔχουσι τὰς
μήτρας, ἐκφυσκῶσι ἀποσβεῖν, γὰρ αὐταῖς ὁ
γόνος. Ἐκ ὅσον ξηρὰς μάλλον καὶ εὐεργετῆς ἐν
δύει γὰρ τῇ τροφῇ φέρειται τὸ ἀπὸ τρυφῆς οὐκ ὅσον ὅ
ἐξ ἀμφιτέρων πλεονέχουσιν ἔχουσι σίμμετρον,
αἱ τριαὶται ἐπίτεκνοι γίνονται.

Mulieres quæ frigidos & densos habent uteros, non concipiunt, quæ etiam præhumidos habent, haud concipiunt (extinguitur enim in eis geitura) : & quæ siccios & immodicè calidos habent, inopia enim alimentum corrumpitur genitalis semen. Quæ verò in utrisque oppositionibus mediocriter temperatum habent uterum, hæc fecundæ sunt. 62. 5.

Mulieris uterus rectè conferetur cum terra, qua nisi temperata in qualitatibus primis, secunda non est: Siquidem in ea quæ supra modum frigida est, semen refrigeratum extinguitur: in humida, quasi in palustri & cædoso loco, superfluo humore delibutum summergeitur, nec habet cui radicibus innisum hæreat: in sicca, sabulosa, argillacea, aut petrosa, semen alimenti defectu arescit: In ea verò quæ immodicè calida est, torretur. Quo fit ut uterò bene

benè temperati in iisdem qualitatibus sint ad conceptionem idonei, malè autem temperati, si parum à bonitate recedunt, difficulter concipiunt: Si verò nimium, mulieres steriles fiunt. Omnium autem uteri intemperaturarum quas sequitur sterilitas, indicia sumentur à vapore & suffitu aromaticum, de quo superius dictum est.

Que viri dispositio inepta ad generandum.

1.

Παραπλησίως ὅ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρρένων. ἢ γὰρ οἱ δρᾶσιότητες τῆς σῆμας τὸ πνεῦμα ἔξω φέρεται, πρὸς τὸ μὴ παραπλήμην τὸ σπέρμα, ἢ ἀπὸ τῆς πυκνότητος τὸ ὕγρον ἢ διαχωρίζεται ἔξω, ἢ ἀπὸ τῆς ψυχρότητος σὺν ἐκπυρίμαται, ὥστε ἀθροίζονται πρὸς τὸ ῥέον τοῦτον, ἢ ἀπὸ τῆς διρρημοσύνης τὸ αὐτὸ τὸ πῦρ γίνεται.

Similiter autem & in maribus evenit: aut enim propter corporis raritatem spiritus extra fertur, ut semen transmitti non possit, aut ob densitatem humor non excernitur, aut propter frigiditatem non exalescit, ut eo in loco coaceruari possit, aut propter calorem hoc idem evenit. 63. 5.

Hic Aphorismus non censetur Hippocrati, quod omni ferè ex parte sit falsus. poterat autem sic verius efferi: Similiter & in viri, vel caliditas, vel frigiditas, vel humiditas, vel siccitas immodica causa est sterilitatis. Nam ob exceedentem calorem semen fit tosto simile: Ob frigiditatem non bene concoquitur, atq; ideo si mediocris sit intemperatura in ipso, indiget vtero calido multum: si verò immodica sit, sterile est: Ob siccitatem verò quod ubi primum exiit, extendi non potest, quod maximè sit necessarium si mulier debet concipere. Ob humiditatem rursus non concoquitur, ac ideo si modica sit intemperatura, vtero calidiori indiget & sicciori, si verò immodica, sterile est: Immodica ergo intemperatura sterilitatis sunt causa, modica verò si sint, & contrarijs coniungantur, tunc concipient mulieres: Si verò similibus, non concipient. Neq; enim fieri potest ut frigidum semen in vtero frigidioris sit fertile, neq; siccum in sicciore, & aliorum utrumq; eodem modo: sed indiget semen quidem frigidius vtero tantò calidioris, quanto deficit ab optima temperatura: & humidius, sicciore: & in alijs eodem modo.

Ab Orisasio inseritur & hic
Aphorismus.

Viri semen aquæ iniectum si supernat,

naturat, aquosum & nimis tenue est, nec ex eo concipit mulier.

Qui dubitat virine an mulieris culpa contingat sterilitas, mittat semē viri in aquā, & si supernatauerit, aquosum esse & tenue sciat, nec aptum excitanda preli. Non enim concipit ex semine mulier, nisi fuerit mediocriter spissum & crassum. Arist. cap. 12. lib. 3. de historia animalium.



HIPPOCRATIS

APHORISMORVM

PARS QVART-

TA,

In qua referuntur ij qui ætati conveniunt & habitui corporis. Tota scetè hæc pars ad Symptoticen attinet & Aetiologiam.



Ορεοι τῶν τῶ ἀνθ. καὶ τῶ χυ-
δῶν. καὶ τῶ χυδῶν, καὶ τῶ χυδῶν.

Dandum aliquod consue-
tadini, tempori, regioni, &
ætati. 17. 1.

Non solum in sano, verum etiam in ægrot,

siue ratio victus instituenda, siue pharmaco medicandum, consuetudo imprimis attendenda est. Non enim temerè dictum est à veteribus, consuetudinem esse adquisitivam aut alteram naturam. Quare cum aliquid innovare suadebit usus, id nisi paulatim non est faciendum, et matura cum deliberatione, ne si mutatione subita consuetudinem evertamus, ipsa natura vim intulisse videamur. Similiter et temporis occasio, et regio, et ætas, et vires tam magnum habent in omni opere medico momentum, ut indicationes, quæ ab his rebus summi debent, negligentiam gravissimum impendat offensionis periculum. Hi omnibus medicus à non medico differt, quæ nulli nisi excellentes artifices observare didicerunt.

I I.

Εν τῇσι νόσοισιν ἥσπερ κινδυνώδουςιν οἷσιν
 ἐν οἰκείῃ τῇ φύσει, καὶ τῇς ἡλικίᾳς, καὶ τῇ ἔξει,
 καὶ τῇ ἡμέρᾳ ἢ νύκτι ἢ μάλιστα, ἢ οἷσιν αὖ μὴ οἰκείᾳ
 καὶ τῇ περὶ τὴν...

In morbis minus periclitantur quo-
 rum natura, habitui, aut ætati, aut tem-
 pori, magis cognatus est morbus, quàm
 quibus nulli horum cognatus est. 34.2.

Omnis morbus calidus, frigidus, humidus,
 siccus, ægri temperatura communi, aut ætati,

aut habitui, aut tempori, ideo minus habet periculi quia cum minus recedit à statu naturali, ad eum faciliorem regressum fieri permittit. Vt pernicioſa mala sunt qua sunt dissimilia, ob idq; maiori de causa prouenerunt, ita minus malum putandum est quod accommodatum naturæ facile irrepserit: curatur enim facilius quod ex causa prodit leuiore. Quibus efficitur. vt duarum febrinum ardentium magnitudine parium, ea qua iuueni contigerit Aestate, sit multò minus periculosa, quòd aetati congruat & tempori: Qua rerò seni & Hyeme, calidissima frigidissimo, & per tempus frigidissimum acciderit, hac vt sit maximè pernicioſa necesse est, quòd scilicet excitari non potuerit nisi à maxima & vehementissima causa.

III.

Οἱ πρεσβύτεροι ἢ ἡλικίᾳ τὰ μὲν πολλὰ νοσήσουσιν ἡσυχῶν. ὅσα δ' αὖν αὐτίκῃσι ζεῖν καὶ νοσήματα γίνονται, τὰ πολλὰ ξυμπιπθῆναι.

Senes magna ex parte minus quàm iuuenes ægrotant: diuturnis verò morbis correpti commoriuntur. 39. 1.

Senes quia diligentes sanitatis suæ custodes prudentius viuunt quàm iuuenes, qui sunt intemperantes, magna ex parte minus

agrotant. Sed id acceptum referre debent optime victus rationi, non dispositioni senili, quæ natura ita morboſa eſt ut Poëtæ Comico ſit ſenectus ipſa morbus, & permulti ſenectutem morbum naturalem, alij morbum inſanabilem eſſe non immeritò dixerint. Quòd verò multi morbis diuturnis commoriantur, quales ſunt raucedines & grauedines, alijq; huiusmodi morbi frigidi, clarum eſt, ſiquidem & calor eſt paucus & facultas imbecillis, ita ut morbos frigidos concoquere non poſſit. In hos autem facilius incidunt ſenes, quoniam omnes congruentibus naturæ ſuæ morbis facilius corripuntur: & minus in hiſ periclitarentur per ſententiam præcedentis Aphoriſmi: ac re vera minus periclitantur, quàm in calidioribus morbis. Sed cùm non poſſint illos concoquere propter caloris inopiam & virium imbecillitatem, diutius agrotant.

I I I I.

Οἱ παχὺς σφύρα & φέου, ταχὺτέρως
 τοι γίνονται μᾶλλον τὰ ἰσχυρὰ.

Qui natura admodum obefi ſunt, celerius moriuntur quàm qui graciles. 44. 2.

Eſt habitudo corporis à prima conforma-
 tione mediocris, duæ ſunt extrema, obeforum

Et extenuatorum : Sed excessus ad crassitatem peior est eo qui est ad gracilitatem , nam graciles habent venas latiores, & in his plus sanguinis , ac ideo plus caloris & spiritus, & ita sunt viuaciores : hoc tamen habent incommodi, quòd adipis munimento destituti à causis exterioribus , vento, aqua, frigore, & similibus promptius offendantur. Obesibus autem quia paucus est sanguis & spiritus, citò ipsis vel parua ob causam calor natiuus extinguatur.

V.

Μεγέλις δὲ σώματος ἐν νεότητι μὲν, ἰσχυρότερον, καὶ σὺν αἰσθήσει. ἰσχυρότερον δὲ δύνασθαι καὶ χεῖρον τῶν ἰλαστομένων.

Magnitudo corporis iuuentutis quidem neq; indecens neq; illiberalis, senectutis verò inutilis & deterior paruitate. § 4. 2.

Proceritas corporis ut sit in iuuentute pulchra, tamen in senectute est inutilis , ut quæ gibbositatis occasionem præbeat : nam isto velut onere pressi senes, incuruuntur ac gibbi fiunt.

VI.

Ἐν δὲ ταῖς ἡλικίαις τριάδε συμβαίνει, τῶν μὲν σωματοῖσι καὶ νοητοῖσι παιδίοις, ἄφρων, ἡμερι, βῆξις, ἀγρυπνίαι, φόβοι, ὀμφαλὸφλαγμοὶ, ὥτεν ὑγρότητις.

Per ætates hæc accidunt , paruis quidem

dem & recens natis puerulis, oris ulcera, vomitiones, tusses, vigiliæ, pauores, umbilici inflammationes, aurium humiditates. 24. 3.

Qui morbi sunt in aetatibus hinc deinceps ordine reconfet. Parnis, inquit, & nuper natis, oris ulcera contingunt ob instrumentorum molliem, quæ à sero lactis, alligenda vim habente, offunduntur. Vomitus, ob lactis abundantiam, Tusses autem facile propter cerebri humiditatem ad pulmonem asperamq; arteriam defluentem accidunt. Vigiliæ vero haudquaquam ipsis sunt assuetæ, ut qui maiori parte temporis dormiunt, nisi forte ob ipsum morbum fieri infantibus vigiliæ opineur, siquidem somni abundantia ipsis maxime secundum naturam inest. Pauores etiam per somnum infantibus adsunt, ob alimenti in ventriculo corruptionem, unde midor elatus terribilia somnia excitat. Accedit quod nuper ex utero prodeuntes pueruli aërem eos ambientis transmutationem reformidantes, ad quemvis occursum facile perterrentur, præsertim à somno. Umbilici autem paulo ante præcisus, inflammationes contingunt non alia ratione quam alijs partibus abscissis. Aurium quoque humiditates morbis annumerat, siquidem à natura aliena est expurgatio per aures, quæ

tamen querulū euenit ob corporis totius atq;
adeo capitis superfluum humiditatem.

VII.

Πρὸς τὸ ὀδονοφυεῖν, πρὸς αἵματι, οὖλον
ὀδονοφυεῖ, πυριτὶ, σπασμῷ, ἀλφύροισι, καὶ
μέλυσσιν ὅταν ἀνάσῃ τὸς κυνέδοντας, καὶ τοῖσι
παχυτάτοις τῶν παιδῶν, καὶ τοῖσι σκληροῖς
τὸς κοιλίας ἔχουσιν.

His qui ad dentitionis tēpus accedūt,
gingivarum pruritus fiunt, febres, con-
uulsiones, alui profluvia, maximè cūm
caninos edunt, & iis pueris qui crassissi-
mi sunt, & aluos duras habent. 25. 3.

Pueris cūm dentire incipiunt, ginginae cum
dolore pruriunt, quòd dētes prodeant & tan-
quam stimuli perforatim gingivis insigantur.
febres accidunt propter dolores, vigilias, &
inflammationes. Cōuulsiones autem cūm pro-
pter hæc, tum propter crudum alimentum &
quia nervosa partes nondū satis valide sunt.
Ad hæc omnia etiam ex necessitate ventri
profluvia consequuntur, quoniam alimentum
non benè coquitur neq; distribuitur: & ma-
ximè cūm caninos edunt dentes, qui quoniam
tardius exeunt, maiorem ob id inferunt dolo-
rem quòd ginginae factæ sint sicciore & durio-
res, alioqui minus laderent, quia cūm sint acu-
tiores, minorem faciunt solutionem continuam.

Qua

Qua etiam ratione incisores exeunt facilius & minore cum dolore, licet sint latiores, propterea quod cutis adhuc mollis est et obediens cum erumpunt: Sed maximè dolent gingivæ subnascentibus molaribus. Pueris autem, praesertim qui crassissimi sunt, & alios duras habent, saepius accidunt superiores morbi, & potissimum convulsiones ob plenitudinem & superfuitatum abundantiam.

VIII.

Περὶ οὐτέρουσι ἢ γινώσκουσι παθήματα, σφοδρὰ ἔχει τὸ ἐνίοτε εἶναι ὄντας, ἄσθματα, λιθιάσεις, ἔλμους, σπογγύλαι, ἀσκαρίδες, ἀποχρεδόνες, σπυριανοί, σφυγμιαί, χιρσίδες, καὶ τὰ ἄλλα φύματα, μάλιστα ἢ τὰ ἀσθενήματα.

Vbi ætate paulum processerint, tonsillæ, vertebræ (quæ in occipitio est) ad interiora luxationes, asthmata, calculi, lubrici rotundi, ascarides, verrucæ peniles, satyriasmus, strumæ, & alia tubercula, præcipue verò antedicta. 26. 3.

Pueris paulo adultioribus fiunt tonsillæ tonsillæ verò seu paratubercula sunt inflammationes partis quæ os & gulam interiacer: Vertebra eius luxatio quæ ad occipitium est, parit anginam. Asthma, seu creber anhelitus, fit pro-

pier angustiam aspera arteria, oppletu respira-
 tionis instrumentis ab his quæ desuper fiunt
 fluxionibus. Causa efficiens calculi est caliditas,
causa materialis est multa pituita cum viarum
angustia: in pueris utraq; est causa, qui ob
 edacitatem non paucos crudos humores coacer-
 nant, ex quibus pars crassior una cum urina
 ad vesicam perueniens, generandi lapidis fit
 materia, quæ retenta diu propter crassitiem,
 à caliditate tandem durescit in formatum la-
 pidem. Lumbrici teretes longi sunt, lati verò
 cucurbitini ut semen cucurbitæ, quos tamen
 Galenus dicit longissimos hac sensu, id est, lon-
 ga serie & congerie sese complexos. Ascarides
 tenues ac breues similes vermibus. Omnium
 autem lumbricorum origo est ex cruda, crassa,
 pituitosaq; materia & putredini accommoda,
 qualis in pueris & voracibus colligitur ma-
 ximè. Verruca & strumæ sunt soboles vitiosi
 sanguinis ad exteriora & cutem repenti, nam
 putres in corpore humores cum foras pelluntur
 robusta existente potentia, verrucas excitant
 pensiles, aut myrmecias latentes, salsuras,
 strumæ, scrophulas, & alia phymata à ma-
 teria frigida & pituitosa.

Grandioribus autem & ad pubertatem accedentibus, præcedentium ætatū multi accidunt morbi, & febres magis diuturnæ, & sanguinis è naribus profusio. 27. 3.

Pubescentes superioribus etiam morbis obnoxij propter similitudinem temperatura, sæpius incidunt in febres diuturnas, nam in hac ætate plus est materiae unde febres procreari possunt, & quia sanguis incipit superabundare in corpore duriusculo, ex quo per cutim paucum quiddam dissipatur, & minus quàm priore ætate in augmentum absumitur, profluvia sanguinis è naribus patiuntur.

Τὰ δ' ἀλλήλα φῶσι παθόντες πένθη κρύν-
ται· τὰ μὲν ἐν παρὰκοίταις ἡμέρησι, τὰ δ' ἐν
ἐπιτάφιοις, τὰ δὲ ἐν ἐπιτάφιοις, τὰ δὲ αὖτε
ἐν τῷ ἔδω προσέχουσιν· ὅσοι δ' αὖ διαμείνη φῶσι
παθόντες καὶ μετὰ δόξαν περὶ τοῦ ἑκάστου, ἢ τῇ-
σι θάλασσι αὖτε τὰς τῶν κατεμεινόντων ῥήξεις,
ἐχρήσθησαν.

Plurimi verò morbi puerulis iudican-
tur, hi quidem in quadraginta diebus, illi
verò in septem mensibus, aliqui in septē
annis, nonnulli quum ad pubertatem ac-
cedunt. Quicunque autem puerulis per-

durarint, nec prope pubertatē deflerint, aut foeminis quum menstrua eruperint, hi consenescere consueverunt. 28. 3.

Plurimi morbi diuturni ūs qui in tribus aetatibus praedictis constituti sunt iudicantur & terminantur (perfecta enim indicatio est quae morbum soluerit.) nōnulli quidem in 40. diebus, quadragesimus enim dies primus est indicatorius morborum diuturnorum, & ultimus acutorum ex decidentia. Nonnulli in septem mensibus, ut asthmata, quartana febres: qui verò hunc transcendunt numerum, secundum septenarij quidem rationem habent iudicium, verum non diebus tantum enumerati, sed mensibus primùm, deinde annis iudicantur, ut manifestum sit alios ad septimum annum, alios autem ad decimum etiam quartum annum peruenire, cuiusmodi est morbus comitialis, qui multis in pubertate indicatur, quo tempore magnae sunt corporis mutationes, in foeminis maximè propter menstruorum eruptionem. Quare si qui morbi hac quidem aetate finiuntur, vsq; ad longum tempus perdurare consueverunt.

II.

Τοῖσι δὲ νενίσκοισιν αἰμωγὰς πλῆσις, φθίσις, πυρετὶ δέξις, ἐπιληψία, ἔτι ἄλλα ἰσχυρὰ, μάλιστα δὲ τὰ σπασμωδικά.

Iuueni

Iuuenibus autem sanguinis spuitiones, tabes, febres acutæ, morbi comitiales & alij morbi, & præcipuè antè dicti, accidunt. 29. 3.

Ex alijs ætatibus de quibus meminit, licet conijcere de adoleſcētia, quæ in multis quidem communicat cum illis quæ ex utraque ipsam circumſtant: quapropter eam hîc prætermiſit, iuvenes autem non ſecundum naturam ætatis patiuntur ſputum ſanguinis, ſed ob incontinentiam. Ad ſputum verò ſanguinis tabes conſequitur. Corripiuntur & febribus bilioſis, quia flaua bilis hac ipſa ſuperabundat ætate. Comitialis morbus non eſt huic ætati familiaris, quæ calida eſt, morbus autem frigidus humidus, niſi dicatur accidere ob viſtus errorem.

XII.

Τοῖσι δὲ ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν ταύτην ἄσθματα, πλὴν δὲ ῥίπιδες, περιπνεύμονια, λήθαργος, φρενίτιδες, καῦσος, ἀφύρροια, χροῖα, χολέρα, δυσουτερία, λήντηρία, αἰμορροΐδες.

Qui hanc ætatem exceſſerint, his aſthmata, pleuritides, pulmonis inflàmationes, lethargi, phrenitides, ardentes febres, diuturna alui profluuia, cholera, difficultates inteſtinorũ, leuitatesq; eorundem, & hæmorrhoides accidunt. 30. p.

Lethargi, hamorrhoides, leuitates intesti-
norum à pituita, vt alij morbi frigidi & me-
lancholici, proprij quidem sunt etatis decli-
nantis. Cateri verò aut ab immoderata victus
ratione proueniunt, aut magis à iuuentute
differuntur ad etatem declinantem; nam, vt
dicitur à Tullio, intemperanter acta iuuentus
effæctum corpus reddat senectuti.

XIII.

Τοῖσι δὲ πρὸς τὴν ὄψιν, δύσπνοια, κατάρτοι
βραχάδεις, σφύζουσαι, δυσουρία, ἀσθμα-
πνοίαι, κρεῖνδες, ἰλιγοί, ἀποπληξίαι, κα-
ρδίαι, ἐν στήθεσσι δόρυ, ἀγρυπνίαι, κα-
λὴς καὶ ὀφθαλμοῖν, καὶ ῥιναῖν ὑγρότητες, ἀμ-
βλυωπία, γλαυκώσις, βαρυκηρία.

Senibus accidunt spirandi difficulta-
tes, destillationes tussim afferentes, stil-
licidia vrinæ, difficultates vrinæ, articu-
lorum dolores, renum mala, vertigines,
apoplexiæ, mali habitus, pruritus vni-
uersi corporis, vigilix, ventris, oculorū,
& narium humiditates, hebetudines ocu-
lorum, glaucedines, & graues audi-
tus. 31. 3.

Senibus spirandi difficultates accidunt pro-
pter humoris pituitosi in thoracem defluxum.
Destillationes tussim afferentes, quoniam par-
tes ad caput attinentes in ipsis facillimè refri-
gerant.

gerantur: & cum frigidam cerebri temperaturam habeant, ideo multa colliguntur pituitosa superfluitates, quæ renes & meatus urinarios obstruentes aliquando difficultatem urinae, aliquando frigidam inducentes intemperiem, quam facultatis imbecillitas consequitur, stillicidium urinae generant. Articulorum autem dolores fiunt, fluentibus ad hæc loca superfluitatibus: vertigines propter spiritum vaporosum qui in partibus cerebri inordinato citetur motu: Apoplexie, nullus est morbus adedò senili ætati familiaris, quoniam in ea cerebrum pituitosis repletur superfluitatibus, quæ ventriculos eius opplentes faciliè morbum hunc inducunt. Mali habitus, nam alimentum non concoquitur, & quod distribuitur impurum est, unde etià pruritui à superfluitatibus quæ difficilem habent per cutem euacuationem. Vigilie, quia senectus plena curarum est, & senibus non planè morbofis siccum est natura corpus. Humiditates autem in ipsis ocularum & narium liques fieri propter cerebri superfluitates, quibus ad alium defluentibus ipsæ etiam sapius humectantur. Hebetes autè visus & auditus graves accidunt ob imbecillitatem potentie sensitivæ. Glaucedines verò, propter immodicam instrumentorum siccitatem, & quia speciem habent suffusionis à concretionis crystallini humoris in oculis.

Qui

Qui temporibus & causis morborum ex diuersis aëris dispositionibus contingentiam accommodantur. Ad Prognostica referuntur.

I.

Νοσήματα δὲ πάντα, ἐν πάσῃσι τῇσι ἡμέραις γίνονται, μᾶλλον δ' ἐν αἷσι καὶ ἐν ἰσχυροῖς αὐτῶν καὶ ἡνίκαν ἐπαροξύνονται.

Morbi quidem omnis generis in omnibus temporibus fiunt, nonnulli tamen in quibusdam illorum magis & oriuntur & irritantur. 19. 3.

Licet omnibus temporibus omnes morbi fieri possint ob errata quæ in viuendi ratione contingunt, aut ob ambientis variam temperaturam, cuius attractione viuimus: Quibusdam tamen temporibus quosdam morbos fieri magis accedit, propter affinitatem quam cum illis temporibus habent. Non parum autem ad hoc confert etiam naturarum differentia, neque enim similiter ab eadem causa calidum corpus & frigidum, humidum & siccum offendi aptum est. Nam quamuis aër pestilens agat in omnes absque discrimine, non omnes tamen prehenduntur peste, quia agens non agit nisi in passum

sum dispositum. Aër quidem habet magnum momentum ad generationem morborum, sed concurrunt alia multa, ut visus ratio, natura, dispositio, consuetudo, &c.

II.

Τὸ μὲν γὰρ ἕως τοῦ μενικῆς καὶ τὰ μελαγχολικὰ, καὶ τὰ ἐπιληπτικὰ, καὶ αἵματος ῥύσις, καὶ κυνῶν ἔλαιον, καὶ κόρυζαι, καὶ βράγχι, καὶ βῆχας, καὶ λίπρωι, καὶ λήχῃσι, καὶ ἀλφει, καὶ ἐξαρθήσις ἰλακάσις παλίσται, καὶ φύματα, καὶ ἀρεθρίπαι.

Vere quidem furores, melancholix, morbi comitiales, sanguinis profusiones, angina, grauedines, raucedines, lepræ, tusses, impetigines, vitiligines, pustulæ ulcerosæ plurimæ, tubercula & articulorum dolores accidunt. 20. 3.

Tempora constantia dicuntur cùm suam propriam seruant temperaturam: hincq; annus constans, cùm tempora in quæ distributus est à sua propria temperatura non discedunt, & sunt quatuor: Ver humidum & calidum dicitur, aut potius temperatum & saluberri-
mum, ac morbi qui mortem afferant minimè obnoxium, in quo tamen morbi plurimi sunt, non ob eius temperaturam, quæ bona est, sed eò quòd verno tēpore corpora rara & laxa sūt, humoresq; vitiosi, qui in profundo corporis la-
tebant,

lienes magni, aquæ inter cutem, tabes,
vrinæ stillicidia, leuitates & difficultates
intestinatorum, coxæ dolores, anginæ,
asthmata, ilei, morbi comitiales, furores
& melancholia. 22. 3.

V.

Τὸ δὲ χμαῖνος, πλῆθὺς ἰσθμῶν, ἀειπνομένηται,
ἀλθαεργί, κόρυζαι, βρογχίτι, βήχες, πόνοι ση-
δεῶν καὶ πλῆθὺς καὶ ὁσφύος, καὶ κεφαλαι-
αί, ἰλιγγοί, δάκτυλοι.

Hyeme, pleuritides, pulmonis inflam-
mationes, lethargi, grauedines, rauedi-
nes, tussies, dolores pectoris, laterum,
lumborum, & capitis vertigines, & apo-
plexia. 23. 3.

Aestas autē, Autumnus & Hyems, ut Ver,
licet in multis communionem habeant, uni-
cuique tamen illorum temporum propriū morbi-
magis excitantur, qui nimirum sunt illis tem-
peratura proximi.

VI.

Αἱ μεταβολαὶ τῶν ὥρων μέγιστε γίνεται
τοσέματα, καὶ ἐν τῇσιν ἀρῇσιν αἱ μεγάλας με-
ταβολαὶ ἢ ψύξις, ἢ θάψις, καὶ τ' ἄλλα κα-
τὰ λόγον οὕτως.

Mutationes temporum maximè pa-
riunt.

riūt morbos, & in ipsis temporibus magnæ mutationes aut frigoris aut æstus, & alia pro ratione, eodem modo. 1. 3.

In anni temporibus magnæ mutationes aëris, id est, multæ alterationes temperamentorum alia post aliam frigoris vel caloris, humiditatis vel siccitatis, ventorum vel horum defectus, causæ sunt effectrices morborum nature sue familiarium, in ijs præsertim corporibus quæ sunt ad patiendum idonea. Aër dici potest res naturalis, ubi concurrat ad compositionem hominis: Non naturalis, quia si- niſtrè adhibitus corpus humanum alteret atq; adeo sanitatem destruat. Præter naturam est aër, ubi à sua temperatura multum immutatus, corpus nostrum lædit atque corrumpit. Nam quum aëre ne momento quidem carere possimus, sit ut in nos continenter afficiat, ac in suam qualitatem alteret, & si corruptus est, in similem trahat corruptionem, propriumq; in vitium transmutet. Hinc de causis mutationes quedam sunt aëris naturales, quæ fiunt temporibus propriam servantibus naturam, ut mutatio ad calidum & siccum in Aestate, ad frigidum & humidum in Hyeme, &c. Quedam sunt mutationes non naturales, quæ sunt aëris à natura sua non multum recedentis: non naturales enim dicuntur quia possunt
vtili

πλοῖ ἢ, βῆχες, φάρυγγες, κελιάι, σκληραί, δυσουρίαι, φρικώδεις, ὀδυνοὶ πηδύρων, σηΐων. ὁπόταν ἔρς διωασθῇ, τὰ αὐτὰ ἐν τῇσιν ἀρρώσῃσι πρὸς δέχιδαι χρεῖ.

Austri auditum hebetant, caliginem obducunt, capitis gravitatem efficiunt, pigros reddunt & languidos, ubi ita prævaluerit tempestas, huiuscemodi in morbis patiuntur: Sin aquilonia fuerit constitutio, tussis, faucium asperitates, alvi duræ, difficultates urinæ, horrores, laterum & pectoris dolores fiunt. Quando hæc tempestas prævaluerit, talia in morbis expectare oportet. §. 3.

Vix potest quicquàm de ventis absolute pronuntiari, propterea quòd diversas vires accipiant à locis per quæ flant: ob id Austri sunt lethales magis & minus pro natura locorum. Cùm continenter inspiretur aër, necesse est ut tales reddantur spiritus, qualis est aër qui sensus omnes & actiones spiritus animalis, visum, auditum, odoratum, gustum, & denique motum tardas pigrasq; efficit, si crassus, turbulentus, & caliginosus est: Et cùm sit aër medium quo videmus, audimus, olfacimus, non mirum si crassus & turbulentus, crassas imaginationes & falsas offerat sensibus. Aquilo verò ventus Austro contrarius, nempe frigidus

dui siccu, tusses inducit, & faucium asperi-
tates, quòd tum frigidus inspiretur aër qui
asperam arteriam aliaq; instrumenta inspi-
rationi seruiencia ledit, fauces desiccant &
exasperat: & quia temporu huius constitutio
tota vergit ad siccitatem, alui constringuntur,
toto corpore exsiccato, tum præcipuè quia ad
seipsum trahit humidiores partes alimentu, tum
etiam quoniam feces in corpore diutius re-
manent nec excernuntur, eæ omnino exugun-
tur & arescunt. Urinæ etiam accidunt diffi-
cultates, vesica frigiditate Aquilonis offensa.
Eadem Aquilonis frigiditas horrores efficit,
laterum & pectoris dolores, quando hæc tem-
pestas prævaluerit, id est, cùm Aquilo vehe-
mentior & crebrior alijs ventu fuerit.

I X.

Ὁξέταν δὲ τῆς ζέφου ἡπὶ ὀρεῖαν, ἰδὲ πᾶτας
ἐκ τῶν πυρρῶν ποταμῶν ἀποδιδέχεται καὶ ἡ.

Quando Aestas fit Veri similis, su-
dores in febribus copiosos expectare
oportet. 6. 3.

Aestas egressa temperaturam suam quæ
est calida & sicca, si naturam Veri induat,
quæ est calida & humida, ob caliditatem qui-
dem attrahit ad cutim: ob humiditatem verò
non potest per modum vaporis resolvere. Affa-

tim igitur dum tota humiditas in morborum iudicijs excernitur, sudores facit.

X.

Εἰ τοῖσι αὐχμηροῖσι περὶ ὀξείας γίνεται, καὶ ἐν μὲν ἐπὶ πολλῶν ἢ τὸ ἴσος τιῶν ἐστὶν, οἷον τὴν κατὰσπον ἐπαίησιν, ὥς ἐπιθεπλὸν καὶ τὰ πεσέμεναι τριαῶναι δὲ ἀποσδ' ἡχίαν.

Per siccitates febres acutæ fiunt: quòd si amplius talis pergat esse annus, qualem fecerit constitutionem, tales plurimum morbos expectare oportet. 7. 3.

Ambientis humiditas pituitosos accernat humores, & non paucas generat aquosas superfinitates: siccitas verò pauciores quidem humores efficit, sed qualitate biliosiores: Et hanc ob causam febres numero quidem sunt pauciores quàm in temporibus pluviosis, sed acutiores, ut temporibus morbi respondeant.

XI.

Εἰ τοῖσι καθεστῶσι καχεροῖσι ἢ ὠρεάως τὰ ἡμέτερα ἀποδιδῶσιν, δύσπεδις καὶ ἀκρινής αἱ ἡύσαι γίνεται. ἐν δὲ τοῖσι ἀκαχεροῖσι ἀκατάστατος καὶ δύσχευτος.

In moderatis temporibus quum tempestiva fiunt tempestivè, morbi stabiles & boni iudicij accidunt: in immoderatis autem

autem instabiles & mali iudicij. 8. 3.

In constantibus temporibus quæ ordine quodam suam servant temperaturam, cum tempestivè fiunt omnia, ut cum syderum ortus & occasus, pluvia, serenitas, & venti suo tempore fiunt, morbi constantes & faciles & boni iudicij accidunt, quorum causas facile demoliantur vires minimè delectæ. In inconstantibus autem quæ non servant secundum aliquid anni constantis ductum, instabiles morbi fiunt, inquieti, & mali iudicij: vel enim cum periculosis symptomatibus indicantur, vel statim sunt perniciosi, vel omnino faciunt recidivam.

XII.

Αἱ δὲ καὶ ἡμέτεροι κατεστάσεις, αἱ μὲν βόρβοι τὰτε σὺν κατεσιωπῶσι, καὶ δὲ τὸνα, καὶ δὲ κίνηται, καὶ δὲ ῥεοα, καὶ δὲ κινώτεροι ποίησι, καὶ τὰς κελίας ξηραίνουσι, καὶ τὰ ὀμμετα δ' ἀκινουσι, καὶ καὶ τὸν θάλασσαν ἀλγύνουσι, ἢ π' αὐτοῦ πέρη, μᾶλλον ποίησι. αἱ δὲ τόποι ἀλγύνουσι τὰ σὺν κατεσιωπῶσι, καὶ βαρυνούσι, καὶ βαρυνούσι, καὶ βαρυνούσι ποίησι, καὶ ἰλγύνουσι ἐν τῇ π' ὀφθαλμοῖσι, καὶ τῶσι σὺν κατεσιωπῶσι, καὶ τὰς κελίας ὕδατος.

Constitutionum quæ quotidie fiunt, aquiloniæ quidem corpora cogunt, robustiora reddūt, facile mobilia, benè co-

lorata, & rectius audientia. Aluos præterea exsiccant, oculos mordent: & si thoracis dolor aliquis præcedit, magis irritatur. Austrinæ verò corpora languida efficiunt & humectant, difficilem auditum, capitis gravitatem & vertiginem afferunt, oculis atq; corporibus difficilem motum præstant, & aluos humectant. 17. 3.

Constitutiones quotidiana æquilonia quidem frigida sicca corpora densant & firmannt sua frigidityte: eadem mobilia reddunt, quòd supervacuas corporis humiditates exhauriant. Coloratiora, quòd actiones naturales & probam sanguinis in iecore elaborationem adiuvant: melius audientia faciunt, facultate animali tum bene valente. Caterum auditus nomine reliquos vult intelligi sensus qui omnes hac tempestate vigent: Aluos exsiccant ut totum corpus: Oculos mordent, non erodendo, sed diuellendo continuum. Pectoris dolores excitant, quia frigidum inimicum est pectori ut faucibus. Austrina verò constitutiones humide calida corpora dissolunt & humectant, auditum obtundant & caput aggravant, ipsum opplentes humiditate nimia, à qua & parca caliditate vertigines sunt: Oculis & corporibus difficilem motum præstant, nimirum humectant

meditato pernorum principio circa voluntarios
motus, pigritiam apparere necesse est: Ab ea-
dem humiditate aluos mouent & lubricant.

XIII.

Τῶν δὲ κατὰ φύσιν ὡς ἐναιὼν τὸ μὲν ὅλοι οἱ
αὐχομεῖ τ' ἐπομεῖται εἰσι ὑπερίπερι, καὶ ἡ-
σσι διακρίσεις.

Ex anni constitutionibus (vt in vniuer-
sum dixerim) ficcitates imbribus sunt
salubriores & minus mortiferæ. 15. 3.

Sicca constitutio (quod semel dictum sit)
salubrior est humida constitutione; nam morbi
magna ex parte fiunt à putredine, cui contra-
ria est ficcitas, humida siquidem intemperies
aërii excrementorum prouentum generat, qui
prouentus est morborum soboles: Siccitas au-
tem & exercitatio non colligunt multa excre-
menta, aut collecta absumunt.

XIIII.

Νοσήματα δὲ ἐν μὲν τῇ ἐπομεῖται ὡς
τὰ πολλὰ γινέται περιεῖτε μακροῖ, καὶ κριλῆς
ῥύσις καὶ σηπιδίς, καὶ ἐπίληψις, καὶ ἀποπλη-
κτοι, καὶ κυνάχαι. ἐν δὲ τῇ αὐχομεῖσι. Θρι-
νώδεις, ὀφθαλμῖαι, ἀρθρίαι, τραχηλῖαι,
καὶ δυσινεῖαι.

Morbi per assiduos imbres magna

ex parte fiunt, febres longæ, alui deiectiones, putredines, comitiales morbi, apoplexiæ & angina. Per siccitates autem tabes, lippitudines, articulorum dolores, stillicidia urinae, & difficultates intestinorum. 16. 3.

Febres quidem longas fieri ex multitudine humiditatu minimè mirum, siquidem egroti ad morborum solutionem egent coctione, plures autem humiditates non nisi in longo tempore concoqui possunt. Neque extra rationem est quòd alui profluvia in temporibus pluviosis eveniant, quum humorum superabundantia per aluum expurgetur, sicuti etiam quòd eisdem temporibus putredines fiant, quoniam perspicuum est humida siccum magis esse obnoxia putredini. Morbi autem comitiales ex pituita ortum habent: Et angina fit superfluitatū multitudine ad fauces collecta: fit etiam magna ex parte fluxionibus ex capite firmatis in faucibus. In humida constitutione alij etiam morbi ab Hippocrate non commemorati nasci possunt. In sicca verò constitutione, licet aura sit salubrior, in ea tamen proprij erunt morbi naturam constitutionis sequentes, morbi tabem afferentes, absque tamen pulmonis exulceratione, qua in sicciore tempore potius curetur quàm irriteur. Lippitudines sicca,

articulorum dolores ij qui ex humorum acrimonia ad articulos decumbente, procreantur, cum caliditas immodica accesserit. Urina stolidia fiunt propter acrimoniam urinae & facultatis retentrici imbecillitatem. Difficultas autem intestinorum non simpliciter ad siccitates consequitur, sed ad ingentes siccitates, & in naturis id pati idoneis.

I V.

Εν φθινοπώρῃ ὁ ξύπναι αἰ νύκτι, καὶ θανάτω δίδωται τ' ἐπίπαι. ἢ ὃ ὑγιεινότερον, καὶ ἥκιστα θανάτω δίδει.

Per Autumnum morbi acutissimi & exitiosissimi magna ex parte accidunt: Ver autem saluberrimum & minimè morbis exitiosis obnoxium. 9. 3.

Cum tempora convenientem seruant totam temperaturam, inter ipsa Ver est saluberrimum, ut quod optimam habeat temperaturam: Autumnus autem morbos acutissimos atq; exitiosissimos aliorum comparatione affert, propter eius inaequalitatem. Ob id à veteribus Philosophis & medicis tanquàm morbisfer, & à poëtis tanquàm pestifer iustis rationibus est damnatus: Prima, quòd traditum ab Aestate corpus languidum & iam effæctum in excipit, quod tantum abest ut iuuet, ut ei

penitus aduersetur : Corpora enim nostra sanguine constant, sanguine facta sunt, sanguine nutriuntur, Autumnus verò sanguinem gigni tota sua natura prohibet. Secunda, quòd vita nostra in calido & humido est, at ille frigidus est & siccus. Tertia, quòd excrementa per totam Aestatem liquata & fusa per corpus, & ad cutim ut vacuentur festinantia, Autumnus suo frigore intra corpus regerit, ibiq; continet, mille morborum genera paritura. Quarta, quòd suo calore per meridiem cutim corporis rarefacit & aperit, mox intra corpus tanquàm hostis frigidus irruit, & veluti odio quodam destinato, vesperi, tota nocte, mane, per ipsum grassatur, & quicquid habet frigoris & mali, id vniuersum in corpore intrudit, quo calorem nostrum natium (qui paucus ab Aestate superfluit, & idem imbecillus & languidus) sua qualitate mala extinguat. Quinta, quòd eundem calorem & nos miseros sua illa inequalitate caloris, & frigoris, veluti charybdi & syrta quadam, perpetuò agitat. Sexta, quòd cruditatem in corpore nostro cumulat, qua nos & nostrum calorem obruit ob usum crudorum, qualia sunt fructus omnes, omnia noua quae liberalia, si deus placet, Autumnus nobis suppeditat.

I V I.

Τὸ φθινόπωρον τῆς φθινοπώρου.

Autumn

Autumnus tabidis malus. IO. 3.

Autumnus siccitate quidem prodest & licet ipsius pulmonis : sed multis alijs nominibus obest, cum quia frigidus : omne enim frigidum (quatenus tale est) & ulceribus inimicum, tum, quia mordax, ex parvo ulcere magnum facit, tum quod & ulcera reddit insuppurabilia quæ suppurari conuenit. Præterea cum calidus interdum sit, & Phthisis raro sit absq; hectica, calorem & febrem intendit : & excrementa auget quæ in ulcus inuadit. Verùm Hippocrates in Epidemys cum dicit ver etiam esse tabidis malum, intelligendum est Veris principium tantum, quod firmè conuenit cum Autumno, eumq; naturam habet, hoc est, inæquale existit, iam scilicet frigidum, iam calidum. Proinde cum hic dicatur Ver saluberrimum & minimè exitiale, non simpliciter alibi dixit esse malum, sed cum quadam conditione, quando nimirum fieri folia cornici pedibus similia fuerint : quæ periphrasis est principij veris, quæ etiam vsus est Hesiodus in lib. cui titulus, ἔρως καὶ ἡμεῖς.

XVII.

Περὶ δὲ τῶν ὀρίων καὶ πρὸς ἡλικίαν αἰχμηρὸς
καὶ βόρτος γινώσκων, τὸ δὲ ἵαε ἱππεύοντι καὶ ἰόπον.
ἀνάσκει δὲ θείος κυριεύς ὀξίας καὶ ὀφθαλμίας
καὶ

καὶ δυσινεσίας χύμας, μάλιστα δὲ τῇσι γυναι-
ξί, καὶ ἀπορᾶσι ἔσιν ὑπερίσιν τὰς φύσεις.

Inter anni tempora si Hyems plus
iusto sicca & frigida fuerit, Ver autem
pluvium & austrinum, febres acutas fie-
ri Aestate necesse est, & lippitudi-
nes & difficultates intestinorum, præ-
sertim mulieribus & viris natura hu-
midis. II. 3.

Cùm antea generatim dixerit mutationes
temporum parere morbos, nunc particulatim
idipsum in mutationibus, quæ per varia an-
ni tempora fiunt, ostendit. Nam si Hyems
aquiloma fuerit, Ver autem australe & plu-
viosum, necesse est Aestate sequenti febres
acutas fieri, & lippitudines, & difficultates
intestinorum. Tali siquidem vere existente
colliguntur in corporibus humiditates, quæ per
Aestatem calfactæ & corruptæ, febres acutas
generant cum reliquis omnibus, tum præser-
tim pituitosis. Convenit etiam difficultates in-
testinorum fieri, & oculorum lippitudines, ut
præcipuè qui ad huiusmodi affectus sunt para-
tiores, vel materia ad oculos decumbente, vel
eadem ebulliente & à capite ad intestina
transmissa, quæ tandem sua mordacitate cor-
rodit intestina & exulcerat. Vide Problema 8,
prima sectionis apud Aristotelem.

XVIII.

Ἡ δὲ νόσος ὁ χυμὸν καὶ ἱσχυροῦ καὶ ὀ-
 δίου γίνῃ, τὸ δ' ἴαε αὐχμηρὸν καὶ βόρειον, αἰ-
 μὲρ γυναικὸς ἦσιν οἱ τέκνοι μετὰ τὸ ἦρ, ἐκ πά-
 σης περ φάσιος ἐκλήρεσκεσι. αἱ δ' ἐν τέκν-
 οισι, ἀκρατία καὶ νοσήδια τὰ παιδία ἔκτεσι, ὥστε
 ἢ παραυλῆαι ἀπόκλυθαι, ἢ λιπῆαι καὶ νοσήδια
 ζῆν ἰόντα. ἴσιν δ' ἀποσι δυνειρία, καὶ ὀφθαλ-
 μῖαι ἐκραι γίνον. ἴσιν δ' πρὶς βουτίεσι κα-
 τάρτοι σιωθῆως ἀπὸ λυώτις.

Si verò Hyems austrina & admodum
 pluvia fuerit, Ver autem ficcum & aqui-
 lonium, mulieres quibus partus Vere
 imminet ex quacunq; occasione abor-
 tiūt: Quæ verò pepererint, imbecilles &
 morbosos infantes edent, ita vt aut sta-
 tim pereant, aut inuvalidi & morbofi vi-
 uant. Cæteris verò difficultates intesti-
 norum & lippitudines oculorum ac-
 cidunt ficcæ: Senioribus autem destilla-
 tiones breui interimentes. 12. 3.

Hyeme verò humida existente & calida,
 Vere autem frigido ac sicco, mulieres quibus
 partus incidit in Ver ex quacunq; abortiunt oc-
 casione: Corpora siquidem humida ac mollia
 & rara reddita per Hyemem tepidam, ad in-
 simas sui partes frigiditatem aëris admittunt;
 itaq; quicunq; infantes longo tempore assue-
 runt

merunt aëri tepori, à frigore facile offendun-
tur, alij quidem in ipso iam vtero mortui, alij
verò in ipso partu morituri. Qui verò ex his
vivi in lucem eduntur, non ferentes subitam
ad contrarium mutationem, vel brevi post
tempore moriuntur, vel imbecilles & morbo-
si vix in vita perdurant. Ceterum alijs seu
pituitosis ac mulieribus difficultates intestino-
rum aut accidere ex pituita à capite ad ven-
trem defluente, quæ si salsa est & veluti bilio-
sa, transeundo offliget, intestinis hærens, ac
semper aliquid deterens propter qualitatem
faciet intestinorum difficultatem. Lippitudi-
nes autem siccas (sic vocat eas, quæ sunt absq[ue]
fluxu) par est in sicca constitutione calidis &
siccis naturis accidere. Caput enim prius reple-
tum est & in humida & calida constitutione,
frigus autem superveniens veluti manus que-
dam capiens ac premens quandam vti spon-
giam, cerebrum, exprimit illam quæ in ipso
continetur humiditatem: hæc verò non effluit
extra, propter ambientis frigiditatem densantis
superficiem exteriorem. Senes autem à de-
stillationibus correpti in tali constitutione,
repente ob venarum colligationem & ner-
vorum dissolutionem intereunt. Huc pertinet
Problema 9. prima sectionis Aristot.

X I X.

Ἡ δὲ τὸ ξηρὸν αὐχμηρὸν καὶ βόρρον γίνε-

ται, ὃ δὲ φθινόπωρον ἐπομβρινὸν καὶ τόπον, κεφα-
λαλίζει τοὺς χειμῶνα γίνονται, καὶ βῆχες, καὶ
βρογχίτις, καὶ κόρυζαι, εὐνοῦσι δὲ καὶ φθίσις.

Si Aestas sicca & aquilonia fuerit,
Autumnus verò pluvius admodum &
austrius, dolores capitis Hyeme fiunt,
& tussis, raucitates atque grauedines:
nonnullis etiam tabes accidit. 13. 3.

Sed si Aestas sicca fuerit & aquilonia,
Autumnus autem humidus & Austrinus,
necesse erit ijs qui naturam habent humidio-
rem, supra modum repleto capite, hos morbos
Hyeme aduenire, Hyeme videlicet suscipiente
capita austrini pluuijs repleta. Si ergo hu-
mor in capite constitit, grauitatem commit-
tit: sed si ob nimiam sui copiam concrefcere
non potuit, in partes inferiores defluit: atq;
ita tussim & raucedines si in asperam arteriā:
si in nares, grauedines: & tabem si in pulmo-
nes, contrahit. 10. Problemate primæ sectionis
apud Aristotelem.

X X.

Ἦν δὲ βόρβοις ἢ καὶ αἰνυδρον, ᾧσι μὲν ὑπερῷαι
ἴσθι τὰς φύσεις, καὶ τῇσι γυναιξὶ ἐμφορῇ
ᾧσι δὲ λοιποῖσι ὀφθαλμίας ἴσονται ξηραὶ, καὶ
πυρετὶ ὀξείᾳ τε καὶ μακροῇ, εὐνοῦσι δὲ καὶ με-
ταβολίαι.

Si verò Autumnus aquilonius & sic-
cus

cus fuerit, iis qui natura humidi sunt, & mulieribus confert: reliquis verò lippitudines siccae accidunt, & acutæ febres & longæ: Nonnullis verò & melancholia. 14. 3.

Autumnus siccus & aquilonius confert iis qui sunt humido præditi temperamento, exsiccantur enim ab hac constitutione, & exsiccati perveniunt ad Hyemem, aut minus humidi: Biliosus verò talis Autumnus est inimicissimus, quia nimis exsiccantur: bilis enim pars humidissima atq; aquosissima absumitur, crassissima verò & acutissima relinquitur, unde hi & alij morbi contingunt.

XII.

Τῶν νέων ἄλλαι αἰεὶς ἄλλας δὲ καὶ κακῶς πεφύκασιν, καὶ ἡλικίαι τῶν αἰετῶν ἄλλας, καὶ χόλως, καὶ διαίτας.

Morborum alij ad alia tempora magis aut minus proclives sunt, eodem modo & ætates ad tempora, loca, victus rationes, magis aut minus aptæ sunt. 3. 3.

Morbi, ut quædam ætates, ad contraria quidem benè, ad similia verò malè se habent: præterquàm si ætas temperata victui & regionis & aëris temperato comparatur, hoc enim
solum

solummodo similes à similibus benè afficiuntur. Quæ verò plus à commodatione recesserunt atates, ut secundum temperaturam contraria loca, & tempora, & victus genera conferunt. Porro morbi omnes cum à temperie & modo recedant, generatio quidem à similibus locis, temporibus, viuendirationibus fit, solutio verò à contrarijs. Nam morbi calidi in locis calidis magis generantur, & minus sunt periculosi, sed magis solvuntur in frigidis, atq; in alijs proportionaliter. Idem est iudicium de atatibus & naturis quæ à proba temperie declinaverunt.

X X I I.

Τῶν φύσιν αἱ μὲν πρὸς θεῖον, αἱ δὲ πρὸς
 χυμῶνα δὲ ἢ κακῶς πικρῶσι.

Naturarum hæc quidem Aestate, illæ verò Hyeme benè aut malè afficiuntur. 2. 3.

Naturæ nomine intelligi hîc debet temperatura quatuor qualitatum, calidi, frigidi, humidi, sicci. Temperatura verò multis modis dicitur: nam vndequaq; optima & excellentissima censetur unica & simplex, quæ reliquarum est index & regula. Siquidem in omnium rerum genere, quod optimum & perfectissimum est, id unicum est, vitiosa verò

plurima. Quare cum una temperatura sit optima, octo sunt ab optima illa deficientes magis & minus pro varietate recessus à mediocritate : quatuor quidem simplices secundum qualitatem excedentem, quatuor verò composita secundum duas : quarum tamen unaquaq; (modo ne per eam actiones consue- ta impediuntur) intra terminos sanitatis con- tenta, corrigenda est contrarijs, ut siccior hu- mestantibus, sumendis, admouendis, educen- dis, faciendis, & alia similiter non secus quam quæ morbosa est intemperies, nisi quod hæc morbosa valentiora requirit contraria, ob id quod ab æqualitate magis recessit. Quapro- pter naturæ frigida & humida bene afficiun- tur Aestate suam seruante naturam, quod earum immoderatio Aestatis caliditate & siccitate temperetur : Contrà, malè tum affi- ciuntur calida & sicca natura, quando pro- pter similitudinem Aestatis aucta in immo- derantiam quandam incidunt. Hyeme bene afficiuntur calida & sicca natura, quod per utranq; oppositionem, Hyemis emendetur ex- cessus, & ad symmetriam fiat reditus : malè verò afficiuntur frigida humida, quod à simi- li Hyemis temperatura earundem excessus an- geatur. Aestatis & Hyemis tantum meminit, propterea quod duæ partes anni sunt hæc ma- ximè insignes, & sub his reliquas cõplectitur.

XXIII.

Κατὰ τὰς ὥρας, ὧ μὲν ἡρῶ καὶ ἄκρῃ ὧ
 θερος, οἱ παῖδες, καὶ οἱ ταπῖων ἐχόμενοι τῆσιν
 ἡλικίῃσιν ἄριστά τι διάκεινται καὶ ὑγιαίνει μάλι-
 κα. ὧ δὲ θερος καὶ ὧ φθινοπώρῃ μέτρι μὲν π-
 νος οἱ γέροντες. τῷ δὲ λοιπὸν φθινοπώρῃ καὶ ὧ
 χιμῶνος, οἱ μέσοι τῆσιν ἡλικίῃσι.

Per tempora anni, Vere quidem, &
 principio Aestatis, pueri & qui eos æta-
 te mox sequuntur, optimè degunt, maxi-
 meq; valent: Aestate autem & Autumno
 aliquantisper senes: per reliquum au-
 tem Autumnum & Hyemè, qui mediam
 ætatem habent. 18. 3.

Naturæ, ætatibus, & regionibus benè tem-
 peratis, optimum tempus quod optimam ha-
 bet temperiem, cùm non egeat habitus sui per
 mutatione, sed cōservatione: Rerum enim una-
 quæq; à similibus quidem cōservatur, à contra-
 rijs autem transmutatur. Quare pueri & ado-
 lescentes Vere & Aestatis principio optimè de-
 gunt. Senibus verò utilissima est Aestas, à qua
 frigiditas eorum contemperatur: Sicuti q̄s. qui
 in ætatis vigore cōsistunt, Hyems maximè con-
 fert, hac enim cōtraria est biliosæ eorum intem-
 peraturæ. Itaq; naturarum biliosiores quidem
 Hyeme optimè degunt. Pituitosiores autem Ae-
 state: benè autem temperatæ, Vere.



HIPPOCRATIS

APHORISMORVM

PARS QVIN-

TA,

In qua exponuntur ij qui febribus conue-
niunt, item quibusdam morbis criticis
& acutis, qui commodè cum febribus
arumerati queunt. Tota scetè hæc pars
ad eam in medicina attinet, quæ futu-
ra prædicere solet.

I.

**Ως ὁ ξίαν νοσημάτων ἔπαμπεν ἁ-
φάλης αἱ ἀποδιαρροῖαι, ἔτι τῷ
θανάτῳ, ἔτι τῷ ὕλει.**

Acutorum morborum non
omnino tutæ sunt prædictiones neque
salutis neq; mortis. 19. 2.

Acuti morbi quos magna ex parte comi-
tantur febres continuæ, præterquàm quòd ce-
lerrimè iudicantur, statim etiam magnitudi-
nem habent: fiunt vel ex humoribus calidi-
um certum obsidentibus locum, vel in lo-
co certo patiente fiunt, ut pleuritis, peripneu-
monia, synanche. Morbi verò longi à crassi,
lenti,

lenti, & frigidi humoribus facti, in patientibus partibus impatti sunt atque fixi, qui quia causam habent non adeò mobilem, predictiones in hiis sunt tutiores: In acutis verò non omnibus certa sunt, verùm aliquando falli precognitionem fatetur Hippocrates, ob subitatas quæ in hiis contingunt mutationes. Et quia humor noxius sæpe ex vno loco transfertur ad alterum, de parte ignobili ad principem, & de principe ad aliam fertur: hac est causa propter quam multi reualescunt, quos morituros medicus prædixit: & multi moriantur quos minimè morituros existimavit: huius autem rei causa est humor noxius sic errabundus, unde prognostici falsitas contingit. Quo fit ut in hiis non temerè sit de morbi exitu pronuntiandum.

I I.

Τὰ ἰσχυρὰ καὶ μακρὰ ὄντα ἐν τῇσι νόσοις μὴ κεῖσιν, ὑποπροφὰς ποιεῖν εἰώθει.

Quæ relinquuntur in morbis à iudicatione recidivas facere consueverunt. 12. 2.

Humorum pravorum reliquia, post crisin imperfectam, in putredinem convertuntur, ac fibres accendunt, aut alios morbos excitant, nisi in tempore vacuentur à medico. Qui relinquitur inter alios sophista, hæreticus & ma-
Hugnoti

lus homo, alijs morbum afflat, & scabiem affricat sanis contagiosus : ita morborum reliquiae putredine inualefcente recidinas facere consueverunt.

III.

Ο πόσοισι κρίσις γίνεται, τῆς οὐσίας ἢ τῆς δύστροφος ἢ πρὸς τῷ παρὰ φύσιν. ἢ δὲ ἐπὶ τῷ σώματι ὡς ἐπὶ τῷ πολῷ.

Quibus iudicatio instat, iis nox quæ accessionem præcedit difficilis est, quæ verò subsequitur magna ex parte faciliior existit. 13. 2.

Crisis est subita in morbis ad melius vel ad deterius mutatio : fit autem natura separante à bonis mala, & ad excernendum præparante. Quo fit ut in tali turbatione grauius se habeant agri : grauitas autem hæc nocte præcedente accessionem, clarius percipitur, quòd ea somnum interrumpi contingat, nocte verò sequente crisin perfectam, lenius habent, natura scilicet à superuacuis & molestis humilibus exonerata.

IIII.

Τὰ ὀξεία τῶν νοσημάτων κρίνεται ἐν πωροῖς καὶ δέκα ἡμέραις.

Acuti morbi intra quatuordecim dies iudicantur. 13. 2.

Acute

Acuti morbi simpliciter quia magni sunt, & ad suum vigorem celeriter properant, magnas & subito faciunt permutationes: in quibus si ad melius vel ad sanitatem mutatio repente fiat, superante natura perniciem imminuentem ab eo qui morbum committebat humore, bona indicatio dicitur ab Hippocrate: si verò ad deterius vel ad mortem fiat, natura vi prostrata, mala. Terminum autem istius indicationis definit secundam septimanam, ita ut non ultra decimum quartum diem proegetur, licet illum diem anticipare possit. Sunt alij quidem, sed non simpliciter acuti, quos interpretes nonnulli ex decidentia vocant. Hippocrates in prognost. hos dicit acutos qui in quadraginta diebus indicantur.

V.

Τῶν ἰσθῶν ἡ τετάρτη ἡμέρα. ἰσθῶν ἡμέρας ἡ ὀγδόη δὲχῃ. Διαγρητὴ δὲ ἡ ἰνδύγῃς, αὐτὴ γάρ ἐστι τετάρτη ἡ ἰσθῶν ἡμέρας. Διαγρητὴ δὲ πάλιν ἡ ἐπὶ τῇ κατὰ τὴν αὐτὴ γάρ ἐστι τετάρτη μὴ ἀπὸ τῆς ποταρικῆς δὲχῃς, ἡ ὀγδοὺς δὲ ἀπὸ ἰνδύγῃς.

Quartus dies septenorum est index, octavus alterius septimanæ principium existit: est verò & undecimus contemplabilis, ipse enim quartanus est alterius septimanæ: contemplabilis rursus decimus septimus, quippe quartus est à quar

to decimo, septimus verò ab vndecimo. 24. 2.

Indices & contemplabiles dies nominat, quòd sequentes dies decretorios quales futuri sint qualésve habebunt mutationes aut crises indicent. In diebus autem quoniam septenario circuitui magna via inest in indicâdo, quartanario verò in demonstrando, sit ut quartus dies septimi, vndecimus decimi quarti, decimus septimus vigesimi, vigesimus quartus trigessimiseptimi, & sic deinceps à quartanario ad septenarium procedendo, sit index. Ceterum aliq̃ inter indicatorios & indices, dies intercedentes dicuntur, in quos non nisi erraticis quibusdam interuenientibus crises transferuntur. Quippè in ijs non natura motu ac impulsu, sed morbi magis malitia, aut extraneo aliquo impellente iudicationes sunt: hinc est quòd à nonnullis prouocatorijs nominentur, quòd nimirum in ijs natura non sua sponte, sed prouocata pugnam contra noxios humores adoriatur.

VI.

Οἱ θεινοὶ πεπεταῖοι τὰ πολλὰ ζήνοισι
βροχίτις. οἱ δὲ φθινοπαρινοὶ μετὰ τοῦ, καὶ μάλιστα
οἱ ἀπὸ τοῦ χιμῶνα συνάπτοντες.

Aestiuæ quartanæ magna ex parte breues

ues sunt, Autumnales verò longæ, præsertim quæ Hyemem attingunt. 25. 2.

Non solùm quartana breues Aestate fiunt, sed & aggritudines aliæ, propterea quòd humores vitiosi ambientis calore per vniversum corpus fusi, promptè discutiantur meatibus totius corporis patefactis. Quibus igitur vires valida sunt, noxijs humoribus euacuatis, ij citò renalescunt à morbo: quibus verò sunt imbecilles vires, vnà cum euacuatione humorum ipsæ dissoluantur ac ægri intereunt. Quare non sine ratione morbi Aestate longi nō sunt. Sicuti verò Aestate discuti humores & vires dissolui contingit, hoc est, ægros sanitati restitui aut citò interire: ita Hyeme contraria eueniunt, ut & humores intus remaneant meatibus corporis frigore occlusis, & vires seruentur robustæ. Neq; igitur morbi solvuntur manentibus ijs qui eos efficiunt humoribus, neq; ægri moriuntur viribus interim sufficientibus.

V I I.

Τῶν πυρετόρων μὴ παντάπασιν ἐπιπο-
λαῖως τὸ διακίρην εἰ μὴδὲν ἐνδιδόναι τὸ σῶμα,
ἡ καὶ σκευήκρια μᾶλλον ἢ καὶ λόσον, μεχθρόν.
τὸ μὲν γὰρ μᾶλλον ἔστι σημαίνει, τὸ δὲ ἀδιδόναι.

Corpus eorum qui non omnino leuiter febricitant, perstare & nihil comminui, aut magis quàm ratio exoptulet

Extenuari, malum. Alterum enim diuturnitatem morbi, alterum imbecillitatem significat. 18. 2.

Febricitantium non omnino leniter, id est, grauiusculè & velut media quadam febre inter mitem admodum ac vehementem, corpus permanere & nihil minui neque collabi, vel plusquam magnitudo morbi postulat contabescere, malum. Nam quod tale permaneat, id ex densitate cutis accidit & crassitie humorum, & propterea longitudo morbi significatur: quod autem contabescat nimis, id contingit ob humorum tenuitatem, aliquando & cutis raritatem, aliquando verò & ob solam virium imbecillitatem, quæ magna ex parte cutis & humoris tenuitatem consequitur: tum enim celerrimè corpora emaciantur & euacuantur per eam quæ diffusio insensibilis nominatur.

VIII.

Οξέως εν τρισι ημεραις ενταλινος ιδρω
πινα γινεται, εὐνομετα.

Quibus in febrilibus sexto die rigores sunt, ij difficile iudicium afferunt. 19. 4.

Quicumq; ad febres & præcipuè ardentes rigores superveniunt, iudicium habere solent bonum atq; perfectum ubi in die indicatorio sunt,

fiunt, & cum signis colitionis: non bonum autem neque perfectum, quando vel diei vel colitionis signa fuerint imperfecta. Quapropter cum indicationes in dies intercurrentes translata suspecta esse debeant, quod non natura motu; sed morbi malitia fiant, certè diei sexti indicatio suspecta sit oportet, in quo nullus indicatur morbus, nisi cum difficilibus symptomatibus & maximo periculo.

IX.

Οκόσσις πυροξυσμὸς γίνεται, ἢν ἂν ὄρῳ ἀφ' ἧς πυρετός, ἐς τὴν αὐρίαν τὴν αὐτὴν ὄρῳ ἢν λάβῃ, δύσκερτα.

Quibus accessiones fiunt, si febris quaecunque hora dimiserit, postero die eadem inuasit, iis difficulter soluitur. 30. 4.

Febrim interpellantium accessiones, quacunque hora observata, febris dimiserit si eadem eras hora & postero die, ac deinceps occupaverit, iudicium habent difficile ob causam quae accessionem facit fixam, firmatam, & stabilitam: nam quae firmata sunt egrè solvuntur, & in longum tempus durant.

I.

Τοῖσι κατὰ δύσιν ἐν ἑῷσι πυρετοῖσιν, ἐς ἀεὶ ἐκ πυρὸς τὰς γνάβας μάλιστα αἱ δάκτυλοις γίνεται.

In febribus in quibus lassitudinis sensus est, in articulis & circa maxillas potissimum abscessus fiunt. 31. 4.

Qui quomodocunque in febribus lassitudinem habent, ipsi ad articulos & circa maxillas precipue fiunt abscessus. Hoc verò contingit propter eam quæ est in febribus caliditatem, sublata plenitudine ad caput, & postea eam suscipientibus articulis, & illi qui circa maxillas adenes existunt: sicuti qui circa inguina & alas sunt, quando ad illas partes multitudo pervenerit.

XI.

Ἰδρώτες περιτάρυσαν ἢ ἄρξων, ἀναβόη τεταῖοι, καὶ πικρὰ ταῖοι, καὶ ἰσχυροὶ, καὶ ἐν ταῖοι, καὶ ἐνδύκαταῖοι, καὶ ποταρὶσκαυδὲκα ταῖοι, καὶ ἰπιακαυδὲκα ταῖοι, καὶ μὴ καὶ εἰς ἑπτα ἔβδωρον, καὶ εἰς ἑπτα, καὶ τριακοντὴ ὡσπερ καὶ τετρακοντὴ πεπτη. ὅτι οἱ ἰδρώτες ἔσονται κρινέσθαι οἱ δὲ μὴ ὅπως γινώσκοντες, πόσον σημαίνεσθαι, καὶ μὴ καὶ ἔσονται, καὶ ὑποπροστασμενός.

Sudores febricitantibus si euenerint tertio die, & quinto, & septimo, & nono, & undecimo, & decimo quarto, & decimo septimo, & vigesimo primo, & vigesimo septimo, & trigesimo primo, & trigesimo quarto, boni sunt: ij enim sudores iudicant morbos. Qui autem secus
euc

eueniunt, laborem significant longitudinemq; morbi, & recidiuam. 36. 4.

Sudores saluberrimi censentur in omnibus acutis morbis, si diebus indicatorijs oriantur febremq; finiant: contra, inutiles, qui id efficere non possunt, quiq; diebus accidunt non indicatorijs.

XII.

Οἱ ψυχροὶ ἰσθμῆτες ἔω μὲν ὁξείᾳ πυρετῇ γιγνώσκονται, θάνατον. ἔω πεντήκῃ δ', μᾶλλον ἰσχυρὰ σημαίνονται.

Sudores frigidi cum acuta febre facti, mortem significant: cum mitiore autem longitudinem morbi. 47. 4.

Frigidi sudores sic è corpore manantes cum acuta febre facti, mortem significant: quippè tantam humorum frigidorum in corpore copiam esse monstrant, ut neq; à nativo calore neq; à febrili possint cal fieri, unde naturæ (quæ secundum Hippocratem est calor naturalis) extrema imbecillitas, vel eiusdem extinctio, atq; adeo mors in propinquo esse intelligitur. Sudor verò frigidus si fiat, remissis existentibus febribus, contingit saluari hominem, concocta in tempore multitudine humorum atq; euicta à natura.

XIII.

XIII.

Καὶ ὅκω ἐν τῷ σώματι ἰσχυρὸς, ἐνταῦθα
φύσσει πλὴν νόσον.

Qua parte corporis fudor est, ibi mor-
bum esse ostendit. 38. 4.

Sudores à natura ipsa propellente facti, non
à causa externa, membrorum patientium hu-
miditatem euacuant.

XIII.

Καὶ ὅκω ἐν τῷ σώματι θερμὸν ἢ ψυχρὸν,
ἐνταῦθα ἢ νόσος.

Et qua in parte calor aut frigus est, ibi
morbis est. 39. 4.

Si in parte aliqua aut etiam in toto corpo-
re caliditas insignis fuerit, aut frigiditas spon-
te prodians & perseverans, hic necessarium est
esse morbum: hoc enim recedit à temperie na-
turali, quæ sanitas est: sanitas autem commo-
deratio calidi, frigidi, humidi, siccæ.

XV.

Καὶ ὅκω ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί, ἢ
ἐν τῷ σώματι καταψύχεται ἢ αὐθις θερμαίνεται,
ἢ χεῖρμα ἢ περὶ ἰξίπρη γίνεται, μέγας νόσος
σημαίνει.

Et ubi in toto corpore mutationes
sunt,

fiunt, & modò corpus frigescit, modò calefcit, aut color alius ab alio fit, morbi longitudinem significant. 40. 4.

Mutationes qualitatum atq; colorum, humores morbum efficientes ostendunt, qui cùm diversi sunt, ad eos concoquendos natura ipsa longo indiget tempore. Pro dominante verò humore diversi fiunt & apparent in cute colores: caterùm omnia varia sunt periculosa in alimentis, in deiectionibus, urinis, spu-ritu, &c.

XVI.

Ἰδρῶς παλὺς ψυχρὸς ἢ θερμὸς αἰεὶ πῶν, ὁ ψυχρὸς μείζων, ὁ δὲ θερμὸς ἐλάσσων νόσος σημαίνει.

Sudor multus frigidus vel calidus assiduè fluens, frigidus quidem longiorem, calidus autem breuiorem morbum significat. 41. 4.

Sudor frigidus crassam & multam materiam ostendit, quæ non facîle discenti aut à calore vinci queat, ideoq; longitudinem etiam morbi significat: calidus verò materiam tenuem & quam promptè concoquere ac discentere natura possit, ac ideo breuiorem morbum portendit: hic autem agit de sudore qui erumpit, non in die indicatorio, sed in toto morbi tempore.

XVII.

Οἱ πυρετοὶ ὁκόσσι μὴ ἀφλείποντες ἀφ' τρίτης ἰσχυρότεροι γίνονται, μᾶλλον ἐπικίνδυνοι. ὅταν δ' αὖ τρέψῃ ἀφλείπῃσι, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι.

Quæcunque febres non intermittentes tertio die validiores redduntur, periculosa existunt: quoquomodo autem intermiserint, periculum abesse significant. 43. 4.

Continuæ febres quæ ad infirmitatem non desinunt, si tertio quoque die exacerbentur, ut semitertianæ, periculosiores sunt intermittentibus: quocunque enim modo intermiserint, periculum abesse significatur, hoc est, siue vehemens, siue longa fuerit accessio, eo enim tempore quo vacant febre, virtus se recolligere potest.

XVIII.

Ὅσοιαισι πυρετοὶ μακροὶ, τῆλοισι φύματα ἢ τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι ἰσχυνοῦται.

Quos diuturnæ febres exercent, iis vel tubercula vel dolores in articulis fiunt. 44. 4.

Propter multitudinem vel crassitiem vel frigiditatem humorum efficientium febres, ple-

runq;

runq; morbi in longum extenduntur, cum longum exigant tempus ad coctionem. Par igitur est ob hanc & abscessus fieri, & ad articulos superfluitatem decumbere. Non autem semper hoc fit, sicuti neq; quicquam aliud huiusmodi, sed magna ex parte videlicet contingere videtur.

XIX.

Οκίσουσι φύματα ἐς τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι ἐκ πυρετῶν γίνονται, ὅτε σίκοισι πλείοσι χρίονται.

Quibus tubercula vel dolores in articulis fiunt post diuturnas febres, ij pluribus cibis utuntur. 45. 4.

Convalescentibus repletis rationabile est hanc aduenire symptomata: nam cum post febres longas cibos ingerant supra mediocritatem aut virium mensuram, fieri non potest ut rectè concoquant. Igitur ut multa excrementa coaceruent necesse est, quæ si ad cutem protruduntur, tubercula, sin ad articulos, dolores excitant.

XX.

Ἡ ῥίγος ἐμπίπῃ πυρετῷ μὲν διαλείποντι, ἢ δὲ ἀδυνάμει ἰόντι θανάσιμον.

Si rigor incidat febre non intermitteute, agro iam debili, lethale est. 46. 4.

Frigus,

Frigus, minima: horror, maior: rigor est totius corporis concussatio maxima, quæ si sit irrita, & quam nulla sequatur euacuatio quæ faciat intermissionem aegro iam debili, in hoc ultimo natura conatu lethale signum est, indicans summam imbecillitatem naturæ, quæ solita in rigoribus noxios humores euacuare, nunc id efficere non possit, quod victa ceciderit & extinctioni proxima sit.

XXI.

Αἱ ἀποχρίμαψις αἱ ἐν πυρετοῖσι μὴ ἀλαί-
πυσι αἱ πικρὰ καὶ, καὶ αἱ μάλ' ὄντες, καὶ ὀνύ-
δες, καὶ χολάδες, πᾶσαι κακὰί.

In febribus non intermittentibus excretiones liuidæ, cruentæ, foetidæ, & biliosæ, omnes malæ. 47. 4.

Vt bonæ excretiones bonarum, sic malæ malarum dispositionum sunt indicia. Liuidæ quidem mortificationem significant, cruentæ vasorum apertionem, foetida putrefactionem insignem, biliosa redundantiam bilis in febribus cōtinuū. Indicia verò laudabilium excretionū maxima sunt & cōstio & bona tolerantia.

XXII.

Εν τοῖσι μὴ ἀλαίπυσι πυρετοῖσι, ἢ τὰ μὲν
ἔξω φύρα' ἢ, τὰ δ' ἔνδω καίηται καὶ διψῶ
ἔχει, δατάπρον.

In febribus non intermittentibus si partes exteriores sint frigidae, & interiores vrantur & sitim habeant, lethale est. 48. 4.

Quando aliqua fortis inflammatio in parte corporis profundiori, vel erysipelas eueherit, totus ex toto corpore sanguis ad locum trahitur patientem, atq; ideo vruntur profunda, sed cutis refrigeratur, ut sit in principijs accessionum, quod signum est exitiale.

X X I I I.

Εν μὴ Διγλαίποινι πυρετῷ, ἢ χεῖλος, ἢ ὀφθαλμὸς, ἢ ῥίς Διγγραφῇ, ἢ μὴ βλέπη, ἢ μὴ ἀκὺς, ἢ δὴ ἀθνήος ἰόντος ἢ σόμματος, οὗ ἂν τετέων γένῃ, ἰσγὺς ὁ θάνατος.

Si in febre non intermittente, labrum aut supercilium, aut oculus, aut nasus peruertatur, si non videat nec audiat imbecillo iam existente corpore, quicquid horum acciderit, mors in propinquo est. 49. 4.

Partium fiunt peruersiones tensis atq; ad sua principia contractis usq; nervis qui ad eas pertingunt. Quod cum acciderit febre existente continua, & agro debili, non absque ratione mortem esse vicinam est existimandum: multo autem magis quando non audiat aliquis

vel non videat, propter virtutis animalis imbecillitatem.

XXIII.

Οκχὰν ἐν τῇ πυρετῇ μὴ ἀγλαίπῳ δὲ
αὐτοῖα γίνεται ἔπερὰ φρεσὶν, θανάσιμος.

Quando in febre non intermittente difficultas spirandi & delirium accidit, lethale est. 50. 4.

Fit interdum ex eadem causa utrumq; horum, & difficultas spirandi & delirium, patiente videlicet cerebro, & tunc apparet spiritus magnus & rarus. Contingit etiam spirandi difficultas ob aliquam earum partium que respirationi obferuiunt, passionem. Nam & morbus lateralis, & pulmonis inflammationes, & reliquæ thoracis atq; pulmonis passionnes spirandi faciunt difficultatem. Hæc verò omnia periculosa sunt, præsertim febre continua adiuncta: Nam semper cum tali fieri consueverunt, quæ & ipsa per se satis est efficax sola ut vires deiciat atq; prosterneat.

XIV.

Εν τοῖσι πυρετῶσι διασήμετα μὴ λυόμενα
εἰς τὰς πρώτας κείσας, μήκῃ ἴσως σημαίνει.

In febribus, abscessus qui in primis iudicationibus non solvant morbum, eiusdem

dem longitudinem significant. § 1. 4.

Liquet hoc ipso sermone, quòd quæ ad primas indicationes, non solvuntur, ægritudines, vel quia natura est imbecilla, vel quia materia est contumax, diu sint duratura, nisi mortem anticipent.

X X V I.

Οκλόσιον ἐν τοῖς πυρετοῖς ἢ ἐν τῇσι ἀλλοίωσι ἀρρώσियों καὶ πυρετοῖς ὁ φθάλμιος δακρύει, ὅθεν ἄρποι. ὁκλόσιον δὲ μὴ κατὰ πυρετοῖς, ἀρπώτερον.

Qui in febribus aut in aliis morbis voluntariè illacrymant, nihil absurdi est: Qui verò non volūtariè absurdus. § 2. 4.

Lacrymæ non sponte exeuntes ostendunt magnam imbecillitatem facultatis naturalis retentricis. Idem est iudicium de excrementis, urinis, quæ ne in lecto quidem retinentur. Habendum tamen hoc in animo, quòd signa à facultate naturali singula sunt valde imbecilla nisi consensu aliorum firmentur, in turba valere possunt.

X X V I I.

Οκλόσιον ἢ ἐπὶ τῷ ὁδόντων ἐν τοῖς πυρετοῖς πείνιλλος γίνεσθαι, ἰχυρότερον γίνεσθαι οἱ πυρετοῖ.

Quibus in febribus iuxta dentes lentiores nascuntur, iis febres vehementiores fiunt. § 3. 4.

Neque enim nasci possunt huiusmodi lentiores sine caloris multitudine pituitosiorum humiditatem exsiccante.

XXVIII.

Οξόσυσιν ἐπὶ πολὺ ὄχλος ἐκείνη βαρύνει
ἐκείνησιν ἐν πυρετοῖσι κατωδύνει, ὅ πάντες
διψῶδες εἰσιν.

Quibus tussis sicca modicè irritantes in ardentibus febribus diu duranti, non admodum siticulosi sunt. § 4. 4.

Siccæ tussis illas nominat in quibus nihil expuitur, quæ si leniter irritantes in febribus ardentibus acciderint, ob motum in ipsis factum ex locis vicinis aliquis trahitur humor, quo madescunt loca quæ ad asperam arteriam pertinent, adeo, ut hoc nomine minus siticulosi egri fiant, non quòd careant siti, sed quòd non admodum, nec ut febris magnitudo exigit, sitiant.

XXIX.

Οἱ ἐπὶ βυβῶσι πυρετοὶ, πάντες καὶ
πολὺ τῶν ἡμερών.

Febres ex inguinum bubonibus ortæ,
omnes

omnes malæ, præter diarias. § 5. 4.

Ex inguinum tumoribus orta febres, male nam viscera ipsa atque adeo partes principes malè esse affectas significant, utpote quæ supernacua à se repellant in adenas, promptè hæc eadem suscipientes. Excipit ipse diarias, quarum proprium est ut à causa aliqua externa incipiant, & unica die durent quantum est ex ipsarum natura.

XXX.

Πυρετός ἐστιν ἰσθρὸς ἐπιγενόμενος, μὴ ἐκλείπωντος ὁ πυρετῶ, κακόν. μεμνημένον γὰρ ἡ νόσος, καὶ ὕδατος ἐκείνου σημαίνει.

Febricitanti si sudor crebrò accidit febre non deficiente, malum: Prorogatur enim morbus, & multam significat humiditatem. § 6. 4.

Sudor hic malus est, quia præter id quod morbum non solvit, etiam ipsum prorogari ostendit. Causam verò prorogationis multam ait esse humiditatem, quam natura brevi tempore concoquere non potest. Econtrariò, sudor est bonus qui sponte prodians in die iudicatorio morbum solvit, alio quippè die factus verius symptomaticus dicitur quàm criticus.

XXXI.

Ἐπὶ κακῶς ἐχομένῳ ἐπιγενόμενος ῥίγος, λείπει γένεσιν.

Qui ardente febre correptus est à morbo liberatur si rigor successerit. § 8. 4.

Quum febris ardens non fiat nisi à bile in venis putrescente, rigor autem non accidat nisi ubi per sensiles corporis partes bilis veloci motu deferatur, post quem alui solvantur, & sudores & vomitus biliosi superueniunt, rationabile est ut ipsa bile (ex qua febris ardens habuit ortum) expurgata, solvatur febris.

XXXII.

Τριτὴν ἀκριβὲς κρίνται ἐν ἑπτὰ ἀνελ-
δοσι, καὶ μακρότατον.

Tertiana exquisita in septem circui-
tibus quàm tardissimè iudicatur. § 9. 4.

Tertiana febris ab ea quæ ardens nomina-
tur humore faciente, non differt: utraq; enim
à flava bile fit. Differunt autē, quoniam febris
ardens habet in venis unam cum sanguine fla-
vam bilem plurimam ebullientem: Tertiana
verò eandem bilem habet in toto corpore su-
sam. Exquisita dicitur quòd ex sincero sim-
pliciq; humore bilioso procreetur, ut differat à
notha tertiana, quæ non à simplici sed mixto
humore generatur. Quando enim bilis maxi-
ma ex parte pituita miscetur, spuria fit ter-
tiana & notha. Simplex itaq; tertiana exqui-
sita septenos circuitus non excedit: Circuitus

autem

autem dicitur similis ad idem reditus. Quo fit
 ut tertiana febris septima ab initio accessio in
 decimum tertium diem incidit, & saepius in
 ipso morbus iudicatur, non expectato decimo
 quarto die. Sicuti igitur in morbis continuis
 acutorum quidem morborum terminus est
 decimus quartus, peracutorum verò septimus,
 sic in intermittentibus longissima tertiana fe-
 bris terminum habet circuitum septimum.
 Rursus autem sicuti in peracutis, morbus po-
 terat indicari tertio & quarto & quinto die,
 sic & in tertiana eisdem circuitibus fieri solutio
 potest, non expectante natura septimum. Quod
 enim in continuis una dies valet, hoc in in-
 termittentibus accessio.

XXXIII.

Οκείσισιν ἂν ἐν τῷ πυρετῷ τὰ ὥτα κα-
 φῶθῃ, αἵμα ἐκ ρινῶν ρυῖν, ἢ κριλὴ ἐκταρυ-
 χθεῖσιν λύει τὸ νόσημα.

Quibus in febribus aures obsurde-
 rint, iis sanguis è naribus profluens, aut
 alius turbata morbum soluit. 60. 4.

Nihil mirum est si euacuati aut transmu-
 tati noxijs humoribus cessent passionēs, su-
 blati nimirum causis, si tollantur effectus.

XXXIII.

Ποξίσσειν ἢ μὴ ἐν ἀδελωσῇσι ἡμίσσειν
 ἀφ' ὅ πυρετός, ὑπερεκπιάζει εἶθαι.

Febricitantem, nisi diebus imparibus febris reliquerit, reuerti solet. 61. 4.

Nisi febris soluatur bona crisi, per insignem euacuationem humoris noxam iam concocti quo tramite magis conveniat, reliquias morbi superesse argumento est recidiva. Porro concoctionis & euacuationis tempus idoneum solis imparibus assignare diebus supersticiosum arbitror, necnon alienum ab Hippocratis & Galeni doctrina, qui subinde criticos appellat quartum, decimumquartum, vicesimum, trigesimumquartum, quadragesimum. Quare cum pares sint etiam critici, melius legetur: critici, quam imparibus. Vbi maxima fit exacerbatio, ibi fit crisis, quæ ut incipiat ab impari, sepe tamen finitur pari. Quare febris ea recidivæ periculo vacat, quæ non impari, sed critico die soluta est.

XXXV.

Οκτόστις ἐν ἑβδόμῃ πυρετοῖς καὶ ἡμέρησι πέντε γίνονται καὶ ἡμέρησι οἱ πυρετοὶ λυοῦνται.

Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur. 63. 4.

Cum rigores accidunt, bile per omnem corporis habitum mota, cumque singulis accessionibus expurgetur ipsa atque euacuetur, non absque ratione talium febrium intermissio ad infabrica

infabricitationem peruenit, hoc est, quotidie sine febre sunt ipsi agroti: sed resoluta in prima accessione putri humore, remanet vestigium, & putredinis aliquod veluti seminarium, in quo postero vel alio deinceps die sequente rursus putrescit humor, unde noua fit accessio: fietq; dum putridorum in corpore humorum soboles aliqua manebit.

XXXVI.

Οξέοςιστις ἐν ῥῆσι πυρετῶσι ἔλκει ἐπιζῶντων ἀπὸ τῆς ἐκτὸς ἡμερῶν, καὶ ἄλλων.

Quibus in febribus morbus regius ante septimū diem accidit, malū. 62. 4.

Icterus aliquando fit in morborum indicationibus iecore nequaquam malè affecto, quando natura flauam bilem ad vniuersum corpus & ad cutem effundit. aliquando etiam fit hepate malè se habente: nam hepatis vitia, ex quibus icterus solet aduenire, tria sunt, scirrhus, inflammatio, & obstructio. Verum scirrhus quidem diutinus morbus existit: inflammatio verò & obstructio etiam repente fieri possunt: & qui regij morbi ante septimum diem accidunt, hoc habent malū, quòd hepar inflammatione aut obstructione laborare possint. Neque enim icterus ex indicatione tam citò nasci potuit, quòd hac ipsa ante septimum diem fieri non possit.

XIXVIL.

Ὅμοιοιςιν εἰ τοῖσι πυρετοῖσι τῇ ἐβδόμῃ, ἢ τῇ
ἐνάτῃ, ἢ τῇ ἑνδεκάτῃ, ἢ προσκρίσκατο κατὰ
ἐκλήρωσι πύλινον τας, ἀζαδόν, ἢ μὴ τὸ δεξιὸν ὑπε
χόνδριον σκληρὸν ἢ. ἢ ὧ μὴ, σὺν ἀζαδόν.

Quibus in febribus morbus regius septimo, vel nono, vel undecimo, vel quarto decimo successerit, bonum: nisi dextrum hypochondrium durum fuerit: si verò non, non bonum. 64. 4.

Ante septimum diem morbum regium de-
cidere, malum omnino: Post septimum verò,
quia benè potest fieri in die indicatorio, natu-
ra scilicet bilem flauam, vnde procreata est
febris, ad catem indicatoriè reponente, bonum:
nisi dextrum hypochondrium obduruerit, id
est, nisi aliquis malus affectus ex ijs quos an-
tea diximus, hepati acciderit. Non expurgato
enim qui in ipso est sanguine, neque translata
bile ex vena ad meatus bilem excipientes,
siue obstructio fuerit in locis per quæ transer-
tur, siue inflammatio aliqua vel scirrhus, ne-
cessarium est omnino non expurgari sangui-
nem, & vnà cum ipso bilem per totum corpus
deferri: vnde morbus regius generatur.

XIIVIII.

Εν ἑῷ πυρεθῶσι περὶ τὴν κριλὴν καὶ μὲν
ἐχθρὸν καὶ κερδισμὸς, κριλὴν.

In febribus circa ventriculum vehemens æstus, & cordis morsus, malum. 65. 4.

Fortis ventriculi æstus in acutis febribus à flamma bile in ipsius tunicis ebulliente generatur. Rationabiliter autem hi qui ita affecti sunt, & os ventriculi (quod antiqui cardiacum, & eius dolorem cardiacam, sicut eiusdem morsum cardiogmon appellauerunt) mordetur, atq; ob id malus est casus. Si quis verò per cardiogmon, crebrum & velocem cordis motum, & præcipuè similem palpitatiōi intellexerit, extremum ex eo malum significatur, nimirum scilicet vitalem maximo incendio teneri.

XXXIX.

Εἰ γὰρ περὶ τοῖς ὀξείαις οἱ σπασμοὶ καὶ οἱ αἰετὰ ἀπλάγχια πάντοι ἰσχυροὶ, κακόν.

In febribus acutis convulsiones, & circa viscera vehementes dolores malum portendunt. 66. 4.

Febres vehementes veluti ignis nervos exsicantes, eos extendunt atq; convellunt, atq; ita malas afferunt convulsiones, nimirum ex inanitione & siccitate. Nonnūquā verò propter incendiū vehementiam ac siccitatem dolores circa viscera sentiuntur: viscera quidem, renes, pulmones, hepar, lien, cerebrum, habent

venas & arterias, sed quia nervosa non sunt, proprie non dolent, circa ipsa verò dolores fiunt.

X L.

Εν τῶν πυρετῶν οἱ ἐκ τῶν ὕπνων φόβος ἢ παρορμή, κακόν.

In febribus à somno pauciores, vel convulsiones, malum. 67. 4.

Pauciores in febribus à somno, melancholicorum humorum copiam caput per somnum replētum & aggrauantiam significāt: Convulsiones autem pituitosorum humorum multitudinem ostendant. Perro somnus hīc accipiendus est, qui fit in declinatione febris & tempore conuenienti, in quo si noceat cum deberet tum iuuare, malus est.

X L I.

Εν τῶν πυρετῶν ὁ πνῦν παρορμή, κακόν. παρορμή γὰρ σημαίνει.

In febribus spiratio quasi interrupta subsistens, malum: Convulsiones enim significat. 68. 4.

Spiratio subsistens & interrupta convulsionem significat, eamq; ex siccitate ortam, quam quidem acuta febris, muscularis & ner-

nos thoracem mouentes plus iusto exsiccans,
procreant.

X L I I.

Οἱ ἐπὶ τεταρτάνῃ ἀλσκόμενοι ἐπὶ
σπασμῷ ἢ πόνῳ ἀλσκούται. ἢ δὲ ἀλσκού-
ται, ἀπὸ πρῶτον, ὅτε ἐπιγίνεται τεταρτᾶτος,
παύονται.

Qui quartana laborant, conuulsioni-
bus omnino non capiuntur: Si verò an-
tea capiantur, & subindè quartana suc-
cedat, cessant. 70. 5.

Quæ quidem fit ex euacuatione conuulsio
acutissima est & perniciosissima. Quæ verò
ex repletione partium nervosarum, qualis in
morbo comitiali fit, neq; acutissima neq; simi-
liter periculosa est. Hanc itaq; conuulsionem
quartana non solum prohibet fieri, verum si
prius facta est soluit. Fit autem ab humoribus
lentis ac pituitosis, qui partibus nervosis in-
serti sunt. Cum verò horum humorum du-
plex sanatio sit, excretio scilicet, & coctio;
vtrinq; quartana habet, excretionem quidem
ex rigore (hæc enim sola agitatio sufficiens est
crassum externere humorem) coctionem au-
tem caloris febrilis ratione, qui rigorem con-
sequitur.

X L I I I.

Οκίσσονται δὲ ἐμῶν ἀφελάντων καρφάλα

καὶ σκληρὰ, αἰδὺ ἰδρώτων τελυτῶσιν. ὁκόσονται δὲ χαλαρὰ ἔδραναι, σὺν ἰδρῶτι τελυτῶσιν.

Quibus cutis obtepiditur arida & sicca, sine sudore moriuntur: Quibus verò laxa & rara, cum sudore intereunt. 7. 1. 5.

Morituri, qui quidem squalidas, duras, & siccas habent cutes, & extensas, sine sudore moriuntur, quòd scilicet ob febris vehementiam humiditas omnis exhausta sit: Quibus contrà laxa & rara est cutis, cum sudore moriuntur, quòd videlicet cuti illi insit adhuc aliqua humiditas, quæ iam propter extremam retentrici facultati imbecillitatem exit.

X L I I I I.

Κόσσειν ἂν ἐν τοῖσι καύσεισι τρέμει ζώνται, πυρεχθὴν δόξ.

Quibus in ardentibus febribus tremores fiunt, iis delirium succedit. 26. 6.

Quæ febrem ardentem efficiunt, causa in venoso genere existentes, quando ad nervos transferuntur, primum tremores faciunt, com-patiente verò principio etiam deliria: quæ non tantùm non liberant hominem, sed ei etiam plus periculi creant.

X L V.

Εἰ τοῖσι ὅξισι πάθῃσι τοῖσι μὲν πυρετῶσι, πλεονθμῶδεις ἀκαπνοαὶ, κακαί.

In acutis morbis qui cum febre affligunt, luctuosæ spirationes malum significant. § 4. 6.

Spirationes luctuosæ quæ in medio sui interruptuntur, & luctui similes existunt in passionibus acutis, musculorum & nervorum præ se ferunt duritiem, vel viriam imbecillitatem, vel dolorificum aut convulsorium aliquem affectum.

I L V I.

Ἐν τῶν ὀξείων νοσήμασι ψύξις ἀκρωτηρίων, κακόν.

In morbis acutis frigiditas partium extremarum, malum est. 1. 7.

Partium extremarum frigiditas in acutis morbis absq; causa manifesta, significat vehementissimam cuiusdam visceris, ut iecoris, aut ventriculi inflammationem, cuius calor instar cucurbitulae sanguinem ad se trahit, unde extrema partes frigescunt sanguine destitute.

X L V I I.

Ἐν ἰδρωὶ φόβος, ἔχθρο.

Post sudorem horror minimè bonum significat. 4. 7.

Quòd indicatoria, quæ non indicant nec solvunt

soluunt morbos, partim mortalia, partim male indicantia sint, ab ipso dictum est, quoniam natura in huiusmodi dispositionibus morbo succumbit. Horror igitur qui sudori succedit, et pote vniversis noxijs per sudorem non expulsis, sed iuxta sensiles partes hærentibus, malam indicationem significat.

Ἡ πυρετός μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχον βαλὼν πολὺ καὶ θερμὸν καταχρησάμενος καὶ τὸ κεφαλῆς, λύσις ἔσται πυρετοῦ γίνεται.

Si febris non ex bile fit, multa aqua calida capiti superfusa febrem tollit. 42. 7.

Ex balneo aquæ calidæ sentiunt utilitatem febres quæ non ex humore sunt, sed ab alijs causis, ut à lassitudine, exustione, frigore, obstructione meatum: respirat enim & dissoluitur per ipsos humido tepenti repletos febrilis calor, ac ita corporis habitus sape refrigeratur. Diarijs igitur & hecticis utiles sunt balneæ, ijs autem quas humorum putredo vel inflammatio aliqua excitavit, non conveniunt, nisi prius concoctim aut euacuatis humoribus. Verum cum à pituita putrescente fiat etiam febris putrida, hic videbitur Aphorismus non esse verus, qui bilis tantum meminit, nisi qui existimaverit pituita putrefactionem in alteram bilem converteri.



HIPPOCRATIS

APHORISMORVM

PARS SE-

XTA,

In qua exponuntur ij qui extremis locis affectis conuenientes, ad Chirurgiam maximè attinent.

I.



Κόσται δὲ ἀνταρμύνας ἐν τῇ νέσῳ, ἢ ποτὶς, ἐνταῦθα αἱ δόσεις γίνονται.

Quibus conualescentibus à morbis pars aliqua laborauerit, illic abscessus fiunt. 32. 14.

II.

Ἀρὰ ἐν καὶ ἀναπνοῆς ἢ ἡ ἀπὸ τῆς νόσου, ἐνταῦθα ἐπιζῇ ἡ νόσος.

Quin & si priusquam aliquis aegrotet, pars quædam doluerit, aut labore fatigata fuerit, in ea morbus firmatur. 33. 4.

Si cui ex morbo reualescenti aut ante-

quàm agrotet pars aliqua corporis doleat, aut labore lassata sit, in eam morbus decumbit, hoc est, in ea futurus est abscessus per quem morbus ipse iudicabitur, labore quidem rationem causæ obtinente, dolore verò signi. Dolor enim signum est abscessus qui fit, validitas autem atq; imbecillitas ad locum affectum prouehit superfluitates. Nam ubi aliqua pars affectus cuiuspiam occasione imbecillior est reddita, ex omnibus in illam confluere quæ supernacua sunt, est necesse, quæ tandem per abscessum expurgantur, nisi fortè per aliam viam deriuata, natura eduxerit, antequàm firmetur abscessus.

III.

Κόποι αὐτῶνται φερέσαι νόσους.

Lassitudines sponte natæ morbos prænunciant. §. 2.

Non hîc lassitudinum meminit quæ ex motionibus & laboribus fiunt, sed earum quæ sponte, hoc est, sine vîlo motu corporis & animi natæ continent. hæ morbos prænuntiant, nimirum febres &c. in toto sentiantur corpore, vel morbos partiem in quibus consistant illæ lassitudines: Quippè ex ipsis morbi causa adesse significatur. Sunt autem vtriusq; lassitudinis tres species, Prima quæ vlcernum,

Secundum

Secunda quæ tentionis, Tertia quæ inflammationis sensum habet: Prima quidem ex vitiatione humoribus ortum habet, Secunda ex plenitudine, Tertia ex utrisq; simul coniunctis: De quibus amplissimè alijs in libro disputatum est, ut hîc non sit opus repetitione.

I I I I.

Περὶ τὰς πυρετοῦς ὁ πῦρ οἱ πόνοι καὶ οἱ πυρετοὶ συμφορεύουσιν ἑαυτοῖς ἢ χωριστῶς.

Dum pus conficitur, dolores accidunt magis quàm iam confecto. 47. 2.

Dum pus conficitur, dolores ac febres accidunt ex quadam veluti ebullitione atq; exustione sanguinis, in extenta simul ac calefacta præter naturam inflammata particula, quæ ubi ex toto exustus fuerit, residuum eius sit pus, quemadmodum ex lignorum exustione cinis: atq; idè tempore illo dolores sedantur ac febres præsertim cùm pus fuerit excretum, utpote iam consumpta quidem materia, extincta autem ignea caliditate.

V.

Ἐν πᾶσι κινήσει ὁ ἀλγος, ἐνέται ἀρχῆται πόνου, τὸ διακινῶν δὲ δὺς, ἀνοπον.

In omni corporis motu quum fatigari cœperit, quies confestim lassitudinis est remedium. 48. 2.

Vt alia omnia suis contrarijs sanantur, sic etiam fatigatio, quam ex valido motu contraximus, quiete. Nam, ut est apud Poëtam,

Hæc reparat vires, fessaq; membra lenat.

VI.

Ελκισι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνῶδες, διερμα
πρὸς κληρώς, ὁ δὲ μὲν ἀντικύβητον ποιεῖ, μὴ
σπῆς, εἴτε αὖτε πυρετὰ δια, σπασμῶς, καὶ τῆς πάντος.

Ulcerebus frigidū mordax, cutem ob-
durat, dolorem insuppurabilem facit,
denigrat: rigores febriles, convulsiones
& distentiones creat.

Frigida aqua mordax est, non cum in cu-
tem simpliciter incidit, sed cum in ulceratam
nam integram cutem mordicare non potest,
cum ipsa sit densior quàm ut eius substan-
tiam peruadere queat, quam etiam durio-
rem reddit, ipsam contrahens ac densans.
Ad hoc dolorem efficit insuppurabilem, re-
frigerando natium calorem qui ulcera ad
suppurationem perducit, & ea diffusi prohi-
bet quæ dolorem efficiunt: linores inducia, re-
frigerata cute: rigores, demorsis videlicet
partibus nervosis à frigido.

VII.

Οξύα καὶ ψυχρά, ἐν θερμασίᾳ δὲ
πάλιν ὀξύα αἰμορραγία, ἢ μίαν.

Quæ

Quæ refrigerata sunt, ea excalfacere oportet, exceptis iis unde fluit sanguis copiosus, aut profluxurus est. 19. 5.

Refrigerata partes ab immodico frigida usu ad suum temperamentum reducuntur per calidi contrarij appositionem, nisi cum fluit sanguis: nam tum intemperie frigida poshabita sanguinis eruptioni succurrendum, à qua maius agrotanti periculum imminet. Relictis itaq; calfacientibus frigidis & astringentibus utendum ad copiosum sanguinis profluvium reprimendum. Quinto tamen Methodi, adhibetur cauterium calidum ad partem unde sanguis plus aquo defluit: dicendum quòd cauterium non quatenus calidum sistit sanguinem, sed quia vasis os occludit vrendo.

ὅτις ἡνὶ οὐκ ἔστιν. VIII.

Τὸ θερμὸν ἐκφυεῖν οὐκ ἐπὶ παντὶ ἔχει, μέγιστον σημεῖον ἐστὶ ἀτραξιὸν, θερμὰ μέλας σφί, ἰσχυρὰ, αἰσθησιμὰ, ῥιγίαν, ἀσπασμὸν, πέναν παρηγεμένον. πλεὺς δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ κατὰ τὴν ἀκρότητα. πολλοὶ δὲ ἀσπασμὸν ὄντων κατὰ γράσας, μέλας δὲ εἶσι ἐφελαινοῖσι. ταύτων δὲ μέλας εἶσι ἐν κεφαλῇ ἰλκία ἔχουσι, καὶ ὁκόσας ὑπὸ ψύξει. ὁ θύσας δὲ ἰλκίαται. ἔξω πασι ἐφελαινοῖσι, ἰσχυρὰ, αἰσθησιμὰ, ῥιγίαν, πέναν, πέναν δὲ θερμὸν φίλον καὶ κρύον. καὶ δὲ ψυχρὸν πέναν καὶ κρύον.

ἡνὶ οὐκ ἔστιν

Calida ubi suppurationem facit, non tamen in omni ulcere, maximum securitatis indicium existit, cutem emollit, extenuat, dolorem lenit, rigores, convulsiones, & distentiones mitigat: Gravitatem capitis solvit, plurimum confert ossium fracturis, sed iis præcipuè quæ denudatæ sunt: præterea iis maxime quæ in capite ulcera habent, & iis quæ à frigore moriuntur aut ulcerantur, & herpetibus exedentibus, sedi, pudendis, utero, vesicæ, his calidum amicum & iudicans: frigidum inimicum & perimens. 22. §.

Quemadmodum frigidum convulsiones & Tetanos facere aptum, sanat tamen aliquando sic & calidum quamquam ad suppurationem efficax, eam tamen aliquando fieri prohibet. Siquidem ulcera putrida, & ea quæ fluxiones habent, tantum abest ut aqua calida factu promoveantur ad suppurationem, ut etiâ eo peiora reddantur. Similiter & quacunque ulcera sunt putredini obnoxia, & quæ partes circumstantes exesas habent, & quæ difficulter ad cicatricem perducuntur, vix universa minime suppurantur, & quacunq; ex malis ulceribus proprijs insignantur nominibus, veluti quæ cancroso, chironia, telephia, phagedenica, id est, carnem comedentia: hæc omnia non suppurantur.

rantur : nec ea quæ conuulsionem afferunt. Contra verò si calidum prodest & ad suppurationem ducit, maximum est ulceri signum ad securitatem : Nihil enim malè potest aduenire ulceri pus generanti. Cognosces autem calidum prodesse aut obesse ulceribus, ex eo quòd illa suppurentur à calidi usu, hæc insuppurabilia perdarent. Deinceps calidi usum multiplicem commemorat : etenim cutem induratum molliat, & crassatam extenuat, dolorem sedat, conuulsiones ac Tetanos mitigat, dolorem suppurabilem efficit, calorem nostrum nativum, cui est amicus, adaugens, cum quo nonnulla concoquens & ad melius alterans, quædam verò discutiens atq; euacuans, si non ex toto sanat, certè doloris partem retundit : & ex his quæ in capite sunt malis granitatem soluit, concoquens atq; dissoluens quæcumq; à crassa & vaporosa materia in caput tracta molestant : fracturis ossium valissimum, usq; præcipuè quæ carne sunt exuta, adhuc autem magis usq; quæ in capite sunt, nam usq; ut cerebro frigidum est vehementer inimicum, atq; ideo calidum amicum : Et quæcumq; à frigida lesa sunt, usq; remedium est calidum. Item herpetibus, sedi, pudendis, & similibus confert calidum : frigidum autem nocet.

I X

Εἰ τι τῶν αὐτῶν δὲ δὴ τῶν ψυχρῶν ἔχουσιν, ὡς

κόθεν αἰμορραγίῃς ἢ μέλαις, μὴ ἐπὶ αὐτὰ, ἀλλὰ
 ἐπὶ αὐτὰ ὀκόθεν ἐπὶ ῥέει. καὶ ὀκόποι φλεγμοναί
 ἢ ἐπιφλογισμοὶ εἰς τὸ ἰσχυρὸν καὶ ὕψιστον ῥέ-
 πονται, κατὰ ἀλλοτρίαν ἐπὶ ταῦτα. ἐπὶ τῷ πα-
 λαιῷ μελαίνῃ καὶ εὐρυπύλῃς τὸ μὴ ἐλαττωρὸν
 ὠφελεῖ· ἐπὶ τῷ ἐλαττωρὸν βλάπτει.

In his frigida vti oportet vnde sanguis
 copiosè profluit, aut profluxurus est,
 non tamen suprâ ipsas partes vnde pro-
 fluit, sed iuxta eas adhibita. Quinetiam
 vbi inflammationes aut velut incendia
 quædam ad rubrum & suberuentum ten-
 dentia, recenti sanguine sunt, iis frigi-
 dum adiouere conuenit: quippe vete-
 ribus inflammationibus nigrorem in-
 ducit. Erysipelas quoque non vlcera-
 rum curat, vlcera-
 rum verò lædit. 23. 5.

Quibus intempestinè aut immodicè fluit
 sanguis aut fluxurus est, frigida confert, non
 ipsis partibus fundētibus sanguinem admota,
 (vltceribus enim frigidam mordax) sed cir-
 cumsistentibus, illis præcipuè vnde aliquid ad
 vlcera profluit. frigida enim constringit, san-
 guinemq; crassiorē, adeoq; ad profluendum
 minus idoneum reddit. Inflammatae etiam
 partes & velut à flamma quædam densas
 frigida inuat, propter humorum à quibus
 sunt caliditatem: sed habenda ratio est totius
 corporis,

corporu, ut non nisi euacuato eo (si euacuatio-
ne indigeat) adhibeatur. Adde frigidam non
debere adhiberi ubi metus est, ne ad principes
corporis partes noxios humores propellat. Suo
itaq; tempore adhibita frigida recentibus in-
flammationibus auxilio est, nam & calo-
rem temperat & fluxionem repellit: Veteribus
autem liuorem inducit & nigredinem, quod
à crasso fiant sanguine, quem adhuc crassio-
rem frigida efficit, & in grumos conuertit,
quos nigredo comitatur. Eodem modo & ery-
sipelas non vlceratum iuuatur à frigida, quip-
pe feruorem sanguinis & bilis acrimoniam è
quibus procreatur erysipelas (quod ignem sa-
crum nominant) extinguit. Vlcerato verò
erysipelati mordax est frigida & dolorem in-
fert, & hac ratione nocet, quia partes dolentes
ad se semper alliciunt ipsas fluxiones.

Τὰ δὲ ἐκ ἀρθροῦν αἰδμήματα καὶ ἀλγύ-
ματα ἀπὲρ ἰατρίας, καὶ ποδαγρίαι, καὶ σπασμοί,
καὶ τῶν τοῦ σώματος π. πυρρῶν πυρρῶν καὶ ταχέ-
ως ἐκείναι τε καὶ ἰσχυρῶς, καὶ ὁδῶν ἀπὸ Νάρ-
κης καὶ μελέων ὁδῶν καὶ ἀλγύων.

Tumores articulorum & dolores si-
ne vlcere, podagricos quoq; dolores &
conuulsiones, horum quidem plurima
frigida aqua superfusa copiosè, leuat,
dolo

doloremq; minuit ac soluit: Stupor enim mediocris dolorem leuat. 25. 5.

Quæcunq; inflammationes vel tumores ardentes absq; ulcere ad rubrum & floridum recenti sanguine tendunt, à frigida aut aqua sanari, quæ influxum cohibet, & hac ratione dolorem in talibus soluit, quia & eius causam abscindit. Et refrigeratio etiam largior partium affert torporem mediuem, qui & ipse dolorem soluit, vt remedium narcoticum, sensum hebetando.

X I.

Υδωρ τὸ ταχέως θερμαίνεται καὶ ταχέως ψυχάζεται, καὶ ὁπότερ.

Aqua quæ citò calefcit, & citò frige-
fcit, leuiffima. 26. 5.

Aquam non pondere leuem dūdicat, re-
tūm quæ tenuium partium exiftens facile al-
teratur, citò calefcit & citò refrigeratur, in gu-
stu ac odoratu nullam exoticam referens qua-
litatem, non turbida, non carnofa, fed reluti
exquifitè colata, fruftillorumq; inuatantium
expers. Talis concoctus & diftributus facili
ventrem non grauat, fed celeriter permeat.
Sicuti enim cibi lani est facillimè poffe alte-
rari, ita & aqua: fiquidem facile transmuta-
ri volumus quicquid probè concoqui debeat.

ab instrumentis quibus est coctionis munus
demandatum à natura.

XII.

Ην τραυμάτων ἰχυρῶν ἰόντων καὶ ποτηρῶν
οὐδ' ἡμεῖς μὴ φαίνεται, μέγα κακόν.

Si in vulneribus prauis & magnis tu-
mores non apparent, ingens est ma-
lum. 66. §.

In vulneribus effatu dignam magnitudi-
nem habentibus, si tumor non apparet, ma-
lum est, quia suspicio est humorem noxium
ad partes principes transmitti, qui ad vulne-
ra ipsa confluere deberet propter dolorem ibi
existentem, quippè dolor attrahit, & fluxio-
nes concitat. Hinc intelligitur quòd deiecta
natura vincitur.

XIII.

Τὰ χαῖνα χρηστὰ, τὰ ἱνα μὴ κακὰ.

Molles tumores, boni : crudi verò,
mali. 67. §.

Molles tumores significant materiam mi-
nimè rebellem : duri verò & qui digitis non
cedunt, significant materiam crudam, cras-
sam, valenter impactam. Non enim fieri po-
test ut sit tumor renitens, benè concoquente
membri natura humores ad ipsum confluentes.

XIIII.

Τὰ ἀειμάδης ἐλκιά, κακὴθία.

Vulnera undique glabra, maligna sunt. 4. 6.

Quum videris pilos à circumiacentibus ulceri locis defluentes, vel eutem squamulas à summa parte dimittere, scito quos qui ita se habent, praeos humores ad partem confluere, qui vlcus erodunt, & pilorum radices depascuntur, nec permittunt ulceratum locum ad cicatricem pervenire.

XV.

Τὰ πλάτια ἐξανθήματα ἢ πάντῃ κεκεκώδια.

Pustulae latae non valde pruriunt. 9. 6.

Lata pustula non admodum pruriunt ob duplicem causam: diffiantur enim in latitudinem extensa, & facientem ipsas humorem minus acrem habent.

XVI.

Κόσις Ἀλκισπίνῃ, ἢ ἰγυόφαλον, ἢ καρδίνῃ, ἢ φρενῇ, ἢ τῶν ἐντέρων ἢ τῶν λεπτῶν, ἢ χροῖνῃ, ἢ ἡπαρ, θανατῶδες.

Profundum vesicae vulnus, cerebri, cordis, praecordiorum, intestinorum tenuium, ventriculi, iecoris, lethale. 18. 6.

Vesica

Vesica profundius vulnerata, lethale est signum: nam vulnus quod ad eam interiora progreditur, coalescere non potest: est enim vesica nervosa, tenuis, & exanguis: collum autem eius, quia carnosum est, videmus quotidie sanari quando lapis extrahitur. Porro quod vulneratum cerebrum, & cor, mortem affert inevitabilem, unum ex iis est quae in confesso habentur. Siquidem in corde ac septe transverso, ob ingrem motum, vulnus coalescere non potest. Tenuium autem intestinorum natura, & ventriculi, non parum habet carnosae substantiae, & ideo ipsa in summa parte vulnerata saepe agglutinantur, discissa vero usque ad eorum cavitatem, rarissime. Hepatis vulnera multo sanguine madent, itaque primo ita vulnerati moriuntur, quam vulnera agglutinari possint: de eorumque sita non potest.

DE VULNERIBUS, XVII. AB ANTONIO GALIENO.

Επὶ τῇ διακοπῇ ὁσίων, ἢ χόνδρος, ἢ νεύρου, ἢ γνάθου, ἢ λεπτῆς, ἢ ἀρεγροδίνης, οὔτε αὐξάνει, οὔτε ἐμφύεται.

Quum discissem fuerit os, aut cartilago, vel nervus, vel genae particula tenuis, vel præputium, neque augetur neque coalescit. 19. 6.

Os, vel alia quævis pars spermatica, nisi admodum parvis non glutinatur primo & per se.

se, sed interuentu alterius, nam à medulla efficitur callus, quo confirmantur partes ossis effracti: Sic nec cutis vnquam regeneratur, licet aliquid regenerari possit loco cutis: causa, quia omnes partes spermaticæ sunt exanguæ & frigide, & parum habentes alimenti.

XVIII.

Εντέριον ἢ Διχρηστῇ τῶν λιπῶν ἔστι, ὃ ξυμφύεται.

Si quod intestinorum gracilium discindatur, non coalescit. 24. 6.

Eadem sententia paulo antè exposita est.

XIX.

Ερυσίπτελος ἔξωθεν μὲν εἶναι τρέπεται, σὺν ἀγαθόν. ἔσωθεν δὲ ἔξω, ἀγαθόν.

Erysipelas ab exterioribus verti ad interiora non est bonum, ab interioribus autem ad exteriora, bonum. 25. 6.

Non solum erysipelas, sed aliud quodcumque malum quod ex profundis & principibus partibus transfertur ad cutem, bonum esse signum & causam existimare debemus. Si vero contra ad interiora & profunda transmutetur, malum: nam quicquid est illorum humorum à quibus erysipelas nascitur, ad partes principes protruditur, unde praesens vitæ periculum imminet.

XX.

X I.

Εὐνῆχοι ἔ ποδαγελῶσιν, ἔδὲ φαλακροὶ γίνονται.

Eunuchi neq; podagra laborant, neq; calui efficiuntur. 28. 6.

Eunuchi, præsertim Hippocratis tempore, podagra non laborabant, quod cum regimini in seruirent, ocio prorsus non uterentur, nec coitu nervosas partes debilitante, & quod moderata victus ratione contenti viverent. Item calui non fiebant, mulieribus enim similes multam humiditatem redundantem obtinent ad capillos assidue fluentem, unde ipsi capilli augentur & nutriuntur.

X I I.

Γυνὴ ἔ ποδαγελᾷ, ἢ μὴ τὰ κατὰ μῆνα αὐτῇ ἐκλάσῃ.

Mulier podagra non laborat, nisi menstrua defecerint. 29. 6.

Obretentos menses, mulieres podagra laborabant, & nulla alia de causa, quia moderata victus ratione utentes sobriè vivebant, & mediocriter exercebantur.

X I I I.

Παῖς ἔ ποδαγελᾷ, ἔδὲ τὸ ἐφ' ἑαυτὸν ἀφροδισιασμενῶ.

Puer podagra non laborat ante usum venereorum. 30. 6.

Quòd magnam vim habeat ad generationem podagrae venererorum usus, liquet eunuchorum exemplo & puerosum.

X X I I I.

Οκόσοι φαλακροί, τέλεισι κροτοί μεγάλοι ἐγίνοι. ὁκόσοις δ' αὖ φαλακροῖσι ἔσσι κροτοὶ ἐπιγίνων, πάλιν ἔτι γίνοιθ' ὁμοίως.

Qui capillorum defluvio laborant, iis varices magnæ non fiunt, quibus verò capillorum defluvio laborantibus varices supervenerint, iis capilli denuò nascuntur. 34. 6.

Calui, & ante tempus depilati ob malum aliquod, veluti propter alopeciam aut ophiassim, iis varices non fiunt, quòd tum vitiosi humores ad caput & non ad crura ferantur. Quibus verò caluis & capillorum defluvio laborantibus varices superveniunt, iis rursus capillati fiunt, nam vitiosi humores, qui antea radices capillorum corruperant, ad crura transferuntur.

X X I I I I.

Οκόσοις κρυπτοῖς καρκίνοι γίνονται, μὴ διερχομένῃ βίβλῳ. διερχομένοι δὲ ἀπόκωπται τέχνης, καὶ διερχομένοι δὲ ἀπὸ κωπῆς ἀποπελοῦσι.

Cancros occultos habentes, melius est

non

non curare: curati enim citò pereunt, nò curati longius tempus perdurant. 38. 6.

Cancros minimè apparentes, sed in profundo corporis existentes melius est non curare, siue medicamentis, siue sectione, siue vtilione, quòd ita magis irriterentur, ac agri citius intereant: placandi igitur ac mitigandi potius medicamentis dolorem sedantibus sanientq; eluentibus.

XIV.

Οκίστοις ἂν πύον ἔῃ ἐν τῇ στήθει μὴ
ἀλγεσμαινῇ, τέττοις ἂν παχύτητι τῷ πύονι,
ἢ τῷ τόπῳ ἐκ δάστημαίῃ.

Quibus suppuratio aliqua in corpore abdita non innotescit, iis propter crassitudinē vel puris vel loci, delitescit. 41. 6.

Sipus crassum fuerit in profundo latens, nunquàm ad circumferentiam mouetur, nec tumorem excitat, qui nos puris illic existentis commonescere queat. Sic quoq; cutis ipsa, sub qua pus coacernatur, si crassior & densior fuerit, qualis est in calcaneo, in tumorem attolli non potest, ideoq; nos latet, quantum alijs signis ipsum deprehendere liceat, nimirum dolore & febre.

XVI.

Ἐλκία ὁκίσται ἐν αὐτοῖς γίνεται, ἢ μέχρι τέ-
του

ροι χροῖον ἴχυσιν, ἀνάγκη ὅστιον ἀφίστασθαι,
καὶ τὰς οὐλὰς καὶ τὰς γίνεσθαι.

Quæcunq; ulcera annua sunt, aut longiore tempore durant, in iis os abscedere, & cicatrices canas fieri est necesse. 45. 6.

In ulceribus malignis, cuiusmodi sunt phagedæna, quæ longum tempus durant, medicis etiam in curatione nihil delinquentibus, necesse est ut non tantum caro ipsa, verum etiam os quod carni subiectum est, corrumpatur & abscedat, necnon ut cicatrices cana fiant propter os deperditum: nam ipsum corruptum regni non potest.

XXVII.

Οὐδὲν ποδῶν νόσος καὶ κατὰ τὴν ποδὸν γίνεσθαι, ταῦτα δὲ φλεγμῶνται ἐν πενταετησίᾳ ἡμῶν, δὲ καὶ γίνεσθαι.

Podagrici morbi intra quadraginta dies, sedata inflammatione, finiunt. 49. 6.

Si medicus omnia rectè administraverit, & ager in nullo deliquerit, intra quadragimum diem solvitur inflammatio podagrica. Nam in quadragesimo die indicantur morbi quicunq; neque iam sunt diuturni exquisiti, neq; acutorum numero planè exciderunt.

XXVIII.

XXVIII.

Τὰ ποδαγρικὰ ἔχεις καὶ ἔχεις πύον καὶ
ἔστιν ὡς ἐπὶ τὸ πάλιν.

Podagrici morbi Vere & Autumno
magna ex parte mouentur. § 5. 6.

Vere quidem mouentur non ratione Veris,
quod saluberrimum existit, sed cum per Hyemem
antecedentem multi collecti sint humores,
quos Veris calore funduntur, ac in partes im-
becillas protruduntur, unde morbi fiunt arti-
culares. Mouentur & in Autumno, ob Au-
tumni videlicet inaequalitatem, qua horum
aliorumque multorum morborum causa esse so-
let, praesertim cum Aestate precedente, &
ipso Autumno, vitiosi humores ex esu crudo-
rum fructuum coacervati, hos morbos excitare
possint, ad imbecilliores partes delapsi.

XXIX.

Οὐλοῦσιν ὑπὸ ἰχιάδος ὑποχλαμύνοισι χει-
νὴς ἐξίσταται ἡ ἰχίος, καὶ πάλιν ἐμπύει, ταῖσι
σι μύζαν ἐπιγίνονται.

Quibus à coxendice infestatis diutur-
na cora exit, & rursus illabitur, his mu-
cores in ea parte nascuntur. § 9. 6.

Sæpe in articulis humor pituitosus acerva-
tur,

tur, quem mucorem appellat, à quo madefacta articulationis ligamenta, laxiora redduntur, atq; ideo faciliè à cavitate articulus excidit, & rursus faciliè recidit : quæ nunc ait accidere hijs qui ita morbo laborant coxendicum.

XXX.

Οκόσοισιν ὑπὸ ἰχιάδος ἰσχυρέμενοι χει-
ρὴς, τὸ ἰχίον ἰξίσαται, τετίοισι τέκεται τὸ
σκέλον, καὶ χαλᾷται, ἢ μὴ καυθῶσι.

Quibuscunque à dolore coxendicum molestatis diuturno, excidit coxa, iis crus tabescit, & claudicant si non vrantur. 60. 6.

Quibus à coxendicum dolore molestatis excidit coxa coxaq; articulus, ratione humerum qui illuc decurrerunt, hijs crus tabescit, & atrophia laborat. Mucoris enim copia obstru-
ctionē parit, atq; adeò impedit ne nutrimentum illuc deferatur : & claudicant si candentibus ferramentis non vrantur circa vertebra. Nam visio mucorem in pixide collectum ac illapsum absument & exsiccat, ligamentaq; solidiora efficit, & in habitum naturalem reducit.

XXXI.

Ἐπὶ ὅτῳ ἰστίονι σπέρξ πικρὸν, κακόν.

In osse ægrotante caro liuida morbum significat. 2. 7.

Non enim in mediocribus ossium læsionibus, sed fortibus putrilaginibus talis species coloris circumstantibus carnibus aduenit, extincto scilicet in eis nativo calore.

XXXII.

Ἐπὶ ὀστέῳ ψιλώσι ἐρυσιπέλας.

Ab ossis denudatione erysipelas, malum. 19. 7.

Osse nudato carnem circumstantem videri ab erysipellate apprehensam, malum: significat enim sanguinem calidiorem flauamq; bilem confluere, quæ partes adiacentes sua acrimonia exedit & absumit.

XXXIII.

Ἐπὶ ἐρυσιπέλακι σηπιδὺν, ἢ ἐκπύησις, κακόν.

Ab erysipellate putredo aut suppuratio, malum. 20. 7.

Tale siquidem erysipelas significat, quod non tantum in superficie existentes corporis partes exulcerat, sed & profundiores depascitur, atq; adedò vlcus putridum efficit, quod undiq; ad sanas partes pascendo serpit.

XXXIII.

Επὶ ἰσχυρῷ σφυσμῷ ἐν τῷσιν ἱλκίαισιν αἱ-
μαρρᾶγίη, κακόν.

A vehementi in ulceribus pulsu, co-
piosa sanguinis fit eruptio. 21. 7.

Membrum inflammatis, & loci angustatio,
& dispositio dolorifica, tristem afferunt la-
borantibus sensum ex motu arteriarum, quem
natura (cupiens id quod alienum est, excerne-
re) magnum & violentum efficit, atq; ita à
violentia sanguis erumpit.

XXXV.

Επὶ ὅττις διακρητῇ παραφροσύνη, ἢ κριότ
λάβη.

In ossis capitis præcisione, si vacuum
excipiat, delirium fit. 24. 7.

Osse quod in capite est præciso usq; ad inte-
riorem superficiem, quam vacuum excipit lo-
cus qui cerebrum continet, desipientia fit. Nam
iam passio proxima existit membranæ & ce-
rebro, hoc est, quod ipse dicit, si vacuum
excipiat.

XXXVI.

Επὶ σφακλισμῷ, ἀπόσπαισις ὁρίον.

A corruptione, ossis abscissus succe-
dit. 77. 7.

Verum verò ad ossis an ad carnem circum-
stantis corruptionem sequatur ipsius ossis ab-
scissus,

scēssus, non manifestauit. Vtrūq; autem potest esse verum.

Duorum sequentium vsus longè lateōs
per omnes aphorismos dis-
fundient.

XXXVII.

Τοῖσι μὴ καὶ λόγον κυφίζουσιν ἢ δὲ πινύσκειν
ἢ δὲ φοβεῖσθαι λίην τὰ μεχθηρὰ γενόμενα πα-
ραλόγως. τὰ γὰρ πολλὰ τῶν τριπτῶν ἐστὶν ἀσέ-
βεια, ἢ ἢ πίνονται διαμένειν ἢ δὲ χροίζειν
εἶναι.

His quæ non ex ratione leuant, confi-
dere non oportet, neq; admodum formi-
dare mala quæ præter rationem eue-
niunt. Plurima enim horum instabilia &
infirma sunt, nec perseverare aut diutius
durare consueverunt. 27. 2.

Cū morbus vehemens subitò cessat &
remittitur, idq; neq; per sudorem aut vom-
itum, neq; per alui deiectionem aut profluvium
sanguinis, corpore euacuato, ac nec apparente
quidem ullo coctionis signo, existimat talem
morbi remissionem infidam esse; & minimè
securam, utpote quæ deterius quiddam in po-
sterum comminetur. Mala verò quæ in morbis
præter rationem accidunt, ut spirandi difficul-
tas, delirium, rigor, febris, non admodum for-
midanda sunt, nam hæc quoq; stabilia non
sunt, tantumq; abest ut malum aliquod signi-
ficent,

ficient, ut etiam futuram brevi tempore morbi indicationem ostendant, praesertim ubi primi signa coctionis apparuerint.

XXXVIII.

Πάντα καὶ λόγοι ποίουν, καὶ μὴ γινώσκουσιν
πάντες καὶ λόγοι, μὴ μεταβάλλειν ἐφ' ἑπερομένον-
τος ὁ δόξαντες ἐξ ἀρχῆς.

Omnia secundum rationem facienti
si non succedat secundum rationem, non
est ad aliud transeundum, dum manet
quod à principio visum est. § 2. 2.

Non est mediocris prudentiae, non discedere
ab iis quae recta visa sunt, & si nondum ma-
nifesta appareat utilitas ex iis ita factis con-
sequi. Quemadmodum enim gutta subiectam
petram percutiente, vix longo tempore sensi-
bilis passio deprehenditur in lapide, sic acci-
dit etiam in crudis, & quae difficulter conco-
qui possunt dispositionibus: in quibus cum
recta ratio id quod conducit secundum omnes
indicationes, prout earum unaquaeque suadet,
inuenerit, non discedit ab illo quod primum
faciendum esse putauit, etiam si nihil ex illius
usu sit effectum: modo non aliud interueniat
symptoma, quod à priore instituto recedere nec
cogat. Rationabiliter enim his utimur reme-
diis, quae ipsa suggerunt indicationes.

Finis Aphorism. Hippocratis.

HIPP.



HIPPOCRATIS

COI IVSIV-

RANDVM,

*

A Pollinem medicum, & Aesculapium, Hygeamq; ac Panaceam iuro, deosque omnes, itemq; deas testes facio, me hoc iusiurandum, & hanc contestationem conscriptam, pro viribus & iudicio meo integrè servaturum esse. Præceptorem sanè, qui me hanc edocuit artem, loco parentum habiturum, vitam communicaturum, eaq; quibus opus habuerit impertiturum: Eos item, qui ex eo nati sunt, pro fratribus masculis iudicaturum, artemq; hanc si discere voluerint, absq; mercede & pacto edocturum: Præceptionum ac auditionum, reliquaq; totius

tius disciplinæ participes factu-
 rum tum meos, tum præceptoris
 mei filios, imo & discipulos qui
 mihi scripto cauerint, & medico
 iureiurando addicti fuerint: alium
 verò præter hos nullum. Cæte-
 rum quod ad ægros attinet sanan-
 dos, diætam iplis constituam pro
 facultate & iudicio meo commo-
 dam, omneq; detrimentum & in-
 iuriam ab eis prohibebo. Neq; ve-
 rò ullius preces apud me adeo va-
 lidæ fuerint, vt cuipiam venenum
 sim propinaturus, neq; etiam ad
 hanc rem consilium dabo. Simili-
 ter autem neque mulieri glâdem
 supposititiam ad corrumpendum
 fœtum dabo. Puram autem, ca-
 stam, & sanctam meam vitam &
 artem præstabo, & conseruabo.
 Nec verò calculo laborantes seca-
 bo, sed viris chirurgiæ operariis
 eius rei faciendæ locum dabo. In
 quacunque autem domos ingre-
 diar, ob vtilitatem ægrotantium
 intra

intrabo, ab omniq; iniuria voluntaria inferenda, & corruptione cum alia, tum venereorum operum præsertim abstinēbo, siue muliebria, siue virilia, liberorumve hominum aut servorum corpora mihi contigerint curanda. Quæcunq; verò inter curandum videro aut audiero, imo etiam ad medicandum non adhibitus, in communi hominum vita cognouero, tacebo, si quidem ea efferre non contulerit, & tanquàm arcana apud me continebo. Hoc igitur iusiurandum mihi integrè seruanti, & non confundenti, contingat & arte & vita feliciter frui, & apud omnes homines in perpetuum gloriam meam celebrari;

Transgredienti autem
& peieranti, his
contraria eveniant.





HIPPOCRATIS PRAENOTIONVM

LIBRI TRES,
Græcè & Latinè,

*

Cum explicatione ex Commentariis
Galenī sumpta per I O. BVTI-
NVM medicum.

I O. BVTINI PRÆ-
fatio in Prænotiones
Hippocratis.

*

VETVS opinio est iam vsq; à
primis deducta temporibus, &
a magno omnium gentium fir-
mata consensu, in mentibus
hominum esse tanquàm ora-
culum aliquod, ex quo futura præsentiant.
Quæ res, vt immortalis Dei nos quodammodo
similes efficit eiusdem prudentiæ & rationis
socios, ita ab aliorum animalium natura, quæ
quantum sensu mouëtur, tantum ad id quod
adeſt

adeſt ſe accommodant, longius abducit: A quibus paulominus homo differret, ſi nihil animus eius præſentiens in poſterum cauſas rerum earumq; progreſſus, & quaſi ſucceſſiones ignoraret. Quapropter vt in ſeminibus via ineſt earum rerum quæ ex ijs progignuntur, ſic in cauſis condita ſunt res futurae, quas eſſe futuras aut concitata mens, aut ſomno ſoluta cernit, aut ratio, aut coniectura præſentit. Nihil enim eſt futurum, cuius non cauſas id ipſum efficietes natura contineat: ex quibus quod eueniet qui intelligant, providentes aut prudentes, quaſi prævidentes appellati ſunt: & Providentia inde dicta eſt, quæ quidem ex obſervatione eorum quæ diuturno uſu notata fuerant, ars præſagiendi facta eſt. Nam ſicuti medici ex arterijs & ſpiritu agroti, multiq; ex alijs indicijs, & venientes & creſcentes morbos intelligunt, & declinantes: Gubernatores item cum exultantes Loligines viderint, aut Delphinos ſe in portum conſciantes, tempeſtatem ſignificari, longa id animadverſione edocti, putant. Sic deinceps alij alia ſigna habent, quæ ad varias rerum futurarum prænunciationes non immerito obſervare cenſentur:

Cana fulix etenim fugiens à gurgite ponti,
Nunciat horribiles clamans inſtare procellas,
Haud modicos tremulo funde ſe gutture cæui.

Sapo

Sæpe etiam pertriste canit de pectore carmen,
 Et matutinis acredula vocibus in?at,
 Cùm primùm gel·des rores Aurora remittit.

Verùm ut in cæteris artibus coniectores, sic
 in hac posse falli concedimus, potest accidere,
 ut aliquod signum dubiè datum, pro certo sit
 acceptum: potest aliquod latuisse, aut ipsum,
 aut quod esset illi contrarium. Medicus mor-
 bum ingrauescentem ratione prævidet: insi-
 dias Imperator: tempestates Gubernator: ta-
 men ij ipsi sæpè falluntur, qui nihil sine certa
 ratione opinantur: ut Agricola cùm florè plea
 videt, baccam quoq; se visurum putat, non
 sine ratione ille quidem, sed nonnunquàm ta-
 men fallitur. In medicina cùm sæpius ipse re-
 spondeat euentus, interdum tamen fallit nos,
 & moritur aliquis, de quo medicus securus
 primò fuit: Et quæ medèdi causa reperta sunt,
 nonnunquàm aliquid in peius conuertunt.
 Neq; id evitare humana imbecillitas in tanta
 varietate corporum potest. Quòd si fallun-
 tur ij, qui nihil sine aliqua probabili coniectu-
 ra ac ratione dicunt, quid existimandum est
 de coniectura eorum qui extis aut auibus aut
 somnijs futura diuinant? Verùm ad egros non
 rates aut harios, sed medicos solemus addu-
 cere, quibus cùm morbus ipse, differentia, par-
 tis afflucta natura, situs, & adiacentia cognita
 fuerint, multò certius philosophari datur, & à
 signis

*Signa quæ in sensum cadant, ab excretis, facili
 spiratione, leui tolerantia, bonitate pulsum,
 somno minimè laborioso, facie simillima sanis,
 decubitu decenti, loco, tempore, &c. ad morbi
 cognitionem, hinc autem ad inuentionem re-
 mediorum via certa deduci contingit. Quæ
 ex re factum est ut ea medicina pars, quæ ex
 signis quid futurum sit in morbis inuestigat,
 Semeiotice dicta sit. Hæc est quæ præteritorum
 cognitionem, præsentium inspectionem, & fu-
 turorum prædictiones continet. Porro ut sa-
 lutis aut boni signa prognostica sumit à fa-
 cultatum corpus nostrum dispensantium, vi-
 talis, animalis, & naturalis, paruo in egrie
 recessu à statu ipsarum secundum naturam,
 & qui sanis ipsis inerat: Ita verò signa mor-
 tis aut mali à magno recessu. Recessum hunc in-
 dicant actiones dictarum facultatum, magis aut
 minus læsæ pro morbi magnitudine. Sed ne
 diutius in vestibulo sumus hærentes,
 propius accedendum, &
 de ipsius ordine differens
 Hippocrates ipse
 audiendus
 est.*

¶ Pranot

Vrenotioaum
lib. tres sic per
capita distin-
guuntur: nam
in libro

Secundo
liberra.

Tertio
scribit ca
pita

- 6 De urina.
- 7 De vomitu.
- 8 De spu.
- 9 De grauedine & Remutatione.
- 10 De abscessa.
- 11 De dolore à vesica.
- 12 De signis quibus cognoscuntur peruenienti.
- 1 De febribus.
- 2 De diebus deterioriorum obseruatione.
- 3 De iudicys mulierum à partu.
- 4 De dolore capitis & faucium in febre.
- 5 De angina.
- 6 De gurgulione inflammatione laborante.
- 7 De signis febrium non determinato loco affecto.
- 8 De vomitione spontanea.
- 9 De conuulsione puerili.
- 10 De signorum inter se comparatione.
- 11 De signis in genere.
- 12 De signorum certitudine.
- 13 De quibus morbis sunt predictiones.

H I L L O C R A T I S

Primo do
cet cap.

REB 601482

- 1 } Necessarium esse medico praxionem, & praxi-
- 2 } etionem.
- 3 } Signa ex vultu.
- 4 } Signa ab oculis.
- 5 } Signa à decubitu agri.
- 6 } Decumbere in ventrem quàm malum.
- 7 } Signa à frigidore dentium.
- 8 } Signa ab ulcere.
- 9 } Signa à gesticatione manuum.
- 10 } Signa à spiratione.
- 11 } Signa à sudore.
- 12 } Signa ab hypochondryis.
- 13 } Signa à tumore in hypochondryis.
- 14 } Signa à supuratione.
- 1 } De aqua intercutem.
- 2 } De sermo.
- 3 } De dietione.
- 4 } De generibus malorum egestionum.
- 5 } De precordiorum dolore.



HIPPOCRATIS

PRÆNOTIONVM

LIBER PRIMVS.



Quàm sit necessaria prænотio prædictione

CAPVT I.

TΟ, ἰητῶν δοκέει μοι ἄριστον εἶναι, πρὸνόειαν ἐπιτηδύειν· πρὸνόνειον γὰρ καὶ πρὸ λέγειν παρὰ τοῖσι νοσέουσιν τά τε παριόνται καὶ τὰ πρὸνόνειοντα καὶ τὰ μέλλοντα ἴστασθαι, ὅκοσται τε παρρηκείουσιν οἱ ἀδινύοντες, ἐκδινυγόμενοι πιστεύει τ' αἱ μάλλον γνώσκων τὰ τῶν νοσούντων πρὸνόνειον, ὥστε ὅλμων ἐπιτρέπτειν τὰς ἀνδράπων σφίρας ἑαυτὰς τῶ ἰητῶν. τὴν δὲ θεωρησίαν ἄριστον αἰ ποιεῖσθαι, πρὸνόνειον τὰ ἰσόμνηα τῶ παθημάτων· ὁρίσας μὲν γὰρ ποιεῖν ἀπαρτίζε τὰς ἀδινύοντας ἀδυνατῶν. τὸτο γὰρ τῶ πρὸνόνειον τὰ μέλλοντα ἀποδέχοσθαι, κριτῶνται αἱ ἡν.

Medicum uti prouidentia ut mihi videtur optimum est. Prænoscens enim & prædicēs apud ægrotos, & præsentia, & præterita & futura, & quæ ægrotos prætercunt

tereunt exponens, fidem utiq; fecerit, quòd ægrotorum res magis cognoscat, quare audebūt homines seipsos medico committere. At verò curationē optimē fecerit, vbi prænouerit futuras affectiones. Sanos enim facere omnes ægrotos impossibile, hoc enim præstantius esset quam prænoscere in posterum euētura.

CAP. II.

Επεὶ δὲ οἱ αὐτοὶ θεραπεύουσιν, οἱ μὲν πρὶν καλεῖσθαι τὸ ἰατρὸν κατὰ ἰσχὺς τὴν νόσον· οἱ δὲ, καὶ ἰσκαλιπρόμυροι, παραγγέλλουσιν ἰατροῦ ἐπιλευσθῆναι· οἱ μὲν, ἡμέτερον μὲν ζήσαντες· οἱ δὲ, ὁλίγω ἀλλότρια ζήσαντες, πρὶν ἢ ἔνι ἰατρὸν τῇ τύχῃ πρὸς ἕκαστον νόσημα ἀποβινύσσειαζ· γινώσκουσι γὰρ καὶ παθῆναι τὴν φύσιν τὰς φύσεις, ὁκόσον ὑπὲρ τὴν δυνάμιν εἰσι καὶ συμβῆναι ἄμφοι καὶ εἰπὲν θεοὶ ἴεναι ἐν τῇσι νόσοις, καὶ ἴαται τὴν πρόνοιαν ἐκ μηχανῶν· ὅταν γὰρ ἀνθαυμάζοιτο τε δικαίως, καὶ ἰατρὸς ἀλαθὲς αὐτῷ εἴη καὶ γὰρ ὅς τις εἴοι τε ἀειγίνοαζ. Ἰούλως ἐπὶ μάλα οὐ δύναται ἀνὲρ ὁρθῶς διαφυλάσσειν, ἐκ ἀλλότριος ζήλου πρὸς ὀφθαλμοῦς πρὸς ἕκαστον καὶ τὰς ἀποθαννυμένους τε καὶ σωζομένους ἀποβινύσκειν τε καὶ ἀναγγεῖλαι, αἰσχύνης αὐτῷ εἴη.

Quandoquidē homines moriuntur, alij priusquā medicū vocent, præ violentia morbi: alij etiam accito medico,

de repente vita decedunt , quidam vbi
vnam vixerunt diem , quidam tempore
paulò diuturniore, ante quàm medicus
per artem aduersus morbos repu-
gnet. Itaq; nosse oportet, talium affectio-
num naturas quantum corporis vires
excedunt. Simul verò etsi quid diuini in
morbis inest, etiam huius prænotationem
ediscere. Ita enim meritò admirationi
fuerit, utpote ex multo tempore singula
consultò perpendens , ac ita morituros
victurosq; præsentiens atq; denunci-
ans, omnem prorsus calumniā vitabit.

*Providentia , dicta quòd aliquid antè vi-
deatur quàm fiat, in anima est nostra, ut præ-
sensio. Hæc prædictionem quæ per vocem effici-
tur, antecedit : Nam quæ in anima sumus
opinati, ea demùm nos prædicere posse constat.
Quis enim futura prædicere valeat , nisi ea
præcognouerit ? præcognoscimus autem ex iis
quæ plerunq; observata sunt: imbrès siquidem
siccitatesq; , & frigora , & æthiæ , & ventos,
quibusdam ex signis præsentiant etiam navis
rectores & rusticis. Apud Vergiliū rubens
luna signum est venti : & cornicū garritus,
obstreperæq; ranarū querela , pluvia. De-
niq; quid vesper serus vehat , unde serenæ
ventus agat nubes; quid cogitet humidus au-
ster,*

ſter, Sol tibi ſigna dabit. Medici, ſi Hyems ſquallida & aquilonia fuerit, Ver verò pluvioſum, febres acutas Aëſtate fore conieſtane, & alia mala quæ nos ob circumſtuiti aëri cauſam infeſtare ſolent, præſentiunt. Quare medicum (ut prædicere poſſit exitum morborum, qui magna ex parte cauſas ex qualitate cæli trahunt, aut ab ambientis nos aëris conditione dependent) cæli & temporis rationem tenere oportet. Hoc eſt quod Hippocrates diuinum in morbis eſſe putauit. Cauſa nimirum admirabilis, obſcura, nec villo ſenſu compræhenſa, ab ipſo diuina huncupatur, quæ toto confuſa aëre ex primis qualitatibus non conſtat, neq; ex illis proficiſcitur, ſed cùm ſit ſublimiorum ac cæleſtium cuiuſdam originis, vim ad progignendos morbos maximam habet. Ex horum atq; ſimilium præſenſione prædictione ve exiſtimans ager medicum agnoſcere naturam ægrotationis, in ſpẽ erigitur, ac ſe exhibet obſequentem. Porro obſequio parentis ægri, & conſilio benè monentis medici, facilè diſpellitur morbus qui adeſt, aut qui futurus imminet præcauetur, modo ne ſit ita deſperatum, ut nullæ ope ſanari poſſe videatur: nã, ut ait Poëta, Nō eſt in medico ſemper reſoluetur ut ager, Interdum medica plus valet arte malum.

Quare medicum naturam aſſeſtuum præſentiens, ac inde reuoluituros aut morituros

pradicens, nō solum à crimine interempti agri
vindicabitur, sed ut fides meritò commen-
dabitur, omnesque in admirationem sui con-
citabit.

De signis ex vultu.

CAP. III.

Σκίασι δὲ καὶ ὅτι ἐν τοῖσι ὀξείσι νοσήμα-
σι, πρῶτον μὲν τὸ πρῶτον πρὸς τοσούτους, εἰ ὁ-
μοίον ἐστὶ τοῖσι τῷ ὑγιαίνοντι μάλα τε, εἰ ὁ-
τὶ ἰσχυρῶς. ὅταν γὰρ ἂν ἡ ἀρετὴ τὸ δ' ἐκαστὸν ὁ-
μοίον ὁμοίον, δεινότερον. εἴη δ' ἂν τὸ τοῖον δι-
κὴς ὀξεία, ὁφθαλμοὶ καὶ ὦτοι, κρόταφοὶ ξυμπι-
πλωκότες, ὥστε ψυχρὰ ἔξω τε καὶ μέσα, καὶ οἱ λο-
βοὶ τῷ ὥτει ἀπιδραμύροι, καὶ τὸ δέμας τὸ
ἄλλο τὸ μέτωπον σκληρόν τε καὶ ἀρετὴ περὶ ὅσον,
καὶ καρφαλίοι ἰόν, καὶ τὸ χεῖμα τὸ ἐμπροσθεν
πρὸς πρὸς χλαρόν τε, ἢ καὶ μέλαν ἰόν, καὶ πη-
λὸν ἢ μελιθεῶδες. ἢ μὲν ἐν τῷ δέματι τὸ ἰόν,
τὸ πρῶτον πρὸς τοῖον ἢ, καὶ μήπω οἶόν τε ἢ τῷ
ἄλλοισι σημείοισι ξυμπιπλωκότες, ἐκαστὸν ὁ-
μοίον, καὶ ἡρεσμένη ἂν ὁμοίον, ἢ τὰ τῷ καρφίᾳ
ἰξυρεσμένη ἢ ἰσχυρῶς, ἢ μελιθεῶδες πρὸς αὐτόν.
καὶ μὲν πρὸς τῷ ὁμοίον ἢ ὅσον νομίζον ὁμοίον
εἶναι. κρείνεται δὲ τὰ τοιαῦτα ἐν ἡμέρῃ τε καὶ
νυκτὶ, ἢ ἀπὸ τῶν τῶν πρὸς τῶν πρὸς τῶν
πρὸς τοῖον ἢ. ἢ δὲ μετὶ τυτίων φησὶν ἰσχυ-
ρῶς ἐν τῷ χεῖμα τῷ πρὸς τῶν κατὰ τὸν ὁ-
μοίον ἢ γὰρ ἰσχυρῶς τῷ ὁμοίον. ἢ δὲ καὶ πρὸς
ὁμοίον ἰσχυρῶς τὸ νοσήμα, ἢ πρὸς τῶν, ἢ πρὸς
τῶν.

ταῖς, τ' αἰσώσονται τοῦτον ἢ, αἰεὶ ταυτίων
 ἱπακίνας αἰεὶ ἂν καὶ πρότερον ἐκίλῃσαι.
 Καὶ τὰλλα σημεῖα σκίπινος, τὰ τε ἐν τῷ ξύμ-
 παντι προσώπῳ, τὰ τε ἐν τῷ σώματι, καὶ τὰ
 ἐν τῷσιν ὀφθαλμοῖσιν.

Considerare porro hoc modo conue-
 nit in morbis acutis: Primum quidem
 faciem ægroti, sit'ne similis sanorum,
 maximè verò an ipsa sibi ipsi, ita enim
 optima fuerit: Si verò maximè contra-
 ria simili fuerit, horrendissima est. Talis
 autem fuerit: nasus acutus, oculi conca-
 ui, tempora collapsa, aures frigidæ ac
 contractæ, & extremitates earum auer-
 sæ, & cutis circa frontem dura, & circum-
 tenta, ac arida, & color totius faciei pal-
 lidus, aut etiam niger, aut liuidus, aut
 plumbeus. Siquidem igitur in principio
 morbi facies talis fuerit, & nondum ex
 aliis coniecturam facere licuerit, inter-
 rogare oportet, nùm vigilauerit homo,
 aut alui excrementa valdè liquida sint,
 aut fames aliqua ipsum teneat. Et si qui-
 dem horum aliquid confiteatur, minus
 grave esse putandum est: iudicantur au-
 tem talia per diem ac noctem, si ob has
 causas facies talis fuerit. Si verò nihil ho-
 rum esse dicat, neque prædicto tempore

destiterit, nosse cōuenit mortī proximū esse. At si vetustiore existente morbo, aut triduo, aut quatrīduo, talis fuerit facies, de his interrogare oportet de quibus etiam prius iulsi: itemq; alia signa considerare & in vniuersa facie, & in corpore, & in oculis.

Signa quae sumuntur à vultu, ut primū se medico offerant ad egrum admissū, ita vim maximam & ad praedicendum & ad curandum obtinent. Quāto plus enim aut minus à naturae forma recessit vultus, tantō plus aut minus prauus existit, tantoq; faciliorem aut difficiliorem curandi rationem fore portendit: atq; eo periculi plus habet id formae vitium, si contractum non est ab aliqua causa extērius euidente, ut ab insomnia, alimenti inopia, aut alui fluore. Nam si non inde est, consumptio talis existit ob morbi malignitatem.

De signis ex oculis.

CAP. IIII.

Ἡν γὰρ πλεονάζοντες φέρουσιν, ἢ διακρύπτουσιν ἀπεργαίεως, ἢ διακρίφουσιν, ἢ θάλλερος θάττερος ἐλάσσον γίνηται: ἢ τὰ λευκὰ ἐρυθρὰ ἴχουσιν, ἢ περὶ τὰ φλέβια ἢ μέλαινα ἐν αὐτίοις ἴχουσιν, ἢ λήμει φαίνονται αὐτὰ τὰς ὀφθαλμοὺς, ἢ καὶ ἐν αὐτῶν τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἢ ἐξίχοντες, ἢ ἐκχυλῶντες ἰσχυρῶς γινόμενοι, ἢ αἱ ὀφθαλμοὶ αὐχμηροὶ καὶ ἀλαμπεῖς, ἢ τὸ χροῖμα τῶ ἐν ὅλῳ περὶ τὸν ὀφθαλμὸν

την ἡ ταῦτα πάντα κακὰ νομίζουσιν. καὶ ὁ λέγειν
 εἶνα. Σκοπεῖν δὲ χρὴ καὶ τὰς υποφάπας τῶν ὀ-
 φθαλμῶν ἐν τρισὶν ὑποκρίσει. ἢ γὰρ τι υποφαίνη-
 ται τῷ λυκῷ, ἢ βλεφάρων μὴ συμβαλλομέ-
 νων, μὴ ὅτι διάρρηξις, ἢ φαρμακωπόσις
 εἶναι, ἢ μὴ εἰδομένην ἔτι καθεύδειν φλαυρῶν
 φασματόν, καὶ θανατῶδες λίαν. Ἡ δὲ καμύ-
 λων ἢ ριζὸν ἤσεται, ἢ πλινθὸν ἢ ὠχρὸν βλεφα-
 ρον, ἢ χεῖλος, ἢ ῥίς, μετὰ πρὸς τὸ ἄλαν σημεῖον,
 εἰδέναι χρὴ, ἐγγὺς εἶναι θανάτου. Θανατῶδες
 δὲ καὶ χεῖλια ἀπολυόμενα, καὶ κριμασίονα, καὶ ψυ-
 χῶς, καὶ ἐκλυθε γινόμενα.

Si enim lucem fugiant, aut inuolun-
 tariè illactyment, aut distorquean-
 tur, aut alter altero fiat minor, aut al-
 bas partes rubentes habeant, aut venu-
 las liquidas aut nigras in ipsis habeant,
 aut sordes circa oculos appareant, aut
 etiam instabiles, aut eminentes, aut cani
 vehementer facti, aut squallentes & ob-
 scuri fuerint, vel totius color euariet vul-
 tus: hæc omnia mala & perniciofa esse
 putandum est. Considerare verò conue-
 nit etiam oculorum subapparitiones in
 somnis. Si enim albæ quid partis subap-
 paruerit palpebris non commissis, si id
 non ex alui profluvio, aut medicamenti
 potione fuerit, aut ægrotus non ita dor-
 mire consueverit, malum signum & val-
 de

dè lethale est. Lethale etiam si contracta fiat palpebra, livida, aut pallida, si labia aut nasus resoluta & pēdētia, & frigida, & albicantia facta sint cū aliquo ex aliis signis, morti proximū esse sciendum est.

Hæc indicia sumpta ab oculis pessima quidem sunt, omnia si concurrant, mala etiam singula, sed pro quantitate contrarietatis minus aut magis exitiosa censerī debent. Oculorum etiam album commissū palpebris appa-rens inter dormiendum, exitium præ se fert, extremam enim imbecillitatem facultatis palpebras mouentis ostendit. Quidam simile coniūci potest ex contracta palpebra & labijs.

Decubitus ægri.

C A P. V.

Κεκλιμένοι ὃ χεὶρ καὶ λαμβανούσας τὸ νοσήσει καὶ ὑπὸ τῆς ἰντῆς, ἐπὶ τὸ πλάγρον τὸ δεξιόν, ἢ τὸ ἀριστερόν, καὶ τὰς χεῖρας, καὶ τὸν τράχηλον, καὶ τὰ σκέλη ὅλῃσι ἐπιτεκαμνύρα ἔχοντα, καὶ τὸ ἔμπροσθεν σώμα ὑγρὸν καίμενον. ἔτι γὰρ καὶ οἱ πλῆνσι τῶ ὑγιαίνοντων κατακλίονται.

Αἰσθάνει δὲ εἰς τὴν κατὰ κλίσειν αἱ ὀργαὶ τῆς ὑγίαινοντων ὑπὸ τοῦ δεξιᾶς καὶ τοῦ αἰσθάνειν, καὶ τὸν τράχηλον, καὶ τὰ σκέλη ἐπιτεκαμνύρα ἔχοντα, ὅσοι ἀσθενέστεροι.

Εἰ δὲ καὶ περιπότης γίνωσκει, καὶ κατὰ ἰστίαν ἀπὸ τῆς κλίσεως ἐπὶ πόδας, θανάσιμος ἐστίν.

Εἰ δὲ καὶ γονυῖαι καὶ πόδες διεσπασμένοι ἔχον μὴ
θεμελιῶν κάρτεϊ ἰόντας καὶ τὰς χεῖρας, καὶ τὸν
τραχήλον, καὶ τὰ σκέλια ἀνωμάλως διτρίμεναι-
ται καὶ γονυῖαι, κακὸν ἄλυστον γὰρ σημαίνει.

Θανάτω δὲ οὗτοι, καὶ τὸ κεχρησμένον καθύπευθε
αἰνῶν, καὶ τὰ σκέλια ὑπὸ τοῦ καρδίου συγκαταμ-
μύα ἐναισχυρῶς, καὶ διαπτελιγμύα.

Decumbentem ægrotum à medico de-
prehendi conuenit, in latus dextrum aut si-
nistrum, & manus, & collum, & crura
modicè inflexa habentem, & totum cor-
pus flexibile situm. Ita enim plurimi ex
sanis decumbunt.

Optimi autem sunt decubitus qui sa-
norum decubitibus similes existunt. At
verò supinum iacere, & manus, & col-
lum, & crura extenta habere minus bo-
num est. Si verò etiam pronus fiat, & de
lecto ad pedes delabatur, magis horren-
dum est.

Si verò nudos quoque pedes habere
comperiatur, nec admodum calidos: &
manus, & collum, ac crura inæqualiter
disiecta, ac nuda, malum est. anxietatem
enim significat.

Lethale autem est & hiantem semper
dormire: & crura supini iacentis valde
incuruata esse ac complicata.

Decubitus in latus, robur indicat facultatis per musculos firmatis corpus, quomodo rursum debilitatem, ubi cubare in latus non possis ager. Qua in re qua peculiaria sunt agrotis, considerata. Si enim offendas agrum ut plerumque bene valentium vsuuenit, cubantem, laudabis talem iacentis habitum: Si verò contrario modo reperiās decubentem, non conuenit statim horrere quasi malum indicium, sed requirere utrum in consuetudine sit talis agro figura. Nam consueta cum in naturam penè transferunt, ea ut minus officere solent, ita non adedò magnum malum portendunt: Quamuis extentis & manibus, & cruribus, supinus qui cubet, non possit alicuius boni significationem ullam exhibere, minorem, qui de lecto ad pedes deuoluitur, & qui manus & pedes disijcit, aut hianti ore dormit, tunc enim significatur extinctio quaedam facultatis corporis regentis.

In ventrem decumbere quàm malum sit.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΣ. ΚΑΠ. VI.

Επὶ γαστέρι δὲ κείῳ, ἢ μὴ σπώνδῃς ἐν καὶ ἐγκλίνοσι ἔτω καμῖνός, παρεφρεσύνῃ πῶς συμμῆται, ἢ ὁδώνῃ, ἢ ἀμφὶ τὴν κοιλίαν ἔσται.

Αἰσθανθῆσαι ὅτι ἐν τῇ κοιλίᾳ, τῆς γαστρὸς ἀκμαζούσης, ποτὲ μὲν ἐν πᾶσι τοῖς ὅμοις τοῖς ἀνθρώποις, κάμνῃ δὲ ἐν πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ.

At in ventrem decumbere, si quis non sit adfectus dum sanus fuit, ita dormire, delirium significat, aut dolorem locorum circa ventrem.

Cæterum erectum sedere velle ægrum, in morbi vigore, in omnibus morbis acutis malum est: pessimum autem in peripneumonicis.

Cubare in ventrem contra consuetudinem, aut delirium significat, aut dolorem quandam qui circa tales partes fatiget. Cæterum in morbi vigore cum ament omnes acuto morbo laborantes immoti cubare, et si quis eos excitet, ægrè ferant, arbitrare propter vehementem spirandi difficultatem, aut inquietationem, aut delirium, ægrum postulare ut erectus sedeat.

Stridor denticum in febribus quid portendat.

C A P.

V I I.

Οδόντας ὅ περὶ ἐν πυρετοῖσι, ἀνθρώποις μὴ ἐκνήθεις ἐστὶν διὰ πύθων, κακοῦ καὶ θανάτου, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀπὸ ἀμφοῖν κίνδυνον ἰσόρροπον ἢ δι καὶ παραφροσύνην τῆς ποιῆς ἐλπίθριοι γίνονται καὶ ἔτι ἥδη.

Dētibz stridere in febribz quibz nō familiare id est à pueris, furiosū ac letale est. Verū p̄dicere oportet abytrisq; pericu-
lum

lum futurum. Si verò etiam delirus hoc faciat, perniciosum valde iam existit.

Dentium stridor in febribus vel à mentis vehementi commotione, quæ futuri delirij est indicium, vel ab affecta nervorum origine existit, quæ mortem propè esse demonstrat, atq; eò magis si cum stridore præsens concurrat delirium.

De signis ex ulcere.

C A P. VIII.

Ελκος δὲ ἢν τε καὶ ἀσχετὸς τύχη ἔχον, ἢν τε καὶ ἐν τῇ νέσῳ γίνῃ, καταμενδάνον δὲ ἢν γὰρ μέλλῃ ἀπὸ λυθῆ οὐ ἀνδρωπος, ἀλλὰ θανάτου, πλιδόν τε καὶ ξηρόν εἶναι, ἢ ἀρξόν τε καὶ ξηρόν.

Ulcus autem siue prius factum fuerit, siue in morbo accesserit, considerare oportet. Si enim moriturus est homo, ante mortem lividum ac siccum erit, aut etiam pallidum & siccum.

Facultas corpus nutrienda si debili habeatur, siccum relinquetur ulcus; nec ullus color in eo certus manebit; sed præ diversitate humorum redundantium evariabit, à bilioso croceum, ab atrabiliario lividum aut viride erit, sicut à pituita pallidum.

Gesticulatio manuum quid significet.

C A P. IX.

Περὶ δὲ χειρῶν φορῆς, τίος γινώσκοντες.

κόσμοισι ἐν πυρετοῖσι ὀξέειν, ἢ ἀπειπολιδυμένη-
 σιν, ἢ ἐν φρενίπσιν, ἢ ἐν κεφαλαλγίῃσι, πρὸς τὸ
 πρὸς ἑαυτὴν φερομένας καὶ τηρούσας διὰ κακῆς,
 καὶ ἀπεκρφολογέσας, ἔκ κροκίδας δ' ἀπὸ τῶν
 ἱματίων ἀποτιθέσας, καὶ δ' ἀπὸ τοῦ τοίχου ἄχυσεν
 ἀποσπώσας, πάσας εἶναι κακὰς καὶ θανατω-
 δας.

At verò de manuum motione ita sen-
 tio. quæ in febribus acutis, aut peripneu-
 moniis, aut in phrenitide, aut capitis do-
 lore, ante faciem feruntur, & frustra ve-
 nantur, & festucas legunt, & floccos de
 vestibis euellunt, & de pariete paleas
 detrahunt, eas omnes malas & letales
 esse.

Gesticulationes manuum deprauata ob
 imaginationem fiunt, illi similem quæ per sus-
 fusiones oculorum contingit. Fit enim ut per
 cruditates exhalantibus ad caput humoribus
 crassius, visa quedam appareant: Si enim re-
 sistit humor crassus, aut niger, prohibens di-
 gradi foras visorium splendorem, ibi visa pro
 natura humoris consistunt, quæ interdum pi-
 lorum, aut subtegminis, aut staminis, quando-
 que culicis, aut muscæ ob os volantis, aut
 lentis, aut milij, aut festucarum speciem re-
 presentant. Humor enim in oculo mundus
 concipit illam exhalationem, quæ ubi pertur-
 batur, non mirum si visa appareant, quæ non
 nisi

nisi cruditatem humorum, morbi magnitudinem, & naturae perturbationem consequuntur.

Spiratio.

CAP. X.

Πνεῦμα ὃ πυκνὸν μὲν ἔον, πότον σημαίνει, ἢ φλεγμονήν· ἐν τοῖσιν ὑπὲρ τῶν φρενῶν χειρόσι· μέγα δὲ ἀναπνεόμενον καὶ διὰ πολλὰ χροῖα, παρεφροσύνην δηλοῖ. Ψυχρὸν δὲ ἐκπνεόμενον ἐν τῇ μύτῃ καὶ τῷ στόματι, ὀλέθριοι κάρτεα ἤδη γίνονται.

Εὐπνοῖαν δὲ καὶ νομίζαν κάρτεα μεγάλην δυνάμει ἔχειν εἰς σωτηρίαν ἐν ἅπασιν ἔχουσιν ὀξέσι νοσήμασιν, ὅσα ξυμὴ πυρετοῖσιν ἐστὶ, καὶ ἐν περσυσσύνῃ καὶ ἡμέρησι κρίνεται.

Spiritus densus dolorem significat aut inflammationem, in locis supra septum transversum: qui verò magnus expiratur, & per multum temporis interuallum, delirium iudicat. Si verò frigidus è naso & ore expiretur, valde iam perniciosus est.

Bonam autem spirationem valde magnam vim habere ad salutem, in omnibus acutis morbis putare conuenit, qui cum febribus sunt, & in quadraginta diebus iudicantur.

Spiratio frequens & eadem parua, significat dolorem: crebrior autem, & magna, inflammationem.

flammationem etiam partium supra septum transuersum positarum, quæ sunt cor & pulmo. At verò rara spiratio, hoc est, multò interposito tempore facta, si magna est, indicat delirium, quasi obliuiscente actionum agro: Si parua, adeo ut sensum effugiat, extinctionum caloris naturalis: quod percipietur ex habitu frigido oris & artuum. In summa, spirandi facilitas optimam cum ubiq; præbet indicium, tum præsertim in acutis. Spiratione siquidem integra manente, nativus calor superesse demonstratur, qui solus vel à medico adiutus, urgenti malo repugnare sufficiat.

Sudores.

CAP.

XL.

Οἱ ὃ ἰσχυροὶ, ἄριστοι μὲν εἰσι ἐν πᾶσι τοῖς ὀξέσι νοσήμασι, ὀκρόσι ἐν ἡμέρησί τε κρισίμοις γίνονται, ἔτελεύτως τὸν πυρετὸν ἀπαλλάττουσι. ἀγαθοὶ δὲ καὶ ὀκρόσι διὰ παντὸς τῆς νόσου τοῖς ἰσχυροῖς, ἀπὸ δὲ ξαντὸν τὸν κενρωπὸν ἀπὸ τῆς πύρεθρον τὸ νόσημα. οἱ δ' αὖ μὴ τοῦτο πύρεθρον, ἐλυσίτελλες ἐκείνοι δὲ οἱ ψυχροὶ τε καὶ μετὰ τὴν πύρεθρον κεφαλὴν τε καὶ τὸ στήθος πύρεθρον καὶ τὸν αὐχένα. ἔτι γὰρ ξαντὸν μὲν ὀξεί πύρεθρον ἀνατρεφὺς παροξυσμοῖσι. ξαντὸν δὲ στήθος, μὴ καὶ νόσον.

Sudores optimi sunt in omnibus acutis morbis, qui in diebus indicatoriis fiant, & febrem perfectè submouent. Bo

ni verò sunt, qui per totum corpus fiunt, & hominem facilius morbum ferre faciunt. Qui verò tale quid non effecerint, incommodi sunt. Pessimi autem sunt frigidi, & qui tantum circa caput & faciem fiunt, & circa cervicem. Hi enim cum acuta quidem febre mortem praesignificant, cum mitiore verò longitudinem morbi.

Sudor post collisionem in die decretorio modicè calidus, ex toto manans corpore per cutis spiracula, solutorius est, aut huiusmodi, ut ex eo melius habeat ager: huic diversus non est utilis. Frigidus autem sudor, qui sic è corpore fluit, crassitiem materiae quae non facile discuti, aut à calore vinci queat, pra se fert: ideoq; longitudinem morbi, si cum mitiori est febre: si verò cum acuta, mortem significat.

Signa ex hypochondriis.

CAP. XII.

Υποχόνδριοι δὲ, αἰσθάνονται τὸν καλὸν καὶ ὀνείδιον, καὶ ἐπὶ δεξιᾷ, καὶ ἐπὶ ἀριστερῇ φλεγμαῖνον δὲ, ἢ ὀδυνην παρίχον, ἢ ἐντεπαρρότον, ἢ ἀνωμάλως διακείμενα τὰ δεξιὰ πρὸς τὰ ἀριστερά, ταῦτα πάντα φυλάσσειας ἔχει. εἰ δὲ καὶ σφυγμὸς ἐνείη ἐν τῷ ὑποχόνδριῳ, θόρυβος σημαίνει, ἢ παρεμφερήν.

Ἀλλὰ τὸς ὀφθαλμοὺς ἐπιθετοῦν τῶν βίβ-
 ρων ἢν γὰρ αἱ ὄψεις πυκνὰ κινῶν, μανῆναι
 τούτους ἐλπίς.

Hypochondria saluberrima sunt si do-
 lore vacant, si mollia & æqualia sunt dex-
 tra ac sinistra parte. Si verò inflammatio-
 ne vexantur, aut dolore, aut intenta
 sunt, aut inæqualiter affecta dextra ac
 sinistra parte, hæc omnia animaduerten-
 da sunt. Si verò pulsus in hypochondriis
 insit, perturbationem significat, aut deli-
 rium. Verùm oculos talium intueri oportet,
 si enim oculi frequenter moueantur,
 furiosos hos fore timor est.

*Docet quid medico prædicendum sit ex hy-
 pochondrijs, aut naturæ simillimis, aut iisdem
 inflammatione tentatis, mollibus, intentis &
 renitentibus, atq; adeò inæqualiter affectis,
 opponendo saluberrimis pessimorum & inæ-
 qualium signa. Nam ut censentur salubria
 quæ sunt naturæ similia, sic tantò sunt dete-
 riora quantò magis à naturæ similitudine re-
 cedunt. In hõrum regione pulsantes subsul-
 tantèsve arteriæ, perturbationis aut delirij
 periculum adesse denunciant: Quod magis
 pro certo firmabit, si oculi vagi appareant &
 instabiles.*

Tumores in hypochondriis. CAP. XIII.

Οἰδήμα δὲ ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ σκληρόν τε ἶον ἔῃ ἐπιδύωνον, κένεται μὲν, εἰ παρὰ πᾶν εἴη τὸ ὑποχόνδριον. εἰ δὲ εἴη ἐν τῷ ἐτέρῳ μέρει, ἀκυσθιανότερόν ἐστιν ἐν τῷ ἐπ' ἀριστερῷ.

Συμμεῖναι δὲ τὰ τριῶντα οἰδήματα, ἐν ἀρχῇ μὲν θάνατος ὀλιγοχρόνιος ἵσται· ἢ δὲ ὑπερβάλλη εἴησις ἡμέρας ὅ, τε πυρετὸς ἔχων, καὶ τὸ οἰδῆμα μὴ καθίσταται, ἵς διαπύησιν πέμπει.

Γίνονται δὲ τετάρτοις ἐν τῇ πρῶτῃ περιόδῳ, καὶ αἵματος ῥῆξις ἐκ τῶν ῥιγῶν, καὶ κέρτα ὑφιλίει.

Αλλ' ἐπανιρωτῶν χρόν, εἰ τὴν κεφαλὴν ἀλγέσιν, ἢ ἀμφοῖν ἀποῦσι. ἢ γὰρ πρῶτον εἴη ἐν ταῦτα ῥίπτι μᾶλλον ὅ ῥιγῶν νεωτέρῳσι πίπτει καὶ τεύχονται ἰτίων, τὴν δ' αἵματις ῥῆξιν πρὸς δέχεται χρόν.

Τὰ δὲ μελθακά τ' οἰδημάτων, καὶ αἰσώδεια, καὶ τῷ δακτύλῳ ὑπείκονται, χρονωτέρως τὰς κρίσις ποιεῖται, καὶ ὅσοι ἐκείνων δυνάστερόν ἐστιν. εἰ δὲ ὑπερβάλλη ἐξέκονται ἡμέρας ὅ, τε πυρετὸς ἔχων, καὶ τὸ οἰδῆμα μὴ καθίσταται, ἔμπροσθεν ἵσται σημαίνει. καὶ τῶν, καὶ τὸ ἐν τῇ ἄλλῃ καλῇ καὶ τῶν τ'. ὁχόσα μὲν ἢ ἐπιδύωνά τε ἵσι, καὶ σκληρὰ, καὶ μεγάλια, σημαίνει κίνδυνος θανάτου ὀλιγοχρόνιον. ὁχόσα δὲ μελθακά τε καὶ αἰσώδεια, καὶ τῷ δακτύλῳ πιζόμενα ὑπείκει, χρονωτέρως ἐκείνων.

Τὰς δὲ δόσεις αἷος ἥσεν τὰ ἐν τῇ γαστρὶ οἰ-
δήματα ποιῆσαι, καὶ ἐν τοῖσιν ὑποχρῶνται
ἥκιστα δὲ τὰ ὑποκάτω τῷ ὀμφαλῷ εἰς δόσιν ἔσθαι
τρέψεται. αἷμα δὲ ῥῆξιν ἐκ τῆ αἵμα τῶν
μάλιστα προσδέχεται.

Απάντων δὲ γὰρ τῶν οἰδημάτων χρῶνται
ἐπὶ ταῦτα τὰ χεῖρα, ὑποσκήπτειν τὰς ἐκπύ-
σεις. τὰ δὲ διαπύματα ἅδε δεῖ σκίπτειν ἐν
τῷ θυ. οὐδὲν γὰρ ἔξω τρέψεται, ἀριστέϊσι, μι-
κρότεϊ ἰόνται, καὶ ὥς μάλιστα ἐκκλίνοντα ἔξω, καὶ
εἰς ὅξυν ἀποκυττάμενα. τὰ δὲ μεγάλα τε ἰόνται καὶ
πλάττειν, καὶ ἥκιστα εἰς ὅξυν ἀποσυρῶν φύμενα, κά-
κιστα. ὅστις δὲ εἴσιν ῥῆξιν, ἀριστέϊσιν, ἀμειν-
τῶ ἔξω χεῖρα ἐπιχειροῦναι, ἀλλ' εἰ περὶ σπλ-
ῆνατι καὶ αὐτῷ δύναι, καὶ πάντ' ἔξω χεῖρον, ὁμύ-
χρωσι φαίνει.

Tumor in præcordio durus existens
& dolorosus, pessimus quidem est si per
totum fuerit præcordium: si verò fuerit
in altera parte, minus periculosus est in
sinistra.

Significant autē eiusmodi tumores, in
principio quidem, mortem breui affutu-
ram: si verò viginti dies transgrediatur,
tūm febris detinens, tūm tumor non con-
fidens ad suppurationem conuertitur.

Contingit autem his in primo circui-
tu, etiam sanguinis eruptio ē naribus,
& valde prodest.

Verum interrogare conuenit, an caput doleant, aut hebetem visum habeant. Si enim horum quid fuerit, ad eum locum repit. magis tamen in iunioribus v. ac x x x. annis sanguinis eruptionem expectare conuenit.

Molles verò tumores, & doloris expertes, & digito cedentes diuturniores iudicationes faciunt, & minus illis sunt horrendi. Si transgreditur Lx. dies febris detinens, & tumor non confidit, suppuraturum significat & hunc & eum qui in reliquo ventre est eodem modo. Qui igitur tumores dolorosi sunt, duri, & magni, periculum mortis breui affore significant: at qui molles, & doloris expertes sunt, & digito compressi cedunt, diuturniores illis sunt.

Cæterum tumores in ventre minus faciunt abscessus, iis qui sunt in præcordiis. Minimè verò qui sub vmbilico sunt ad suppurationem cōuertūtur. at sanguinis eruptio, ex supernis locis maximè expectanda.

Omniū autem tumorū diuturnorum circa hos locos, suppuratio consideranda. Sunt autem suppurationes, quæ hinc fiunt, hoc modo considerandæ: quæ extra vertuntur, optimæ sunt, cæquæ paræ,

paruæ, & quam maximè foras eminentes, & in acutum fastigiata: quæ verò magnæ sunt, & latæ, & minimè in acutum fastigiata, cæpessimæ: quæ verò intro rumpuntur, optimæ sunt, quæ nil cum externo loco communicât: sed sunt contractæ, & sine dolore, & totus externus locus concolor apparet.

Tumor in hypochondrjjs præter naturam, cum dolore quem phlegmonem appellant, si dextra affligat parte, periculosior est, propter hepar: mitior, si sinistra, propter lienem: exitiosissima, si utraq; laceffit: adeo ut si intimū aliquod inde viscus afficiatur, vita non sit in tutō. Mollis autem tumor, nec dolens, quem œdema vocant, diutius immoratur, quia frigidior est: Calore enim concoctio perficitur, sed minori cum periculo est, quia dolore vacat, dolor siquidem vires exoluit. Verūm ut calidiorē illum tumorem dolentem si febris non desinat vigesimo die, in suppurationem verti dicit: ita huic frigido, suppurationis limitem ponit sexagesimum diem. Si qui sint inter hos mediū tumores, quadragesimum diem habent terminum suppurationis suæ. Suppuratio verò non est aliud quàm tumoris aut inflammationis ad pus transmutatio, quæ quia multiplex est, ea minus mala censetur, quæ foras

non intrò tendit, quæ non in multam est latitudinem extenta, quæ in sublime effertur coniformam referens, hæc enim robur foras expellentis indicat facultati: Quæ autè intrò rumpitur, deterior est omnino quàm quæ foras ad cutim movetur. hæc enim eruptio intrò in partes nobiliores fit, non facile medicamentum admittit, puer secretum mordicat internas partes, committit intestinorum difficultates, alimonie vitiat diductionem, atq; ventriculi concoctionem debilitat. Mala quidem est hæc suppuratio: sed ea quæ introrsum rumpitur, atq; extrorsum cum malum habeat geminatum, alijs omnibus est deterior.

De signis puris.

C A P. XIII.

Τὸ δὲ πῦρον, ἀριστὸν λευκόν τε εἶναι, καὶ ὁμολοῖ, καὶ λεῖον, καὶ ὡς ἥκιστα δραστικόν· τὸ δὲ ἐναντίον τούτῳ, κακίστον.

Pus optimum est album, laeve, æquale, & quàm minimè graueolens: quod reiò huic contrarium est, pessimum est.

Tres in corpore humano fiunt alterationes: Una exquisitè secundùm naturam, qua cibi in cremorem nutritioni aptum vertuntur: Altera contraria huic, præter naturam, qua computrescunt omnia, & sanguis (deuicta à fluxione natura) in peregrinam quandam qua

qualitatem peruenit, vnde abscessus mali, corruptela partium & mortificationes: At tertia, quæ suppurationes comitatur & pus generat, medium inter has obtinet locum, neq; à solo calore extra naturam, neq; à solo secundum naturam facta: Mixtus enim ex utroq; est calor inflammationis, & pus ex fluore seminali sanguinis ortum habens ipsum, nec ex materia prorsus benigna peragitur, nec etiam omninò aliena. Nam materia illa sanguinea, ex qua in puris generatione assimilationem molitur natura, aliquid habet quod substantia similitudine effici potest familiare, cuius ratione, vicinæ phlegmonæ partes concoctionem aggrediuntur, atque ita in concoquendo natura laborat, vt assimilationem moliens putrefacienti causa resistat, impediatq; ne amplius in putrefaciendo pergat. Quæ in re superior ipsa coloris quidem assimilationem consecuta est, non autem substantia omni ex parte, ob incidentem causam putrefacientem, quæ obstitit. Itaq; pus non putredo simpliciter, sed concoctio dici potest, quæ in vnam speciem semper mutatur coloris & consistentiæ, & odoris. Optimum enim pus esse censetur crassum, sibi simile, candidum, & minime fætidum. Illa verò putredo quæ euicta natura contingit, aut facultate ad ultimam debilitatem adducta, aut humore extremè prauo vincente,

cente, neq; consistentiam habet, neq; colorem
 unum, neque odorem, sed putrescens humor
 semper variatur, ac in peiorem continuè aliàs
 aliam qualitatem mutatur. Puris autem ge-
 neratio sic fit: sanguis in partes laborantes de-
 cumbens (ut provida natura solet afflictae parti
 succurrere) ex vasis in tunicas earum resu-
 dat, ac unicuiq; particula adiacenti roris modo
 immiscetur. Talis igitur sanguis dispersus in
 locis inflammatione affectis, utpote extra con-
 ceptacula positus, cum nō possit ad pristinam
 remeare naturam, vel putrescit omnino, si ca-
 lor nativus est imbecillus, vel permixta que-
 dam alteratio sit, tum à causa naturali, tū ab
 ea quae prae-ter naturā est: naturalis enim causa
 concoquit, causa prae-ter naturam putrefacit:
 quo in conflictu, si natura superior evaserit
 (evicta fluxione contraria) haec quicquid hu-
 moris in partem procubuit, vel perspiratu dige-
 ret, quae curatio magis optāda est, vel cōcoquet:
 concoctione verò pus generabitur, quo tandem
 extra pulso à facultate alienorum expultrice,
 partes affectae ad statum naturalem redibant:
 sed si fluxio vicerit, corruptio sequetur victa-
 rum partiū. Ceterum ex ijs causis tū cōservan-
 tibus, tū putrefacientibus, vtra prae-pondeat in
 inflāmatione, signū hoc erit manifestū, vincen-
 tis quidem causa cōservātis pus quale describit
 Hippocrates: putrefaciēti autem, contrarium.



HIPPOCRATIS

PRAENOTIONVM

LIBER SECVN-

DVS.

De aqua inter cutem.

CAP. I.

ΟΙ δὲ ὕδρωπες, οἱ ἐκ τῶν ὀξείων νοσή-
μάτων πάσις κακός. ἔτι γὰρ τῷ πυ-
ρὸς ἀπαλλάσσειν, ἐπὶ δὲ οἱ τε εἰς
κάρτα καὶ θανατώδεις. ἄρχεται δὲ
οἱ πλεῖστοι ἀπὸ τῆς κενώσεως καὶ τῆς οσφύος. οἱ
δὲ ἀπὸ τοῦ ἥπατος.

Οἱσι μὲν οὖν ἀπὸ τῆς κενώσεως καὶ τῆς οσφύος
καὶ ἀρχαί γίνονται, οἷτε πόδες οἰδέουσι, καὶ διάρ-
ροιαί πολυχρόνιοι ἔχουσιν, ἔτι τὰς ὀδυώσας
λύουσι τὰς ἐκ τῶν κενώσεων καὶ τῆς οσφύος,
ἔτι τὴν γαστέρα λαπιάσσειν. ὁρόουσι δὲ ἀπὸ
τῆς ἥπατος ὕδρωπες γίνονται, βῆχες τε καὶ θυμὸς
τύπτουσιν ἐγγίνονται, καὶ ἔστιν ἐν αὐτοῖς πύκνυνται
ἄξιοι λόγου, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι, καὶ ἡ γαστήρ
ἐ διαχωρεῖ, εἰ μὴ σκληρὰ τι ἔσθῃς αἰσάνην,
ἔσθῃ τὴν κοιλίην γίνονται οἰδήματα, τὰ μὲν
ἐπὶ δεξιᾷ, τὰ δὲ ἐπὶ ἀριστερᾷ, ἐν μέσῳ τι καὶ
καταπανόμηναι.

Κεφαλὴ δὲ, καὶ χεῖρες, καὶ πόδες ψυχρὰ εἶναι
ταῖς,

τα, κακόν. τῆς τε καρδίης, καὶ τῶν πλῆθυσιν,
θεριῶν ἰόντων ἄριστον ἢ καὶ ὅλον τὸ σῶμα, θερι-
μόντε ἔσθαι, καὶ μεγάλτακόν.

Στρίφια δὲ καὶ ῥηιδίως ἢ ἀλγίοντα, καὶ
ἐν τοῖσι μετεωρισμοῖσι ἱλαρρὸν εἶναι· οἱ δὲ βα-
ρὺς ἰὼν φαίνεται, καὶ τὸ ἅλλο σῶμα καὶ τὰς χεῖ-
ρας ἐκ τῆς πόδας, ἐπικινδυνώτερον.

Εἰ δὲ πρὸς τὴν βάρει καὶ οἱ ὄνυχες καὶ οἱ δά-
κτυλοι πελιδνῶι γένουσι, προσδόκιμος ὁ θάνα-
τος παρανόησι· μεγαλύνοντο δὲ παντιγῶς οἱ
δάκτυλοι, καὶ οἱ πόδες, ἥσαν ὁλέθριοι τῶν πε-
λιδνῶν εἶσιν.

Ἀλλὰ καὶ τὰλλα σημεῖα σκίπτει δὲ καὶ ἡ
καὶ ὁ πτερυγίου φέρων φαίνεται τὸ κακόν, καὶ ἄλ-
λόπ τῶν πτερυγίων πρὸς ταῖσι τοῖσι ση-
μείοις ὑποδεικνύει, τὸ νόσημα εἰς ἀπόστασιν πρὸς
τῇ καὶ ἱλπίς· ὥς τε τὸν μὲν αὐθροποι πτερυ-
γίου, τὰ δὲ μελαγχρόντα ἐκ σώματος ἀποπτεῖν.

Ορεχίς δὲ καὶ ἀφδεία ἀνασπασμένη, πόνησι
χυρὸς σημαίνει, καὶ κίνδυνος θανάτου.

Aquæ portò intercutem, ex acutis
morbis obortæ, omnes malæ sunt. neq;
enim à febre liberant, & valde dolorosæ
sunt, ac letales. Incipiunt autem pleræq;
à laterum mollitie, & à lumbis : aliquæ
verò etiam ab hepate.

Quibus igitur à laterum mollitudine
& lumbis principia fiunt, his & pedes
in

intumescunt, & alui profluvia diuturna ipsos tenent, quæ neque dolores ex laterum mollitudine ac lumbis solvunt, & ventrem molliunt. quibus verò ab hepate aquæ inter cutem oriuntur, his tussis tussienti-que promptitudo accedit, & nihil memorabile expuunt, & pedes tumunt, & venter non egerit nisi dura, & coactus: & circa aluum fiunt tumores, aliqui in dextra, aliqui in sinistra parte, tum consistentes, tum confidentes.

Caput autem & manus, & pedes, si frigida sunt, malum est, vbi & venter, & latera calida sunt optimum verò est & totum corpus calidum esse, ac molle.

Cõueri autem facilè conuenit ægrotum, & in attollendo se leuem esse. Si verò grauis esse appareat, & reliquo corpore, manibus, & pedibus, magis periculosum est.

Si verò supra grauitatem ungues & digiti liuidi fiant, mors euestigio expectanda est: at si digiti ac pedes penitus nigrescant, minus perniciosi sunt quam liuidi.

Verùm & alia signa considerare oportet. Si enim facilè ferre videatur malum, & aliud quoddam ex salutaribus ad hæc signa subindicet, morbum ad abscessum
verti

verti spes est : ita ut æger quidem superstes mansurus sit , corporis verò partes nigræ factæ , casuræ .

Testes & pudenda reuulsa , dolores fortes significant , & periculum lethale .

Hydropis communis quædam causa est frustrata sanguificatio , quæ fit iecore vel per se affecto , vel per consensum . Nam iecur per magnas venas & nervos ventriculo & intestinis , & lieni copulatur , quæ dñ afficiuntur , ipsum quoq; affici par est . Sed ut intumescere pedes omnium aquæ inter cutem commune est , quia calor naturalis cum sit in eis debilis , ob distantiam à corde , non potest digerere quod ad pedes est missum pro nutritione , unde inflatio . Et quia sunt in loco. decliniori , humiditates aptæ sunt ad ipsos confluere : ita profluviū alui peculiare est ei Hydropi qui fit intestinis , & mesenterio phlegmone laborantibus , irritatis scilicet ipsis ad excernendum , vel à bilis copia illuc demissa , vel quia non distribuitur alimentum , sed corrumpitur ob calorem partium quæ inflammatione vexantur . In hydropi autem qui ab hepate est , cum neque intestina , neq; mesaraica venæ affectæ sint , nec corruptum in ijs alimentum sit , non sunt diarrhœæ , quinimo vix aliquid deicitur , sed ipsum hepatis tumor incumbens diaphragmati , &
facit

faciens angustiam pulmori, tuſſiendi cupiditatem inducit, vnde nihil effluu dignum expuitur. Porro si calentibus costis & ventre, externe partes frigent, id mali significant in morbis acutis, parum sanguinis in totum corpus permeare, plurimum verò eius in ea parte quæ inflammatione vexatur, includi, ac ob eam rem calorem ibi & inflammationem augeri, quæ pessima est constitutio. Ex qua e contrario optimam eam esse cognosce, in qua corpus omne molle pariter & calidum æquè est. Summa verò totius præſagitionis est, morbi collatio cum acri viribus: Si enim morbus fortior est, acri omnino morietur: Si debilior quàm acri vires, haudquaquam morietur, si modò nihil peccetur. Quemadmodum ferentes onera, aut grauari ab eis vix mouentur, aut si lenius appareat onus, innocuè ferunt: ita facultas, si fortis quidem fuerit, facillè corporis onus fert, vt haudquaquam ad mouendum corpus offendatur: si imbecilla est, vtpote grauata, vix corporis partes erigit. Grauitas enim partium præcipuum est indicium debilitati facultatis: Cuius extinctæ signa etiam sunt ungues ac digiti linidi, qui si nigrescunt, id fit, vel quia pars est mortificata, vel quia materia eò decumbit in abscessum. Caterùm vitalis facultas deficiens præ dolore, ad suam contrahitur originem: ita fit vt partes eam comitata conuel-

y

lantur,

lantur, convulsio autem hac extinctionem significat.

De somno.

C A P.

I I.

Περὶ τῶν ὕπνων, ὥς περ καὶ φύσει συνήθεις ἡ-
μῖν ἐσὶ, πλεὺν μὲν ἡμέραν ἐρηπζομένην καὶ πλεὺν
δὲ νύκτα, καθέδειδεν.

Ὦν δὲ εἴη τῶν μετεδιδλημένων, κάκιοι. ἡ-
κιστα δ' αὖ λυπίοις, εἰ κοιμῶντο τὸ πρῶτον τὸ
πλείον μέρος τῆς ἡμέρας.

Οἱ δὲ δὴ τούτους ὅ γε ἔνθα ὕπναι, πονηρότε-
ροί εἰσι.

Κάκιστον δὲ μὴ κοιμᾶσθαι, μήτε τὴ νυκτός, μή-
τε τὴ ἡμέρας· ἢ γὰρ ὑπὸ ὀδύνης τι καὶ πόθων ἀ-
νευπνίη, ἢ παραφροσύνη ἔσται ἀπὸ τούτους ὁ
σημείων.

Quod ad somnos attinet, quemad-
modum secundum naturam consuetum
nobis est, interdiu vigilare oportet, no-
ctu dormire: Si verò hoc fuerit transmu-
tatum, peius est. Minimè verò lædi æ-
ger poterit, si dormiat mane ad tertiam
partem diei: qui verò ab hoc tempore
fiunt somni, deteriores sunt. Pessimum
autem est non dormire, neque noctu,
neq; interdiu: aut enim præ dolore & af-
flictionibus, vigiliæ adsunt, aut delirium
aderit ab hoc signo.

Somni quantitatem ac durationem metietur optimè natura, et bona consuetudo. Verùm si diu noctuq; somnus interturbatur, ex insomnia magnum quoddam malum portenditur.

De diectione.

CAP. ICI.

Διαχώρημα δέ ἐστι ἄριστον, τὸ μεγαλὺ καὶ τι καὶ ξυνοσηκός. καὶ τὴν ὥρην, ἣν ἀπὸ καὶ ὑγιανόντων υποχώρει πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις, καὶ τοῖς λόγοις τῶν ἐπιστότων τοιαύτης γὰρ ἔσσης τὸ διαξόσθον, καὶ κάτω καὶ ἄνω ὑγιανόντων.

Εἰ γὰρ εἴη ὑπερὸν τὸ διαχώρημα, συμφέρει μήτε τεύξιν, μήτε πυκνὸν π εἶναι, καὶ κατ' ὅλην υποχωρίαν κατὰ τὸν ἀνθρώπου, καὶ τῆς ξυνοσηκίας ἐξανατάσας, καὶ ἀνεναντία αὐτῶν.

Εἰ γὰρ ἀνθρώπου πολλὰ καὶ διαχωρίαι, κινδυνεύει λειποθυμῆσαι. ἀλλὰ καὶ καὶ τὸ πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις, ἢ δὲ, ἢ τῶν τῆς ἡμέρας υποχωρίαν, καὶ δὲ καὶ τῶν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ὡς ἀπὸ σὺν ὁδῶν ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων.

Παχύνει δὲ καὶ τὸ διαχώρημα, ἔσσης πρὸς κρίσιν τῆς ἡμέρας καὶ πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις, καὶ μὴ λίαν δυσώδης.

Επιπρόσθετον δὲ καὶ ἔλκεται σπογγύλας διαξίται καὶ τὸ διαχώρημα, πρὸς κρίσιν ἰούσης τῆς ἡμέρας.

Δὲ γὰρ ἐν παντὶ τῶν ἡμερῶν, λιπαρὴ τὴν καὶ ὅλην εἶναι, καὶ ὅλην.

Egestio alui optima est, mollis & co-
hærens, & secundum horam, in qua
etiam à sano egerebatur. Iuxta copiam
verò, pro ratione ciborum ingestorum.
Tali enim contingente exitu, venter in-
fernus sanus fuerit.

Si verò liquida fuerit egestio, condu-
cit neq; stridere, neque frequentem esse,
& paulatim secedere. Delassatur enim
homo ex frequenti desessu, & vigilias
utique contraxerit.

Si verò sæpe aceruatim egerit, pericu-
lum est ne in animi deliquium incidat.
Quin & iuxta copiam ingestorum ege-
rere oportet, bis aut ter in die, & noctu
semel. Plura verò mane, quemadmodum
in consuetudine est homini.

Inspissari autem oportet egestionem,
morbo ad iudicationem tendente: sit au-
tem subfulua, & non valde graueolens.

Commodum est & lumbricos rotun-
dos cum egestionem prodire, morbo ad
iudicationem tendente.

Oportet autem in omni morbo mol-
lem esse vètre, & iusta mole præditum.

*A consistencia, quantitate, & tempore
quo deiectiones excernantur, argumentum
sumit optima deiectionis, quæ si mollis coa-*
clap

Εἰς αὐτὸν ἐστὶ, ὅτε ἐκ τοῦ χρόνου. secreta quo secunda
valetudine assuevit, pro copia ingesti cibi, ac
subrufa, nec admodum graueolens, indicat
non solum inferiorem ventrem benè valere,
sed nihil in eum aliundè, vtruta à iecore aut
liene, defluere quod molestum sit.

Genera malorum egestionum.

CAP. IIII.

Υδαεὶς δὲ κάρτα ἢ λευκὴν, ἢ χλωρὴν, ἢ
ερυθρὴν ἰχυρῶς, ἢ ἀφρώδεις ἀποχωρεῖν πονη-
ρὰ ταῦτα πάντα.

Ἐπὶ δὲ πονηρῶν, καὶ μικρῶν τε ἰόν, καὶ γλί-
χρην, καὶ λευκῶν, καὶ ὑπόχλωρον, καὶ λεῖον.

Τυτίων δὲ θανατὸν δέσσειν ἀντὶ τὰ μέλανα
ἢ λιπαρὰ, ἢ πύλα, ἢ ἰώδεια, ἢ κάκισμα.

Τὰ δὲ ποικίλα, χειρώματα μὲν τυτίων,
ἐλίδρια δὲ ἔσθιν ἡσσαν. ἐπὶ δὲ τὰ τοιαῦτα, ξυ-
σμητάδια, καὶ χολώδια, καὶ περσυσθία, καὶ μέ-
λανα, ποτὶ μὲν ὁμῶς διεξερχόμενα ἀκαήλοισι,
ποτὶ δὲ καὶ μέγας.

Φύσας δὲ ἀνὰ ψόφου καὶ παρῳήσιος διεξί-
ται, ἀριστὶ κρείστον δὲ, καὶ σιῶ ψόφου διελθῆν,
ἢ αὐτῇ ἀνελείωσ. καὶ ἔτω διελθῶσα, σημαίνει
ἢ ποτίειν τι τὸν ἀνθρώπον, ἢ παραφροσίειν, ἢ
μὴ ἔκων ὁ ἀνθρώπος ἔτω τίνος ἀφίσει τῆς φύ-
σεως ποιήσεται.

At verò aquosum valde, aut album,
aut pallidum, aut viride, aut vehemen-

ter rufum, aut spumofum ftercus egere-
re : hæc omnia mala funt.

Malum inſuper eſt & quod exiguum
eſt, & viſcoſum ac album, aut ſubviride
ac læue.

Hiſ verò magis lethalia fuerint ſtereo-
ra nigra, aut pinguis, aut liuida, aut æru-
ginofa, & malè olentia.

Quæ verò varia funt, diuturniora qui-
dem hiſ funt, nihilominus autem perni-
cioſa. Sunt autem talia, ramentofa, &
bilioſa & cruenta, & prafina, & nigra,
aliquando ſimul inter ſe excuntia, ali-
quando particulatim.

Flatum porrò ſine ſtrepitu ac crepitu
prodire optimum eſt. melius autem eſt
& cum ſtrepitu exire, quàm iſthic reuol-
ui. & qui ſic progreſſus eſt flatus, aut
dolere quid hominem ſignificat, aut de-
lirare : niſi ſua ſponte homo ita flatum
emittat.

*Aquofa deiectionis cruditatem : candida, qua-
li fieri in ictero eſt, nullam, aut valde paucam
bilem ad inteſtina deſluere ſignificat : nigra
verò ab atra bile ſic tingitur. Porrò pinguis
deijcitur, quoties pinguedo ab ignito calore cō-
ſumitur. Graueolentia putredinis eſt indicium.
Multiplicis coloris deiectionis multas indicat eſſe
aſe*

affectiones, & ob eam rem tempore apud est ad concoctionem, siquidem natura tanquam cum multis hostibus conflictura, multum temporis insumat oportet.

Præcordiorum dolor.

C A P. V.

Τὰς δὲ ἐκ τῶν ὑποχονδρίων πόνας τε καὶ κυρτάματα ἢ ἢ παρὰ καὶ μὴ ξυὲ φλέβων, λέει βορβορῶν ἐκ χολῆρος ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ καὶ μάλιστα μὲρ διεξιών ξυὲ κήπη τε, καὶ ἕρπ, καὶ φέση ἢ δὲ μὴ, καὶ αὐτὸς δὲ παλαιότερος, ὡφελίαι ὡφελίαι δὲ καὶ ὑποκαταβάς ἐς τὰ κάτω χόρτα.

Cæterum præcordiorum dolores ac tumores si fuerint recentes, & non cum inflammatione, soluit murmur in præcordio obortum, & maximè quidem si pertransierit cum stercore ac vrina ac flatu: Sin minus etià per seipsum transierit, iuuat, si ad inferas sedes deoluatur.

Murmur non solum spiritus indicium est, sed spiritus humori permixti. Quoties igitur egreditur spiritus ille flatuosus, aut nequaquàm egrediens descendit deorsum ad aliquam inferiorem sedem, hypochondria vindicantur utroq; accidente, tum doloris cruciatu, tum

etiam tumore, sed potissimum si cum urina
 & stercore vacuetur. Talis enim vacuatio nul-
 lum praeterea reliquit in hypochondrijs ex-
 crementum.

Urina.

CAP. VI.

Τὸ δὲ ὕρην ἀριστὸν ἔστι, ὅταν εἴη λευκή τε ἢ
 ὑπόλευκη, καὶ λεῖη, καὶ ὁμογενὴ παρὰ πάντα τὸν
 χρόνον, ἔς τ' ἂν κριθῇ ἡ νῦσος· σημαίνει γὰρ ἀ-
 σφάλαν τι, καὶ νόσημα ὀλιγοχρόνιον ἴσται.

Εἰ δ' Ἀφροδίποι, καὶ ποτε μὲν καθαροὶ ὕραιο-
 το, ποτὲ δ' ἐυφίσκεται τὸ λευκὸν καὶ λεῖον, χρο-
 νιωτέρως γίνεται ἡ νόσος, καὶ ἥσασιν ἀσφαλές.

Εἰ δ' εἴη τὸ, τε οὖρον ὑπερυδρον, καὶ ἡ ὑπό-
 σκσις αὐτὴς ὁμογῆ, καὶ λεῖη, πολυχρονιώτερον
 μὲν τῆτο τὸ πρῶτον γίνεται, συνθήμενον δ' ἐκάρτα.

Κεκοινώδεις δ' ἐν τρισὶν ὕρῃσιν αἱ ὑποσκά-
 σεις, ποικιλῶς τυτέων δ' εἰσὶ κακίαι, αἱ πιπυ-
 λώδεις· αἱ λευκαὶ δ' καὶ λεπτὰ, κάρτα φλαῦ-
 ραι· τυτέων δ' ἐπ' κακίας εἰσὶν αἱ πιτυρώδεις.

Νεφίλας ἐμφερόμεναι τρισὶν οὖροις, λευκαὶ
 γὰρ ἀραιαὶ, μέλαινα δ' ἐφλαῦρα. ἔς τ' ἂν δὴ
 πυρρὸν τε εἴη τὸ ὕρην καὶ λεπτόν, σημαίνει τὸ νό-
 σημα ἀπειπλον εἶναι. ἢ δ' καὶ πολυχρόνιον εἴη
 τῷ ὕρην ἔον, κίνδυνος μὲν ἢ δυνήσεται ὁ αἰσθη-
 τὸς ἀφροδίσου, ἔς τ' ἂν πιπαιθῇ τὸ ὕρην.

Θανατωδέστερα δ' ἐν τῶν ὕρων, πάντε δυνώδεια
 καὶ ὑδατώδεια, καὶ μέλαινα, καὶ παχέα.

Ἐπ' οὖν τρισὶ μὲν ἀνδράσι καὶ τῇσι γυναῖξι, πᾶσι
 μέλα

μέλανα τῶν ὕρων κάκιστα· τῶσι δ' ἐπαθόμοισι, καὶ ὑδατῶδία.

Οἱ ὅσοι δ' ἂν ἔσθ' λεπτὰ καὶ ὥμὰ ἔρυσσι πυλινὸν χρόνον, ἢν τὰλλα ὡς ἀδελφισμένοις σημεία ἦ, ἰστέοισιν ἀπόσεισι δ' ἐπεσοδέχας εἰς τὰ κάτω τ' φρενῶν χωρία.

Καὶ τὰς λιπαρότητας δὲ τὰς ἄνω ὑφισταμένας, ἀσχετοειδίας μέμφεται· στυτήξιος γὰρ σημεία.

Σχεπτὴν δὲ καὶ τῶν ὕρων ἐν οἷσι αἰνεφίλας ἢν τε ἄνω, ἢν τε κάτω ἴωσι, καὶ τὰ χρώματα ἐκθία ἴχουσι καὶ τὰς μὲν κάτω φερόμενας ἐκὼ τοῖς χρώμασιν, οἷσιν εἴρηται, ἀγαθὰς εἶναι νομίζειν καὶ ἱκανίειν. τὰς δὲ ἄνω ἐκὼ τῶσι χρώμασιν, οἷσιν εἴρηται, κακὰς εἶναι, καὶ μέμφεται τὰς τοιάς δε.

Μὴ ἐξαπατάτω δέ σε, ἢν γε ἡ κύστις πένεση ἴχουσι, τῶν ὕρων τὰ τριαῶτα ἀποδιδῶ· ἢ γὰρ τὸ ὅλον σύμμετρον σημείον ἐστίν, ἀλλ' αὐτῆς καὶ τῆς οὐκ αὐτῆς.

Optima verò est vrina, quum fuerit alba subfidentia, & lævis, & æqualis per totum tempus, donec indicatus fuerit morbus: significat enim & securitatem, & morbum fore breuem.

Si intermiserit, & aliquando quidem pura meiatur, aliquando verò subfidet album ac læue, diuturnior fit morbus, &

minus securus. Si verò fuerit & vrina subrubra, & subsidentia ipsius similis, & laevis, diuturniorem quidem hæc morbum quàm prior significat, sed valde salutarem.

At subsidentia in vrinis crassiores potentæ partes referentes, prauæ sunt. His autem peiores sunt laminosæ. Albæ verò & tenues valde malæ sunt. Verùm his deteriores sunt furfuraceæ.

Nubeculæ quæ feruntur in vrinis, albæ quidem bonæ sunt, nigræ verò malæ.

Quandiu verò fulva fuerit vrina & tenuis, morbum inconcoctum esse significat. Si verò & diuturna fuerit talis existens, periculum est ne sufficere homo possit, donec vrina fuerit concocta.

Lethaliores autem sunt vrinæ, & foetidæ, & aquosæ, & nigræ, & crassæ.

At tum in viris, tum in mulieribus nigræ vrinæ pessimæ sunt, in pueris autem aquosæ.

Quicumque vrinas tenues & crudas metiunt multo tempore, si alia veluti superstitibus futuris signa fuerint, ijs abscessum expectare oportet ad locos infra septum transversum.

Sed & pinguedines supernè instantes, arancorū telis similes, dampnare oportet:
sunt

sunt enim colliquationis signa.

Considerare verò conuenit in vrinis in quibus nubeculæ sunt, an supernè aut infernè sint, & quales habeant colores. Et quæ quidem deorsum feruntur, cum coloribus relatis, eas bonas esse putare, ac laudare: quæ verò sursum feruntur, cum coloribus relatis, malas esse, & tales damnare.

Nec verò decipiat te, si vesica morbum aliquem habens, eiusmodi vrinas reddiderit: non enim totius corporis signum est, sed ipsius per se vesicæ.

Vt facultatis naturalis, quæ in ventre est, indicia agnoscuntur ex ijs quæ quotidie deijciuntur, ita eius quæ in iecore ac venis est ex vrina. In hac enim indicia clara sunt partim optima, partim imperfecta, partim in totum frustrate concoctionis, quemadmodum & in ijs quæ deijciuntur. Præterea vt in deiectionibus signa sunt aliorum affectuum, quàm ventris, ita vrina alios affectus quàm venarum & hepatis, indicare potest. Vrina ergo faciens sedimentum album, leue, & æquale, securitatem significat, & morbum breui soluendum, cum signa habeat concoctionis: subrubra verò cum sedimento subrubro & leui, indicat exuperantiam sanguinis non exquisitè elaborati.

borati. Igitur quia optimi humoris exuperantia est, idcirco sine periculo est: sed quia humidior eget concoctione. Porro sedimentum crassius, laminosum, & furfuraceum, exassato sanguine, contingit à febrili calore atq; inaequaliter colligatum corporibus. Album verò & tenue à spiritu flatuoso fit, tenacius admixto humorum excremento semicocto.

Nubecula sublimamentum urinae est: quod si nigrum est, id ob vehementem accidit frigiditatem, qua ratione sanguis concretus nigrescit: aut propter exuperantem fit calorem: etenim sanguis nigrescit si adurit. Et qui diutius in sole versantur aestivo; nigri redduntur. Ergo iure nigrum sublimamentum damnatur, probaturq; album. Sed in urinis contenta quantò magis deorsum feruntur ad fundum vasis, tantò meliora sunt, lenantur enim sursum à vaporoso spiritu. Optima est urina subaurea vel subcrocea colore, substantia mediocri, proportionem respondens potui factò, hypoflasi alba, levi, aquabili, in qua nulla innatet bulla, neq; tuberculum aliquod subsideat, non inhereat matula, neque quicquam complicitur ex eis qua solent inferri familia capillis & ramentis, & alijs eius generis. Quantum unaqueq; urina ab hac declinaverit, tantum ab optima sanitate recessit. Tenuis enim aquosa morbum crudum significat,

ficat, & naturalis facultatis debilitatem: Crassa frigidorum & crudorum multitudinem: nigra obstructionem, & humorum assationem: fætida eorundem putrefactionem, sicut desuper pinguis consumptionem indicat. Verùm vrine prave, vt interdum humorum in toto corpore existentium vitia, & facultatis concoëtriciis ostendunt, ita renum & vesicæ tantùm nonnunquam affectum declarant, non humorum aut facultatis. Quinimo fieri potest vt totum animal per vesicam & renes expurgetur, & abscessus etiam cum vrina excernatur, eò videlicet materia derivata.

Vomitus.

CAP. VII.

Εἰς τις ὁ ἀφιλμώματος, ὁ φλέγματος καὶ χολῆς ἐνμειμιγρός, καὶ μὴ παχύς κάρτα, μηδὲ πολὺς ὡς μάστιξ· οἱ γὰρ ἀκρετέτεροι κακίαι εἰσὶν.

Εἰ δὲ εἴη τὸ ἐμυέδρον πρᾶσσειδες ἢ πέλιοι, ἢ μέλαν, ὁ, τι ἂν ἢ τυτέων τ' χρωμάτων τομίζον χρὴ ποιηθὲν εἶναι.

Εἰ δὲ καὶ πάτα τὰ χρώματα ὁ αὐτὸς αἰθρῶς ἐμίει, κάρτα ὀλιθριοι τῷ τ' γόνι). τάχις τε γὰρ θαλάσσιοι σημαίνει τὸ πέλιοι τ' ἐμυσμάτων, εἰ ὅζαι δυσώδεις.

Πᾶσαι δὲ αἱ ἐπίσσαι πρὸς τὸ δυσώδεις ὀσμαι, καὶ καὶ ἐπὶ πᾶσι τῶσι ἐμυομόρσιον.

Vomitus commodissimus est, ex pitui

ta ac bile quam maximè permixtus, & non crassus valde neq; multus: nam meraciores, deteriores sunt.

Si verò id quod vomitu reiectum est, prasini fuerit coloris, aut liuidum, aut nigrum: quicūque horum fuerit colorum, malum esse putandum est.

Si verò omnes colores idem homo vomit, valde perniciosum hoc est. Celerimam enim mortem significat liuidus vomitus si graueolens fuerit.

Omnes verò subputridi ac foetidi odores, in omnibus vomitibus mali sunt.

Syncerus in vomitu humor apparens, peior est: nam ut biliosus caloris copiam immodicam, sic pituitosus indicat frigus. Quinetiam syncerus humor crassior redditur mixto, pituitosus quidem propter frigiditatem quasi concretus, biliosus verò propter abundantem calorem exuētus & frixus: Calidum enim exugit, frigidum astringit. Porracem autem vomitus quorundā esculentorū in ventriculo cruditatem, aut calorem præter naturam ratione agrotationis indicat. Et quantò plures præter naturam colores, seu nigri, seu liuidi apparent, tantò id deterius est, præsertim si cum aliqua alia mala qualitate tetri odoris apparent.

Sputum.

C. A. B. VII. 1.

Πύλον γὰρ ἐπὶ πᾶσι τῶν ἀλγέμεσι, τῶν

σι δὲ τὸν πλῦμα καὶ τὰς πλῆρες, ἰσχύως
 τι αἰσπύουσι, καὶ δύπετέως συμμιγνύον-
 τι φαίνοσι τὸ ξανθόν, ἰσχυρῶς. τῷ πνέματι
 εἰ γὰρ πολλὰ ὕστερον μὲν τὴν ἀρχὴν τῆς ὀδυώσεως,
 αἰσπύουσι ξανθὸν ἰόν, ἢ πυρρὸν, ἢ πολλὴν βῆχην
 περιέχον, καὶ μὴ ἰσχυρῶς συμμιγνύον, κά-
 κιον γίνεται τὸ, τε γὰρ ξανθὸν ἀκρητοῖ ἰόν, κιν-
 δυνώδες τὸ ἢ λευκὸν καὶ γλίχρον καὶ σπυγ-
 λον, ἀλυσσιτελές. κακὸν δὲ καὶ τὸ χλωρὸν ἰόν-
 κάρτεα καὶ τὸ ἀφρώδες. Εἰ γὰρ εἴη οὕτως ἀκρητοῖ,
 ὥστε καὶ μέλαν φαίνοσι, δεινότερόν ἐστι τῶν
 εἰρηνικῶν. Κακὸν γὰρ καὶ ἢ μηδὲν αἰσπυδαίρηται,
 μηδὲ πρὸς τὴν ὀπλῶσαν, ἀλλὰ πλήρης ἰὼν ζεῖ.
 ἐν τῷ φάεσσι.

Sputum in omnibus doloribus qui-
 sunt circa pulmonem & costas, citò &
 faciliè expui convenit, & flauum sputo
 valde pernixtū apparere. Si enim longè
 post principium doloris, expuerit quod
 flauum est, aut rufum, aut quod mul-
 tam tussim inducit, & non valde per-
 mixtum est, deterius est. Nam & flauum
 merum periculosum est: & album, & vis-
 cosum, & rotundum, inutile est. Malum
 est & quod viride est valde, itemq; palli-
 dum & spumofum. Si verò ita fuerit me-
 racū, vt etiam nigrū appareat, hoc ipsum
 deterius est quàm illa: malū etiam est si
 nihil repurgetur, neq; pulmo aliquid eci-
 ciat, sed plenius in gutture ferueat.

θανάτω διέταξιται οἱ πνευμογιστελεῖσιν.

Αἷματι δὲ συμμιμνῆσιν μὴ πολλῶ πύελον
ξανθὸν ἐν γῆσι περπλυμνηγῶσι, ἐν ἄρχῃ
μὲν τὸ νέκτα πλούδιον πεινθηκὸν καὶ κάρτεσσι ὀφει
λὲς ἐσδομαίῳ δὲ ἰόντι καὶ παλαιότερον, ὅσον
ἁσφαλές.

Πάντα δὲ πύελα ποτηρὰ ἐσιν, ὅκδοσα ἂν τιμὴ
ὀδυῶν μὴ παύη· πάκιτα δὲ τὰ μέλαινα, ὡς
ἀφ' ἀγέλαπται· τὰ δὲ παύονται ὀδυῶν, παύ
ται ἀμείνω σάα πνέοντα.

Grauedines & sternutationes in omni-
bus circa pulmoné morbis & antecede-
re & succedere, malū. At in aliis morbis
lethalibus sternutationes prosunt. Spu-
tum autem flauum sanguine permixtum
non multo, si in pulmonis inflāmatione
in principio morbi reiiciatur, salutare
est & valde prodest. Si verò septimo die,
aut posterius, minus securum est. Om-
nia spūta mala sunt quæ dolorem non se-
dant. Pelsima verò sunt nigra, sic ut scri-
ptum est. Quæ dolorem sedant omniū
optima existunt.

Grauedines ac defluxiones in morbi quī
affligunt in pulmone, non esse bona indicia
semper existimare oportet. Nam anteceden-
tes, pulmonem malis humoribus implent, pro-
cedente verò morbo apparentes gravem affe-
ctum

Etum pulmonis indicant, & caput ab eo laesum significant. Porro sternutationes ut plurimum grauedinibus comites sunt, & vehementer utiq; totum thoracem commouentes, pulmonem aliquo modo ledunt. At verò in alijs morbis si posterius appareant, ostendunt salutem, licet lethalis morbus quantum ad alia signa attinet, habeatur: indicant enim concoctionem ac robur excretoriae in cerebro facultatis, à qua in nares flatuoso spiritu excreto pariter cum alio humore, sternutatio fit. Sputum in pulmonis morbo si commixtis humoribus coctionis signa quaedam habeat, salubre est: sed si id non accidat, periculum exolutionis virium imminet, antequàm concoquatur, & ob eam rem minus securum pluribus diebus permanere sputa & sincera & semicocta. Quae verò sedant dolorem, ea sputa maximè laudabilia sunt, quoniam excreta tempore: nam quae è corpore excernuntur, ea potissimum facilitate tolerantia commendantur.

Suppuratio.

CAP. X.

Οκίσσε δὲ τῶν ἀλγυμμάτων ἐκ τετάρτῃ τῶν χειρῶν μὴ πιύοντα, μήτε πρὸς τὰς τῶν πινύλων κατάρσας, μήτε πρὸς τὴν τῆς κελύφης ἐκκώπρωσιν, μήτε πρὸς τὰς φλεβοτομίας πῃ καὶ φρεγμακείας, καὶ διαύτας, εἰδέναι δὲ ἐκ πυρρῆς τε.

Τῶν

Τῶν δ' ἐκφυγμάτων ἀκούσαι μὲν ἐπὶ χολῶδους
 ἰόντες ὁ πτύελος, ἐκπύσκειται, ὁ δὲ θρία κάρτεσσι,
 ἢν τε ἐν μέρει τὸ χολῶδες τῷ πύρρῳ ἀναπτόοιτο,
 ἢν τε ὁμοῦ. μάλιστα δ' ἢν ἀρξῆται χωρεῖν τὸ
 ἐμπύημα, διὰ τῆς πύρρῳ πτύελου, ἐδοδμαίει
 ἰόντες ὁ νοσήμαρτος ἐλπίς δ' ἐπὶ τὸν τοιαῦτα πύρρῳ
 οντα, ἀποθανεῖαλ τεσσαρισκαίδεκαταῖον, ἢν
 μή π αὐτέα ἐπιγίνηται ἀγαθόν.

Εἰ δὲ τὰ μὲν ἀγαθὰ τάδε· ὁ πτύελος φέ-
 ρει τὸ νόσημα, ὁ πύρρῳ εἶναι, τῆς ὁδύτης ἀπὸ
 λάχθαι, τὸ, τε πύρρῳ ρηϊδίως ἀναβήσκειν, τὸ
 τε σῶμα ἐμαλῶς φαίρεαλ, θερμόν τε εἶναι καὶ
 μαλθακόν, καὶ δὲ ψαῖν μὴ ἔχειν, ἔρεα τε καὶ ἀλ-
 χωρήματα, ἔσπυρτος, καὶ ἰδρωτὰς, ὡς ἀλ-
 γαπται ἔχεται εἰδέναι ἀγαθὰ ἰόντα ἐπιγί-
 νει· ἔτω μὲν γὰρ ἀπάντων τῶν ἐπιγινομένων,
 οὐκ ἂν ἀποθάναι ὁ ἄνθρωπος.

Ἦν δὲ τὰ μὲν τρι αὐτίαν ἐπιγίνοιτο, τὰ δὲ
 μὴ, ὁ πύρρῳ χροῖον ζήσας ἢ τεσσαρισκαίδεκα
 ἡμέρας, ἀπέλοιτ' ἂν ὁ ἄνθρωπος.

Κατὰ δὲ τὰ εὐωνύα τῶν ἐπιγίνομενων φέ-
 ρει τὸν νόσον, πύρρῳ μείζων καὶ πυκνὸν εἶναι
 τὸν ὁδύτην μὴ παύεαλ, τὸ πύρρῳ μόλις ἀνα-
 βήσκειν, διψῆναι κάρτα, ὁ, τε σῶμα ὑπὸ πυρρῳ
 αἰσινάλως ἔχεται, καὶ τὴν μὲν κριλίην καὶ τὰς
 πύρρῳ, θερμὰς εἶναι ἰσχυρὰς. τὸ δ' ἐμύρρῳ
 καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὰς πόδας ψυχροῦς· ἔρεα δὲ
 καὶ ἀλ-
 χωρήματα, καὶ ἔσπυρτος, καὶ ἰδρωτὰς, ὡς
 ἀλ-
 γαπται ἔχεται εἰδέναι κακὰ ἰόντα ἔ-

τως γὰρ εἰ ἐπιγνώσῃτο π. τῆς πτυίλων τετρίων, ἡ-
πάτοις ἀνὸς ἀνδρῶν ποσ., πρὶν ἢ εἰς τὰς ποσα-
ρισκαίδεκα ἡμέρας ἀφικέσθαι, ἢ ἐν ταῖς αἰ-
δεκατηῶς. ὅτως ἔν. συμῆσθαι καὶ χεῖρ, ὡς τοῦ
πτυίλων τετρίων θανατώδους ἰόντος μάλα, καὶ ἐ-
περὶ αὐτὸν εἰς τὰς ποσαρισκαίδεκα ἡμέρας.

Τὰ δὲ ἐπιγνώσῃ τε κακὰ καὶ ἀγαθὰ ξυλ-
λογισμένον ἐν τετρίων χεῖρ τὰς περὶ ῥήσεις
περὶ αὐτὸν ὅτι γὰρ αὐτὸς πρὸς ἀληθείαν μάλα.
Αἱ δὲ ἄλλαι ἐκπύσεις ῥήσεων αἱ πολλῆς, αἱ
μὲν εἰς αὐτὴν, αἱ δὲ περὶ αὐτὴν, αἱ δὲ ποσαρι-
σκαίδεκα, αἱ δὲ περὶ αὐτὴν εἰς ἑξήκοντα ἡμέρας
ἀφικέσθαι.

Επισκίπτει δὲ καὶ τὴν δέχνη τῆς ἐμπύσης
ποσ. ἰσθῆ. λογισμένον, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἢ τῆς
πρῶτης ἀνδρῶν ποσ. πύριξεν ἢ εἴποτε αὐτὸν
πρῶτον ῥῆσις ἔλαβε καὶ εἰ φάινται αὐτὸς τὸ δόλωσε
αὐτὸν βάρους μεγάλου ἐν τῇ τῇ πρὸς ἐν τῇ ἡλυν-
ταῦτα γὰρ ἐν δέχνησι γίνονται τῶν ἐμπυημάτων.

Εἰς ἔν. τουτῶν τῶν χεῖρων τὴν ῥῆσιν καὶ
προσδεχέσθαι τῶν ἐμπυημάτων ἰσθῆ. εἰς τὴν
χεῖρ τὴν τὴν περὶ αὐτὴν.

Εἰ δὲ εἴη τὸ ἐμπύημα ἐπὶ θάλασσαν μεῖον,
πρίν τε καὶ κατὰ μανθάνει καὶ ἐπὶ τετρίοις,
μήτις ἐχθρὸς ἀλγος ἐν τῇ ἐπερὶ πύριξεν, καὶ ἢ
θρῆσι περὶ ἢ τὸ ἐπερὶ τῇ τῇ πύριξεν, καὶ ἢ
μὲν ἐπὶ τὸ ὕγιον πύριξεν, ἢ τῇ πύριξεν, ἢ τῇ
τῇ πύριξεν βάρους ἐκείνου ἐν τῇ πύριξεν ἢ γὰρ
εἴη τῇ πύριξεν, ἢ τῇ πύριξεν ἐπὶ τῇ ἐμπύσει, ἐπὶ τῇ
χεῖρ

ἡγίων αὖ πάλιν τὸ βάρος γίνηται.

Quicumq; dolores ex his locis non sedantur, neq; ad sputorum purgationes, neque ad stercoreum alui subductionem, neq; ad venæ sectiones, & victus rationem, & medicamenta, eos ad suppurationem verti sciendum est. Ex suppurationibus quæcunq; dum sputum adhuc biliosum est, suppuratur, perniciosæ valde sunt, siue biliosum illud in parte, siue simul cum pure expuatur: & hoc potissimum si morbo ad septimum diem progresso, suppuratio ad hoc sputo procedere incipiat. Timor autem est eum qui talia expuit, moriturum esse decimaquarta die, si non aliquod bonum signum ipsi acciderit: sunt autem bona hæc, facile ferre morbum, bene spirare, à dolore liberatum esse, sputum tussiendo facile reii cere, corpus æqualiter calidum ac molle apparere, sitim non habere, vrinas, & alui egestionem, & somnos, & sudores, velut descriptum est, hæc singula nosse conuenit accidere: Nam omnibus his ita contingentibus homo non morietur. Si verò aliqua ex his accesserint, aliqua nō, non ampliore tempore vita producta, decimaquarta die homo peribit. Porro ma-

la signa his cōtraria sunt, ægrè ferre morbum, spiritum magnum & densum esse, dolorem non sedari, sputum vix tussiendo reiici, siti infestari, corpus inæqualiter à febre teneri, ventrem quidem ac costas fortiter cal fieri, frontem verò & manus & pedes frige fieri. Vrinæ autem & alui excrementa & somnos & sudores, velut descriptum est. Hæc singula nosse oportet mala esse. Quicquid enim horum iam dicto sputo supervenerit, hominem moriturum significat, priusquam ad decimumquartum diem pervenerit, aut nono die, aut vndecimo. Sic igitur coniecturam facere oportet, quòd hoc sputum lethale sit valde, & non perducatur ad decimumquartum diem. Proinde & bona & mala signa expendentem ex his prædictiones facere oportet: ita enim potissimum veritatem consequi quis poterit. At verò aliæ suppurationes rumpuntur, plurimæ quidem vigesimo die, aliæ trigesimo, aliæ quadragesimo, aliquæ verò ad sexaginta dies perveniunt. Considerare oportet suppurationis futuræ principiū, suppuratione facta ab ea die qua primum homo febricitavit, aut si fortè ipsum primum rigor apprehendit, etsi pro dolore gravitatem sibi

bi factam esse dixerit, in eo loco in quo dolebat: hæc enim in principiis suppurationum fiunt. Ex his igitur temporibus eruptionem suppurationum fore ad prædicta tempora expectandum est. Si verò suppuratio fuerit in altero latere solùm, vertere & considerare oportet in his num aliquem habeat dolorẽ in altero latere, & an alterũ altero sit calidius, & reclinato ægro in latus sanum, interrogare ipsum an videatur ipsi graue quid ex superno latere incumbere: Si enim hoc fuerit, in altero est suppuratio, in quo granitas affuerit.

Affectus qui in thorace ac pulmone non desinunt, adhibitis omnibus remedijs, eos suppuratos expectabis (Suppurationem autem intellige puris inter thoracem & pulmonem effusionem.) Porro qui purulenta septima die expuerit, non tamen sola, neq; toto die, sed, aut cùm eis biliosum aliquid, aut sine materia purulenta biliosum solùm expuerit, hic ne decimo quarto die intereat periculum est: Quòd si bona signa accedant, præscriptus mortis terminus in maius temporis spatium proferetur: Si verò mala, ante decimum quartum diem morietur. Caterùm bona malæve signa, persequitur ipse postea. Si cui enim con-

ualefcendum eſt, omnia bona indicia adſint
neceſſe eſt : Si moriendum, vel unum adefſe
malum ſufficiet. Alia ſuppuraciones ſunt,
qua nec in thorace ſunt, nec bilem immixtam
habent, nec ſeptimo rumpuntur, ſed diutius
immorantur. Quarum differentia ſumuntur
à loco patiẽre, & ab humore morbum commit-
tente : Caliditas enim & loci & humoris ce-
leritatem motus, frigidity tarditatem opera-
tur. Sumuntur etiam indicationes ab ætate,
natura, tempore, regione, conſtitutione & vi-
ribus ægri. In omnibus hiſ calidus humor ti-
dus, frigidus tardius ſuppuratur.

Quibus ſignis cognoscuntur putulenti.

C A P. X I.

Τοὺς δὲ ξέμπαντας ἐμπύους γινώσκουσι καὶ
τρεῖς δὴ τρεῖς σημεῖοισι πρῶτον μὲν, εἰ ὁ πυρε-
τὸς σὺν ἀφίησιν, ἀλλὰ τὴν μὲν ἡμέραν λαπτός ἔ-
χει, πλεὺς δὲ νύκτα πλείων.

Καὶ ἰδρῶτες πολλοὶ ἐπιγίνονται, βῆχες τε καὶ
θυμὸς ἐγγίνονται αὐτέοις, καὶ ἀποκτύουσι ε-
δει ἀξίον λόγου.

Καὶ οἱ μὲν ὀφθαλμοὶ, ἱσχυροὶ γίνονται, αἱ δὲ
γνάθοι, ἐρυθμήματα ἔχουσι.

Καὶ οἱ μὲν ὄνυχες τῶν χειρῶν γερνοῦνται
οἱ δὲ δάκτυλοι διεμαίνονται, καὶ μάλιστα ἄκροι,
καὶ σὺ τοῖσι ποσὶν οἰδήματα γίνονται.

Καὶ σπένει σὺν ἐπιθυμίαις, καὶ φλύκται

ται γόνοι) ἀνὰ τὸ σῶμα. Οὐδένα μὲν ἔνι ἐλχε-
ρίζει τῶν ἱμπυημάτων, ἔχει τὰ σημεῖα ταῦτα,
καὶ πισδύειν αὐτέοισι χρὴ κάρτα.

Οὐδένα δὲ ὀλιγοχρόνιά ἐστι, σημεῖα δὲ τυτίων,
ἢ πῖπι φαίνεται, οἷα καὶ ἴδουσιν ἐν δόχῃσι γινο-
μένοισι. ἄμφω δὲ καὶ ἢ πῖ δυαπνύστερος ἢ ὁ αὐ-
θραπος.

Τὰ δὲ παχύτεροι αὐτέων καὶ βραδύτερον
ῥηγνύμενα, τῆς δὲ γινώσκου χρεή. ἢ μὲν ὁ πό-
τος ἐν δόχῃσι γίνῃ, καὶ ἡ δύσπνοια, καὶ ἡ
βῆξις, καὶ ὁ πτυαλισμὸς διατείνῃ, ἐς τὰς εἰκροσι
ἡμίρας ἔχων, πρὸς δὲ ἔχοντα τὴν ῥῆξιν, ἢ καὶ
ἐπὶ πρὸς θέν. ἢ δὲ ἡσυχάστερος ὁ τίτος ἢ, καὶ
τὰλλα πάντα, τυτίοισι καὶ λόγῳ τυτέων πρὸς
δέχοντα τὴν ῥῆξιν ἐς ὕστερον.

Γίνονται δὲ αἰσάκη καὶ πόνοι, καὶ δύσπνοια,
καὶ πτυιλισμοὶ πρὸς τὸ πύον ῥῆξις.

Περὶ γινώσκου δὲ ἱσχυτέων μάλιστα μὲν οὖς ἂν ἁ-
φῇ ὁ πυριτὸς αὐθήμερον μὲν τὴν ῥῆξιν, καὶ σι-
τίων παχύνει ἐπιδυμῶσι, καὶ δὲ ψῆς ἀπηλα-
μύτοι ἴωσι, καὶ ἡ γαστήρ σμικρὰτε καὶ ξυωσι-
χότα ὑποχωρεῖ, καὶ τὸ πῦον λευκόν τε καὶ λεῖον
καὶ ὁμόχροον ἢ, καὶ φλίγματι ἀπηλαμύτοι,
καὶ αἱτε πόιν τε καὶ βηχὸς ἱσχυρῆς αἰσάκηται
εἶτα.

Λεῖται μὲν ὕτως καὶ τάχιστα ἀπαλλάσσουσιν
ἢ δὲ μὴ, οἷσιν ἂν ἐξυπέτω τυτέων γίνηται.

Απόλλυται δὲ οὖς αὐτὸ ὅ, τε πυριτὸς μὴ ἁ-
φῇ, ἢ ὀκίῃσι αὐτέας ἀφίεναι, αὐθις φαίνεται

αἰσθησιν ἀνθρώπου· καὶ δὴ ψαν μὲν ἔχουσιν, σπῖον
 ὅ μὴ ἐπιθυμῶσι· ἔη καὶ λίαν ὕψος ἢ καὶ τὸ πῶς
 χλωρόν καὶ πύλον πύην, ἢ φλογματώδεις καὶ ἀ-
 φρωδείς. ἢν ταῦτα πάντα γίγνηται, ἀπόλλυται.

Οπόσοις δ' ἂν θυτίαν, τὰ μὲν ἐπιχρόνται,
 τὰ ὅ μὴ, οἱ μὲν αὐτῶν ἀπόλλυται, οἱ δ' ἐν
 πολλῷ χρόνῳ ἀφελγίνονται. ἀλλ' ἐκ πάντων
 τῶν τεκμηρίων ἔ' ἰόντων ἐν ταῦτοις, σημαί-
 νει καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι.

Οπόσοις δὲ ἀποσώσις γίγνεται ἐκ τῶν
 ἀρεσολογικῶν νοσημάτων, παρὰ τὰ ὦτα,
 καὶ ἐμπύκνουν ἐς τὰ κάτω χεῖρα, καὶ συρλγού-
 νται, ὅτε δὲ ἀφελγίνονται.

Επισκέπτεσθαι δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα, ὅτε ἢ
 ὅ, τε πυρετὸς ἔχη, καὶ ἡ ὀδυνὴ μὴ παύνηται,
 καὶ τὸ πύλον μὴ ἐκχωρήσῃ καὶ λόγῳ, μηδὲ χε-
 λωδείς καὶ τῆς καλῆς διαχωρήσις, μηδὲ ὁ-
 λυτὸν τε καὶ ἀκρητὸν γίγνηται, καὶ μηδὲ τὸ ὕρον
 πούλῳ τε κάρπῃ καὶ πολλῇ ὑπόστασιν ἔχον ὑψη-
 ριότητι δὲ ἀφελγηκῶς ὑπὸ ἔ' λοιπῶν πάντων
 τῶν ἀφελγηκῶν σημείων, ταῦτοις καὶ τὰς τοι-
 αῦτας ὑποστάσεις ἐλπίζειν ἴσασθαι γίγνεται δὲ
 καὶ μὲν ἐς τὰ κάτω χεῖρα, οἷσι αὖ ἀφελγὲς τὰ ὑπο-
 χόνδρια τῶν φλέγματός περὶ γίνονται· καὶ δὲ αὖτις
 οἷσι τὸ ὑποχόνδριον λαπαρόν τε καὶ αὐτῶν διὰ
 διατελήσῃ· δύσπνοια δὲ πῶς χρόνον χυρόμενος
 παύσῃ ἄτε φανερῶς προσφάσιος ἄλλης.

Ceterum omnes suppuratos ex his
 signis

signis cognoscere oportet: Primùm quidem si febris non dimittit, sed per diem quidem tenuis est, noctu verò vehementior, & sudores multi oboriuntur, tussisq; ac tussiedi promptitudo ipsis adest, & nihil memorabile expuunt, & oculi caui fiunt, & maxillæ ruborem contrahunt, & vngues quidem manuum curuantur, digiti verò calescent, & potissimum summi, & in pedibus tumores fiunt, & cibos non appetunt, & pustulæ per corpus nascuntur. Quæcunque igitur suppurationes diuturnæ sunt, hæc signa habent, & fidem ipsis valde habere oportet: Quæ verò breues sunt, ex his signis cognoscere oportet, si quid apparuerit ex his qualia in principiis fiunt: Simul autem & si aliquanto difficiliter spirauerit homo. At verò quæ ex ipsis citius & tardius rumpuntur, his signis cognoscere oportet: Siquidem enim dolor in principiis fiat, & spirandi difficultas, & tussis, & spuitio persequens ad vigesimum diem pertingat, eruptionem tunc expectare oportet, aut etiam prius. Si verò quietior fuerit dolor, & alia omnia pro huius ratione, eruptio posterius expectanda est. Necesse verò est accedere & dolorem, & spirandi difficultatem, & spuitionem ante
puris

puris eruptionem: Ex his autem maximè superstites manēt hi, quos febris eodem post eruptionem die dimiserit, & qui cibos statim appetuerint, & à siti liberati fuerint, & si venter parua & compacta egresserit, & pus album, & læue, & eiusdem coloris fuerit, & à pituita liberum, & citra dolorem ac tussim fortem, repurgetur. Ac optimè quidem sic ac celerimè liberantur: Sin minus, hi quibus proxima his contigerint. At verò intereunt ij quos febris non dimiserit, aut vbi ipsos dimisisse putata fuit, rursus recalcensens apparuerit, & qui sitim quidem habuerint, cibos autem non appetuerint, & si venter liquidus fuerit, & pus pallidum siue viride & linidum expuerint, aut pituitosum & spumosum: Si hæc omnia contigerint, intereant. Quibus verò ex his quædam accesserint, quædam non, horum aliqui intereunt, aliqui in multo tempore superstites euadunt. Verùm ex omnibus signis quæ adsunt, tum in his tum in aliis omnibus, coniecturam facere oportet. Quibuscunque ex inflammati pulmonis morbis abscessus fiunt circa aures, & suppurantur, aut ad inferas sedes ac fistulas contrahunt, hi superstites euadunt. Verùm

rām id ita considerare oportet, si & febris detinuerit, & dolor non sedatus fuerit, & sputum pro ratione non prodierit, neque biliosæ, neq; solutu faciles & meracæ alui egestionēs fuerint, neq; vrina valdè multa, multam subsidentiā habens. Iudicatur autem superstes futurus ab omnibus reliquis salutaribus signis: tunc abscessus huiusmodi fore sperandum est. Fiunt autem partim ad infernas partes, quibus videlicet inflammatio aliqua circa præcordia affuerit, partim in supernis, quibus præcordium molle & doloris exors permanserit, & ubi spirandi difficultas, quæ per tempus aliquod affuit, defuerit citrà aliam manifestam causam.

Suppurati ex eo potissimum cognoscuntur, quod cum pus, quod inter thoracem pulmonemq; coacervatum habet, citò non expuant, antequam pulmonis substantia exulceretur, tabidi fiunt, leniter quidem diu febricitantes, sed calore noctu crescente; quod accidit omnibus febricitantibus heclica febre: Item cognoscuntur ex sudoribus, tussi, macie, & cavitatē oculorum, & alijs quæ longioris suppurationis indicia sunt manifesta. Breuiorem autem suppurationem docet cognoscendam esse ex indi-
cijs

cū ante dictis : ea verò sunt , rigor febris ,
 gravitas , & si æger difficilior quàm antè spi-
 ret . Id verò accadat necesse est propter angu-
 stiam pulmonis , quoties pus inanes thoracis
 sedes comprehenderit . Si igitur continenter
 & vehementer infestent , dolor , difficultas
 spirandi , tussis , & screatio , celerem fore signi-
 ficiant ruptionem : Si verò non continenter af-
 fligant , nec vehementer , diuturniorem . Porro
 morbus qui per abscessum solvendus est , me-
 dius est inter mites & exitiosos : Nam mitis
 per excretionem solvitur , ut acutus non lethali-
 lis : Exitiosus cum nullum coctionis signum
 præbeat , totus in hoc est ut naturæ conatum
 renitentem celeriter opprimat : longi verò
 cum sint ex crudis crassiq; humoribus , non
 tamen lethalibus , diutius immorantur , &
 abscessus committunt , nisi per concoctionem si-
 miantur . Abscessus autem sursum vel deor-
 sum erumpunt pro vario motu humorum ,
 quem dolor comitans ostendit .

Abscessus.

C A P . X I I .

Αἱ δ' ἀποστάσεις αἱ ἐς τὰ σκέλια ἐν τῇσι
 ἀσθενέσιν ὁμογενεῖσι τῇσι ἰσχυρῇσι τε καὶ ἐπικιν-
 δυνόισι , λυσitteλὲς μὲν παύσαι , ἀεὶ δὲ αἱ
 τῷ πύελου ἐν μεταβολῇ ἰόντες γινώσκειν αἱ γὰρ
 τὸ οἶδημα καὶ ἡ ὀδὴν γίγνεται , ἢ πύελου
 αὐτὸ ξανθὸ πύελος ἡσυχάζει καὶ ἐκχυρῶντες
 ἔξω , ἕως αὐτὸ ἀσφαλίσταται ὅ , τι αὐτὸν ἄνθρωπος .

ἀφελγίνονται, καὶ ἡ ἀπόστασις αὐτῷ ὀδυνοσ τάχιστα
παύσεται.

Εἰ δὲ τὸ πτύελον μὴ ἐκχυρεῖται καλῶς, μηδὲ
τὸ ὕρον ὑπόστασιν ἀγαθὴν ἔχον φαίνοιτο, κίν-
δυνοσ χαλὸν γινώσκειν τὸ ἄεθρον, ἢ πολλὰ πρὸς ἡ-
μᾶς παρεσθῇ.

Ἦν δὲ ἀφανίζων καὶ παλινθρομίωσιν αἱ
ἀποστάσεις, τῷ πτύελου μὴ ἐκχυρεῖσθαι, καὶ τῷ
πυρὶ τῷ ἔχοντι, δεινόν κίνδυνοσ γδ', μὴ πα-
ρεφρονήσῃ καὶ ἀποθάνῃ ὁ αὐθρῶπος.

Τῶν δὲ ἱμπύων, τῶν δὲ τῶν περιπλάμυ-
κων, οἱ γεραίτεροι μᾶλλον ἀποθνήσκουσι. ἐκ δὲ
τῶν ἄλλων ἱμπυημάτων, οἱ νεώτεροι μᾶλλον
ἀποθνήσκουσιν.

Cæterùm abscessus ad crura in pulmo-
nis inflammationibus fortibus ac pericu-
lousis omnes quidem vtilis sunt : opti-
mi verò sunt, qui dum sputum iam in
mutatione est, fiunt : Si enim tumor &
dolor fiat, sputo pro flauo purulento fien-
te & foras procedente, ita securissimè
homo superstes euaserit, & abscessus ce-
lerrimè sedabitur. Si verò sputum non
benè processerit, neque vrina subsiden-
tiam bonam habens apparuerit, pericu-
lum est fore claudum articulum, aut mul-
tum molestiarum exhibiturum. At si e-
uanescent & recurrant abscessus, sputo
non

non prodeunte, febreq; permanente, horrendum est. Periculum enim est ne deliret homo & moriatur.

Ex suppuratis à pulmonis inflammatione, seniores magis intereunt: Ex aliis autem suppurationibus iuniores magis moriuntur.

Sententia est Hippocratis de bonis abscessibus, quòd optimi sunt si deorsum & quàm longissimè à morbo absint, sed potissimum si cum concoctione fiant: concoctio enim celerem indicationem ac securam sanitatem significat. Porro concoctionem indicat secretionis mutatio, & item vacuatio innocua atq; multa. Sed si citra morbi concoctionem abscessus sit in cruribus, vindicabit quidem & hunc in modum hominem à periculo in peripneumonia imminente, sed articulus ipse in quem decumbet, difficilius sanitati restituetur, ac forsitan aliquando ager claudicabit. Si verò abscessus aboletur, spūto non exeunte, ac febre detinente, difficilis morbus est: Constat enim quòd humores in profundum reflexerint ad partes precipuas. Nam si discussi essent, non amplius febricitarent, & facillè spuerent. Itaq; verisimile est in pulmonem omnem secessisse fluxionem, & ob eandem delirare eorū par est. Inter purulentos au-

tem ex peripneumonia, seniores potius intereunt, quia propter spuitionem sanatio viribus eget validioribus. Per alias verò suppurationes, sub ipso suppurationis tempore iuniores ex magnitudine februm ac doloris, sæpius moriuntur.

Dolores circa lumbos.

C A P. XIII.

Αἱ δὲ ξυὼ πυρετῷ γιγνώσκουσι ὀδυνοῖαι περιτλὴν ὁσφυῶ τε καὶ τὰ κάτω χροῖα, ἢ τῇ φρενὶ ἀπτωγται, τὰ κάτω ἐκλείπουσαι, ὀλέθριας κάρτε.

Προσέχουσι ἔν δὲ τὸν νόον ἔχουσιν ἄλλοις σημείοις, ὡς ἢ π καὶ τῇ ἄλλων σημείων ἐπιφάνηταί τι πονηρὸν, ἀέλιπτοις ὁ αὐθραπος.

Οχέουσι δὲ τῶν ἐμπύων καίονται, οἷσι αὖ κατὰ τὸν μῦτον τὸ πύον ἢ, καὶ λευκὸν, καὶ μὴ δυσωδῆσι σήζουσι. οἷσι δὲ ὑφαμένον τε καὶ βορβορώδες, ἀπίκνωσι.

Εἰ δὲ ἀναίσθητοις τῇ νοσήματι ὡς πρὸς τὰς φρένας, τὰλλα σημεῖα μὴ πονηρὰ ἐπιγίνηται, ἔμπυοι ἴσται τὴν πολλὰ ἐλπίδες.

Dolores cum febre fientes circa lumbos & infernas partes, si septum transversum attigerint, infernas partes relinquentes, perniciosi valdè sunt. Proindè aliis quoque signis animum advertere oportet. Nam si quod etiam ex aliis si-

A

gnis

gnis malum apparuerit, desperatus est homo. Si verò assiliente ad septū transversum morbo, alia signa non mala accesserint, hunc suppuratum fore multa spes est. Quicumque verò suppurati videntur, quibus quidem purum pus fuerit & album, & non foetidum, hi servantur: Quibus autem subcruentum & caenosum, hi pereunt.

Si verò assiliente ad septum transversum morbo, alia signa non mala accesserint, hunc suppuratū fore multa spes est.

Vult recurrense in thoracem morbo, è duobus alterum, aut de repente mori agrotum, aut si ille melius habet, prorsus fore purulentum.

Dolor à vesica.

CAP. XIII.

Κύστις ἢ σκληραὶ τε καὶ ἐπώδυνοι. δεινὰ μὲν παντιλῶς καὶ ὀλίθρια· ὀλιθιώταται δὲ ἐκείσαι, ἐνὶ πυρετῷ συνιχνεῖ γίνονται· καὶ γὰρ οἱ ἀπὸ αὐτέων τῶν κύστιων πόνοι. ἰκανοὶ δὲ ποικεῖται· καὶ αἱ κυστίαι ἢ διαχωρέουσιν ἐν τῇ τῷ χρόνῳ, εἰ μὴ σκληρὸν τι καὶ πρὸς ἀνάγκην. Λύει δὲ ὕρον πυώδες ὕρη δὲν, λευκὴν καὶ λεῖαν ἔχει τὴν ὑπόστασιν.

Ἦν δὲ μήτε τῷ ὕρῳ μηδὲν ἐνδιδῶν ὁ πόνος, μήτε ἡ κύστις μεγάλαισιν, ὅ, τε πυρετὸς ἐκινησὶς ἢ, ἐν τῇσι πρῶταισι φειδόμεναι ἔνοσημαί, ἐλπίς ἐν ἀλγέοντι ἀπολείψ.

Ο δὲ τρόπος ἔσται ἅπλῃ τῶν παιδίων
 μάλιστα τῶν ἰσχυρότων, ὥς αὐτοὶ τὰ πνιπ-
 καίδια ἔτεα χροῶνται.

Porro vesicæ duræ & dolentes, penitus
 quidem horrendæ ac perniciosæ sunt:
 perniciosissimæ verò quæ cū febre cōti-
 nua fiunt. Etenim dolores ab ipsis vesicis
 ad occidendum sufficiunt, & alui non
 egerunt hoc tempore nisi durum quid-
 dam, & hoc coactè. Si vrina mingitur
 purulenta, candidum ac læue obtinens
 sedimentum, solutio morbi: Si verò ne-
 que ab vrina quicquàm remiserit dolor,
 neque vesica molliatur, & febris conti-
 nua fuerit, in primis circuitibus morbi
 ægrum moriturum esse timor est. Atque
 hic modus potissimùm pueros corripit
 septennes, donec ad quintumdecimum
 annum peruenerint.

*Durities & dolor vesicæ cum febre hoc
 malum habet, quòd & deiectionem & vrinæ
 suppressionem inducit. Hæc vesica inflamma-
 tio si concoquatur, eò decumbent concocti hu-
 mores, ac pariter cum vrina exceruentur, in
 dicia bonæ conuersionis in sedimento habenti-
 tes: Si verò crudus permaneat affectus, nec
 dolor leniatur, ex eo vix conualescit æger.*

Ceterùm ab intempestiuos cibos, copia hu-

motu crudi in corporibus puerorum colligitur: Is igitur per renes expurgatur quotidie, atq; etiam per urinarios meatus in vesicam collectus, interdum calculos in ea gignit, saepe etiam inflammationem, cum ab assiduo eorum humorum transitu vesica magnum malum acceperit.



HIPPOCRATIS

PRÆNOTIONVM

LIBER TERTIVS.

TIVS.

De febribus.

CAP. I.



Ἰ δὲ πυρετοὶ κρῖνονται ἐν τῇσιν αὐ-
τῇσιν ἡμέρησι τὸν ἀριθμὸν, ἐξ ὧν τι
ἀειγίνον· οἱ αἰθρωποι, καὶ ἐξ ὧν ἀ-
τὶ πάλιν. οἷτι γὰρ ἀνέθισταί τε πυ-
ρετῶν, καὶ ἐπὶ σημείων ἀσφαλιστάτων βιβῶν
τεταρταῖαι, παύονται ἢ πρὸς θάνατον. οἱ, τε ἡ
κρηθίσταί τε καὶ ἐπὶ σημείων ἀφροτάτων γινόμε-
νοι, τεταρταῖαι κτείνουσιν ἢ πρὸς θάνατον. ἡ μὲν ὅτι
πρώτη ἰφάδος αὐτῶν ἔτω τελευτῇ· ἡ δὲ δευ-
τέρη, ἐς τὴν ἰσθόμην πτεράγεται· ἡ δὲ τρίτη,
ἐς τὴν ἰνδεκάτην· ἡ δὲ τετάρτη, ἐς τὴν πρὸς
πενήντη.

προκατακατήνῃ ἢ πέμπτῃ, ἐς τὴν ἐπὶ τετραδικαίαν
τὴν ἢ δι' ἑκτῇ, ἐς τὴν εἰκοστὴν. αὐταὶ γὰρ εἰ ἐν
τῶν ὀξυτάτων τοσημάτων ἀπὸ πρῶτου ἐς τὰς
ἑξῶν, ἐν αἰσθησίσι τελευτῶσι.

Febres iudicantur in iisdem numero diebus, ex quibus & superstites evadunt homines & ex quibus pereunt. Etenim placidissimæ febres, & signis securissimis nitentes, quarto die desinunt, aut prius. Malignissimæ verò & signis horrendissimis affligentes, quarto die aut prius occidunt. Primus igitur ipsarum insultus sic desinit. Secundus autem ad septimum producitur: Tertius ad undecimum: quartus ad decimumquartum: quintus ad decimumseptimum: sextus ad vigesimum. Hi igitur impetus ex acutissimis morbis per quatuor ad viginti ex additione desinunt.

Nomen indicationis aut crisis in morbis usurpatum, à foro translatum est, significans subitam in morbo mutationem, quæ quatuor modis fit: aut enim statim vindicantur à morbis, aut magnam habent in melius mutationem, aut statim moriuntur, aut multò peius habent. Primas duas simpliciter nominant indicationes: sequentes duas cum additione, malam verbo indicationis adiungentes. Porro dies

ἅδὲμ sunt decretorij, in quibus hæ indicatio-
nes fiunt ad salutem, & in quibus fiunt ad
mortem. Quod significavit cum ait eosdē dies
esse ex quibus supersunt homines, & ex qui-
bus intereunt. Placidissima febres igitur &
simplicissima, quæ securitatis indicia habue-
rint, non ultra primum quaternarium pro-
cedent, sed aut quarto die aut citius desinent.
Pari modo malignæ, quæ cum signis exitiosis
inuadunt, quarto die aut citius interimunt.
Itaq; per tres septenarios & sex quaternarios
ad vigesimum diem pervenitur, qui & ipse
multas & certas crises facit.

Dieum decretoriorum observatio.

CAP. II.

Οὐ δ' αὖταί τιν' ὅλησιν ἡμέρησιν ἔσθ' ἐν ταύταις
ἀριθμείαται ἀπεικίως, ἔσθ' ὃδ' ἐν αὐτοῖς τι καὶ οἱ
μῆνεις ὅλησιν ἡμέρησιν πεφύκασιν ἀριθμείαται.
καὶ ὅ τ' αὐτὰ ἐν ταύταις αὐτίκ' ὅπως καὶ τὴν αὐτὴν
πρόσθεσις ἢ ἀφαιρέσις περιόδου προσάραται καὶ τελε-
κῆται ἡμερίων ἢ ὁδυτήρη, προσάραται καὶ ἡμε-
ρίων ἢ ὁδυτήρη, ἐξήκοντα ἡμερίων τελεῖται δ' ἐν
δοξῇσιν ἐπὶ χαλεπώταται διακινῶσκει τὰ μέγιστα
καὶ ἐπὶ πολλοῖς καὶ χρόνῳ κείνεται ὁμοιόταται ὃδ' αἱ
ἀρχαὶ εἰσιν αὐτίκ' ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς πρώτης ἢ
μείνης ἐνθυμείαται, ἐκαστὴν τετέλεσται προσ-
πιδεῖν καὶ σκέπτεσθαι καὶ ἐλπίσται ὅτι τελεῖται
τὸ νόσημα, γινώσκουσι ὅτι καὶ τὸ τελεῖται κατὰ φύσιν.

ἐκ τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου. Τὰ δ' ἐν ἐλαχίστῳ χρόνῳ μέλλοντα κρίναι, δύπιστον ἐστὶν ἀνέσκειν. μένεται γὰρ τὰ διαφέροντα ἀπὸ ἀρχῆς αὐτέων εἶναι. οἱ μὲν γὰρ περιπόρνοι, ἀπὸ κοινοῦ τε καὶ αὐτῶν δυνάμει εἰσι, καὶ περιμένονται τὰς νύκτας, τότε ἄλλα σημεῖα ἔχουσιν ἀσφαλίστατα. οἱ δ' ἀποκλύμνιοι, δύσπνοοι γίνονται, ἀποφάσκοντες, ἀρεπτόντες, τότε ἄλλα σημεῖα κάκιον ἔχοντες. ὡς ἔνταυτάων ἔτω γινώσκων, συμφορὰς καὶ χρόνῳ καὶ τὰ τε τὸν χρόνον, κατὰ τε τιτὸν ἀφ' ὧν εἰσὶν ἐκάστη ἐπὶ τὴν κρίσιν ἰόντων τῶν νοσημάτων.

Non potest autem quicquam horum integris diebus exactè numerari, neque enim annus & menses integris diebus numerari possunt. Postea verò eodem modo iuxta eandem additionem. Primus circuitus quatuor & triginta dierum est: secundus quadraginta dierum: tertius sexaginta dierum: at in horum principijs difficillimum est cognoscere eos qui in plurimo tempore iudicabuntur, simillima enim sunt ipsorum principia. Verùm à primo die animadversionem facere oportet, & prout singuli quaternarij adduntur, considerare, & non latebit te quò vertetur morbus. Fit autem & quartanarum constitutio ex huiusmodi ordine. Qui porro morbi in

A 4 bre

breuissimo tempore iudicabuntur, faciliores cognitu sunt. Maximæ enim differentia ab initio ipsius sunt. Qui enim superstites ab ipsis euasuri sunt, facile spirantes, & doloris exortes sunt, & noctu dormiunt, aliaq; signa securissima habent: qui verò morituri, ægrè spirantes sunt, delirantes, vigilantes, aliaq; signa pessima habentes. Vt igitur his ita contingentibus coniectare oportet, & iuxta hoc tempus, & iuxta vnamquamq; additionem, tendentibus ad iudicationem morbis.

Cum vigesimus dies ab Hippocrate constituitur inter decretorios, cumq; tres septenarij viginti diebus circumscribantur, constat quod quaternarius sexies repetitus ante vigesimum non sit integrorum dierum, sed pars quedam deest, nisi finis vnus quaternarij principium sit alterius, ac vtrique dies vnus sit communis. Sic trium septenariorum ad vigesimum vsq; diem inter se numeratorum non eadem fuit compositio: secundus enim à primo seiunctus est, proinde quarto decimo die finitur: tertius verò secundo copulatus est, & ob eam rem finitus est vigesimo die: atq; septenarij eadem ratio est post vigesimum vsq; ad quadragesimum, sexagesimum, ac ita deinceps. adeo vt trigessimus

gesimus quartus sit primus post vigesimum, qui sit antecediti septenario communis & sequenti, à quo ad quadragessimum sit progressus. Quòd etiam annus non numeretur integris diebus ex eo planum est, quòd non trecentis & sexaginta quisque diebus tantummodò constet, sed etiam quarta parte diei, exceptis duodecim minutis, 38. secund. & 37. tertijs. Similiter unusquisque mensis minor est triginta diebus, maior verò novem & viginti. Porro cùm sit iudicatio ad bonum aut ad malum mutatio (constat enim quòd semper sit iudicatio vel natura superante morbum, vel ab eo victa) si morbus & natura quasi pares in conflictu hostes pugnent, plus temporis ad alterius victoriam desideratur si verò magnus sit excessus alterutrimus, in prompta victoria est ei qui superior est. Itaque natura minimos morbos & qui sunt cum signis haudquaquam malis, citissimè vincit: à maximis autem celerimè vincitur. Victoria verò per singulos quaternarios considerata, utrum in salutem acri vincente scilicet natura, an victa ad mortem mutatio fieri debeat: Ex signis qua subicit id animadvertendum. Verùm ut in continuis febribus numeramus dies in predictionem futura indicationis, ita in intermittentibus, accessiones, ut quod in continuis febribus dies septimus efficit, id in intermittenti-

bus septima circuitio efficiat. Ob id igitur exquisita tertiana septem periodis non diebus septem indicari solet. Atque ut quartus dies septimi est index, ita quarta circuitio septimae est index. Quocirca nunc unum id intellexisse sufficiet, quod quartanae febris indicationes ex numero circuitionum fiant non dierum.

Indicationes in mulieribus à partu.

C A P. III.

Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον, καὶ τῆσι γυναιξὶν αἱ κρίσεις ἐκ τῶν ὥρων γίνονται.

Iuxta eandem rationem mulieribus quoque indicationes fiunt ex partu.

Principium numerationis erit non quo die ceperint febricitare, sed quo pepererint.

Dolor capitis & fauetum cum febre.

C A P. II I I.

Κεφαλῆς ἢ ὀδυνῶσι ἰσχυρῶς τε καὶ ξυνολίς, ξυὼ πυρετῶ, ἢν μὲν π τῶν διατακθῶσι σημείων προσγίνουσι, ὁ δὲ θριον κέρτα.

Εἰ ἢ ἄτις τῶν τριῶν σημείων ἢ ὀδυνῶσι ὀπρεβάλλοι εἰκοσὶν ἡμέρας, ὁ, τε πυρετὸς ἔχει ὑποσκήπληδαυ γρη, αἷμας ρῆξιν ἀλγῖν ῖνῶν, ἢ ἄλλην πνὰ ἀπόστασις ἐς τὰ κάτω χωρεῖ.

Εἰ αὖ ἢ καὶ ἢ ὀδυνῶσι ἢ νεκρὰ προσδέχεται γρη ὠσαύτως, αἷμας ρῆξιν ἀλγῖν ῖνῶν, ἢ ἐκπύησι.

πύσιν. ἄλλως τε ἢ ἡ ὀδυῖν ἀπὸ τῶν κρατά-
φους καὶ τῶν μέτωπον ἢ.

Μάλλον ὅμως προσδίσχας ὁ μὲν αἷμα τῶν
τῇ ῥῆξιν τοῖσι νεώτεροις πίπτει καὶ τείνεται
ἐπὶ τῶν τριῶν διὰ γαργάροις, τὴν ἐκπύουσι.

Ὡς ὅτι ὀδυῖν ζῶν πυρετῶ ξυνεχῆτε
καὶ ἰσχυρῶ, δεινόν· κίνδυνος γὰρ παρεφρογῆ-
σαι τὸν ἀνδρῶνα, καὶ ἀπολειδοῖν. ὡς ἐν τυ-
τίᾳ ὁ πτόπου σφαλερῶ ἰόντες, ταχίως δ' ἐπὶ πτό-
σίῃ τῇ νόον τριῶν σημείοις πᾶσιν, ἀπὸ πτό-
σης ἡμῖς.

Απόλλανται δ' ἐπὶ μὲν νεώτεροι τῶν ἀνδρῶ-
να ἰεδομαῖοι καὶ ἐπὶ θάσσον, ἀπὸ τούτων τῶ
νοσήμας· οἱ ὅμως γέροντες, πολλῶν βραδύτεροι.
οἷτε γὰρ πυρετῶ καὶ αἱ παρεφροσύναι ἥσονται αὐ-
τέοις ἐπιγίνον, καὶ τὰ ὅτι ἀπὸ τῶν φθάνει
ἐκπύουσι. ἀλλὰ ταύτησι μὲν τῶν ἡλικίῃσιν
ὑποστροφῇ τῶ νοσήμας ἐπιγινόμενα, ἀποκ-
τείνουσι τὰς παλαιοῦς· οἱ ὅμως νεώτεροι, πρὶν ἐκπύ-
σαι τὸ ὅτι ἀπόλλανται.

Επὶ γὰρ ῥῆ πῶν λείκων ἐκ τῶν ὁρῶν, ἐλπίς
τῶ νεώτερον ἀπὸ γήνιαν, ἢ γὰρ καὶ ἄλλοι αὐ-
τέα ἐπιγίνονται χρηστὸν σημῆον.

Φάρυγξ ὅτι ἐλκευμένη, σὺν πυρετῶ, δεινόν·
ἀλλ' ἢ καὶ ἄλλοι σημῆοι γήνται τῶν προκίκε-
μένων πονηρῶν εἶναι, προσέχεται ὡς ἐν κινδύνῳ
ἰόντες ὁ ἀνδρῶνα.

Capitis dolores fortes & continui cum
febre,

febre , siquidem lethaliū signorū
quid accesserit, perniciosi valde sunt : si
verò absque talibus signis dolor viginti
dies transmiserit, & febris tenuerit, san-
guinis à naribus eruptionem, aut absces-
sum quendam ad infernas partes expe-
ctare oportet. Sed & quandiu dolor re-
cens fuerit, similiter sanguinis è naribus
aut puris eruptionem sperare conuenit,
cū aliàs, tum si dolor circa tempora &
frontem fuerit. Verū sanguinis eru-
ptio magis expectanda est iunioribus
triginta quinque annis , senioribus au-
tem puris eruptio. Aurium dolor acutus
cum febre cōtinua ac forti, horrēdus est:
periculum enim est deliraturum homi-
nem ac periturum. Proinde cū hic mo-
dus minimè tutus sit , citò mentem ad-
uertere oportet etiam aliis signis , à pri-
mo statim die. Pereunt autem iuniores
homines septimo die, & adhuc citius, ex
hoc morbo : senes verò longè tardius.
Nam & febres & deliria minus ipsis ac-
cidunt : & hac de causa aures antea sup-
purantur. Verū his quidem ætatibus
recidivæ morbi contingentes plurimos
occidunt. At verò iuniores priusquam
suppuretur auris, pereunt: nam si pus al-
bum effluerit ex aure, spes est iuvenem
super

superstitem euasurum esse, si sanè & aliud quoddam bonum signum accedat, fauces exulceratæ cum febre horrendæ sunt. Verùm si quod aliud signum accedat ex his quæ antea mala iudicata sunt, in periculo hominem versari prædicendum est.

Capiti dolor continuus cum febre, maximi est ad præcognitionem momenti: nam inde vel sanguinis eruptio futura est in iuuenibus, præsertim quibus multum est sanguis calidus & biliosus, vel suppuratio expectanda, præsertim in senibus quibus non ita sanguis abundat. Aurium etiam dolor acutus, quo afficitur auditorius neruus, cerebro non ex longo intervallo copulatus, difficilis est. Siquidem nonnulli delirant cerebro in consensum adducto, aliqui repente moriuntur, quoties fluxio committens dolorem in cerebrum irruerit. Cui periculo sunt magis obnoxij iuuenes, ob calidum & biliosum temperamentum. Reliquum distionis satè perspicuum est.

Angina.

C A P. V.

Αἱ δὲ κυοάνγκαι, δεινόταται μὲν εἰσι καὶ τάχιστα αἰαιεῖσι, ὁπόσαι μὴτε ἐν τῇ φάρυγγι μηδὲν ἔκδηλοι ποίησι, μὴτε ἐν τῇ αἰχίνῃ πλείησι ὃ πότοι περιέχουσι καὶ ὀρθόπνοιαν αὐταὶ γὰρ καὶ αὐθήμερον ἀποπνέουσι, καὶ ὀδυρεῖσθαι

τεταρτάῃ, καὶ τεταρτάῃ, καὶ τεταρτάῃ. ὅσαι δὲ
τὰ μὲν ἄλλα παρὰ τὴν νόσον πόνοι παρέχουσιν,
ἐπαύρουνται δὲ καὶ ἰεὺς θήματα ἐν τῇ φάρυγγι
ποιέουσιν, ὁλίθρια μὲν κάρτα, χροιώτεραι δὲ
μᾶλλον τῶν πρὸς τὴν, ἢ τὸ ἰεὺς θήμα μέγα γί-
νεται.

Οἱ ὅσοισι δὲ ξυνοίεθαι θήμα ἢ φάρυγι καὶ
αὐχένι αὐτὰ δὲ χροιώτεραι καὶ μάλιστα ἐξ
αὐτέων πρὸς περιφύζουσαν, ἢ οὐ, τε αὐχένι, καὶ
τὸ σπῆθος ἰεὺς θήμα ἔχει, καὶ μὴ παλινδρομῆναι
τὸ ἰεὺς θήμα εἶσιν.

Ἢν δὲ μήτε ἐν ἡμέρησι κρίσει μὲν ἀφανίζῃ
τὸ ἰεὺς θήμα, μήτε φύμας ξυνοίεθαι ἐν
τῇ ἐξω χειρὶ μὲν πῶν ἀποθήσῃ, ρηϊδίως τε
καὶ ἀπὸ τῆς ἐξω δοκίμης. θαύμασιν συμβαίνει, ἢ
καταστροφὴν τὸ ἰεὺς θήμα.

Ασφαλίστερον δὲ τὸ οἶδμα καὶ τὸ ἰεὺς θήμα
μάλιστα ἐξω τείπεσθαι. ἢ ἢ τὸ πρὸν πρὸς τὴν
ἐξω πρὸς, παρὰ τὴν νόσον τε ποιέει καὶ ἔμπροσθεν ἐξ αὐ-
τέων πρὸς ὅς τὰ πολλὰ γίνονται.

Anginae horrendissimae sunt, & citis-
simè occidunt, quae neque in faucibus
quicquam conspicuum faciunt, neque
in ceruice, verum plurimum dolorem ex-
hibent, & erecta ceruice spirationem in-
ducunt: hae enim eodem die suffocant,
secundo item ac tertio & quarto. Quae
vero alioqui similiter dolorem exhibent,
aut

attolluntur autem, & in faucibus rubores faciūt, perniciosæ quidem valdè sunt, verùm prioribus diuturniores, si rubor fuerit magnus. Quibuscunque verò fauces & ceruix simul rubuerint, hæ angina magis diuturnæ, & ex his maximè euadunt, si & ceruix & pectus ruborem habuerit, & erysipelas ignis sacri non in trò recurrerit. Si verò neq; in diebus iudicatoriis dissipetur erysipelas, neque tuberculum ad externam partem conuertatur, neque pus tussiendo reiiciat, facileq; ac sine dolore degere videatur, mortem significat, aut ruboris recidivam. Securius est autem tumorem & ruborem quàm maximè foras verti: Si verò ad pulmonem vertatur, delirium inducit, & quidam ex ipsis ita affecti suppurantur.

Qui angina laborant, si vehementer strangulantur, ut cogantur erecta ceruice spirare, magno cum dolore vitam exigunt, nullum aut in ceruice aut in faucibus symptoma habentes. Post hos verò sunt ij qui non spirant quidem difficulter, sed dolore admodum vexantur, & pariter tumescit ceruix, & fauces rubicundiores euadunt. Tertio sunt ij de quibus Hippocrates presenti sermone dicit, qui nec

esse

vehementer affliguntur dolore, nec spirant
 difficulter, & guttur nequaquam afficitur,
 sed aut in fauces fluxio, aut in cervicem,
 aut in hæc utraque conuersa est. At verò flu-
 xio talis magna ex parte biliosior est, ita ut
 perspicuè erysipelas aut phlegmonem erysipe-
 latoden committat. Huius materia si diebus
 decretorijs transmeet in pulmonem, recurra-
 tque in tunc erysipelas nequaquam digestum in ex-
 teriori superficie, non solum non bonum id est,
 sed malum maximum: propterea quòd ex diei
 fide firmiorem assumat prauitatem. At si pa-
 riter tuberculo foras tendente, ac faciliè ex-
 creante egro, deletur erysipelas aut rubor, tum
 non meritum aegrum expectare oportet.

Gurgulio inflammatione laborans.

CAP. VI.

Οἱ δὲ γαρζαριῶντες, ἐπικίνδυνοι καὶ δαπτά-
 μιας καὶ δαποχάζιας, ἴσ' αὐτοὶ ἰσχυροὶ τι ᾧσι καὶ
 μεγάλοι καὶ γὰρ φλεγμοναὶ ἐπιγίνονται τε-
 πίοισι καὶ αἰσθησάμενοι. ἀλλὰ καὶ τὰ τριῶντα
 τοῖσι ἄλλοις μηχανήμασι περὶ αὐτῶν καταχρά-
 νει ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ.

Οὕτως δὲ ἀποκριθὴν ἡδὴ παρ', ὃ δὲ γαρ-
 ζαριῶντες, καὶ γὰρ, τὸ μὲν ἄκρον δὲ γαρ-
 ζαριῶντος, μᾶλλον τι καὶ περιφίξας τὸ δὲ αὐ-
 τῷ λιπτότερον ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, ἀσφαλὲς
 διαχειρίζεται. ἄμεινοι δὲ καὶ τὴν κοιλίην ὑπο-
 κινῶ

κινώσαντα χερσὲν ἐν χεῖρσιν, καὶ οὐ, τε ἄλλος
ἐν χεῖρσιν, καὶ μὴ ἀποπνίγεται ὁ αἰθήρ.

Gurguliones periculosi sunt. ut re-
centur & scarificentur, quandiu rubicun-
di fuerint & magni: nam inflammatio-
nes ad hos succedunt & sanguinis eru-
ptiones. Quare tales aliis machinamen-
tis attenuare conari oportet hoc tempo-
re. Quum vero totum iam fuerit secre-
tum id quod vnam appellant, & fiat ex-
trema gurgulionis pars maior & rotun-
da, superior autem tenuior, in hoc tem-
pore tutum est chirurgia rem aggredi.
Præstat tamen & aluo subducta, chirur-
gia hac uti, si liceat per tempus, & æger
non stranguletur.

Prognostico theoremati iunctum est prae-
ceptum therapeutices, sine quo fieri non potest
ut integrè cognoscatur presagium. Gurgulio-
nem si inflammatione laborantem præcidas
aut scarifices, sanguinis fluor & inflamma-
tio comitabitur: sed quoties excretum fuerit id
quod vnam appellant, fueritq; pars summa
gurgulionis maior & orbiculata, superior ve-
rò tenuior, tum adhibere manus tutum est,
potissimum aluo antea abundè subducta sine
sponte sine etiam prouidentia medicorum.

Signa febrilium non determinato loco affecto.

CAP. VII.

Ουδέποτε δ' αὐτοὶ πυρετοὶ παύονται, μήτε σημείαι γνησθῶσι λυθησῶσι, μήτε ἐν ἡμέρῃσι κρισίμῃσι, ὑποπροφῇ προσδίχιας, καὶ τῆσι τοῖσι. Οὗτος δ' αὖτε πυρετὸς μεκύνῃ ἀσθενείᾳ διακειμένη ἢ αἰσθρόπον, μεκύνῃ οὐδυνῇ ἐκθύσῃ διὰ φλογμὴν πικρά, μήτε διὰ πρόσφασιν ἀσθενήσαντι ἐμφανείᾳ, τῆσι ὑποπροφῇ προσδίχιας δόπτανται κατ' εἰδήματός τε καὶ ἐδύνῃς εἰς πτωὶν ἀσθενῶν, καὶ ἔχουσιν οὐκ ἔκαστω.

Μᾶλλον δ' γίνονται καὶ ἐλάσσονι χρόνῳ αἱ θύαυαι δόπτασιν, εἴσι νεωτέρῃσι τεύχεσιν ἐπίαν.

Υποσπῆλαια δ' καὶ αἰσθῶσι τὰ ἀσθενήσαντι δόπτανται, καὶ ἔχουσιν ἡμέρας ὁ πυρετὸς ἔχειν, ὑποπροφῇ εἰσὶν ὅσοι γινώσκονται ἡμέρας γίνονται πολυχρόνιότερα εἰσὶν ἢ πυρετοῦ.

Καὶ δ' ἐν τῇ μετὰ θύαυαι δόπτανται προσδίχιας συνωχίᾳ εἰσὶν ἢ πυρετοῦ· ἐς δὲ τι παρὰ τὴν κατὰ φύσιν ἢ διαλείπειν τε καὶ καταλαμβάνειν πτωλινῶν τεύχεων, καὶ ταῦτα ποῖον τὸ φθινοπύρον προσπλάσσει.

Πατέρε δ' εἰσὶν νεωτέρῃσι τῶν τεύχεων αἱ δόπτασιν γίνονται, ὅπως οἱ περὶ ταῖς αἰσθῶσι μᾶλλον εἴσι τεύχεσιν ἐπίαν, καὶ γινώσκονται.

Τὰς δ' αἰσθῶσι εἰδέναι καὶ, τῇ χαλεπότητι μᾶλλον ὑποσπῆλαια, χρονιάπειν τε παροξύνει, ὅσοι δ' ἐκ παλινδρομῶσιν.

Οὗτος

Quibus febres cessant, neque signis solutoriis apparentibus, neque in diebus indicatoriis, his reuersuras esse expectandum est. Quæcunque febris longiorem moram traxerit, homine aliquo ad salutem disposito, ita vt neque dolor teneat ob inflammationē, aut ob aliquam aliam manifestam causam, huic abscessum expectare oportet cum tumore ac dolore ad aliquem articulum, maximeq; inferiorem. Fiunt autem huiusmodi abscessus magis, & in breuiori tempore, his qui iuniores sunt triginta annis. Expectare verò statim oportet abscessum, si febris detinens viginti dies transmiserit: Senioribus autē minus fiunt, diuturniore etiam existente febre. At verò huiusmodi abscessum expectare oportet, febre continua existente. Verum ad quartanam deducetur si intermiserit, & erroneo modo apprehenderit, & si hæc faciens ad Autumnū appropinquarit. Quemadmodum autem iunioribus triginta annis abscessus fiunt, ita quartanæ magis his qui triginta sunt annorum, & senioribus. Cæterum hæc nosse expedit, abscessus magis Hyemē fieri, tardiusq; cessare & minus recurrere.

Relucti post indicationem imperfectam hu-

mores mali, putrescunt & recidivam generant, Cum verò triplex sit causa prorogationis februm, aut enim prorogantur propter aliquam partem affectam curatu difficilem, aut propter humores crudos crassos, aut propter aliquod erratum: si nec affecta fuerit pars, nec admissus sit error aliqui, restat, ut propter humores crudos ac concoctu difficiles prorogetur. Hos igitur assolet natura in partem quandam ignobiliorē expellere, quoties per excretionem educere non potuerit extra corpus. Saepe enim dictum est quod humores calidiores tenuioresq; paratissimi sunt ad excretionem. Crassus verò & crudus aut per abscessum natura medetur, aut per concoctionem, nisi ita frigidi sint, ut nec excretionem nec abscessum desistentes, agrum interimant, aut perquam longo temporis spacio vix concoquantur: facilitate enim valida opus est ad hoc, ut humores frigidi ad abscessum convertantur: unde fit ut in iunioribus affectus frigidi saepius citiusq; per abscessum terminentur, quia virtus eorum est quam senum validior, longiore siquidem tempore opus est, ut per aetatem senilem corpus humore frigido repurgetur. Caterum Hyeme frequentius accidunt abscessus ob humorum frigidorum abundantiam. Quod verò tardius desinant, in causa est humorum natura, atq; etiam ambientis aëris frigiditas. Minus autem repetunt

Hyeme

Hyeme: repetentibus enim motum quendam
inesse necesse est, at frigida pigra sunt ad motū.

Vomitio spontanea.

CAP. VIII.

Ὅσπερ δὲ αὖ ἐν πυρετῇ μὴ θανατώδει φη-
σὶν κεφαλὴν ἀλγέειν, ἢ καὶ ὀφθαλμοὺς καὶ
τῶν ὀφθαλμῶν φαίνοσθαι, ἢ καρδιασμός, καὶ
προσγλήλαι, χαλάδης ἐμὲν περιεῖται. Ἡ δὲ καὶ
ῥιζὴ προσγλήνεται, καὶ τὰ κατὰ μέρη τῆ ὑπε-
ροδρίας ψυχρὰ ἔχῃ, καὶ θάλασσαν ἐπὶ ὃ ἕμεως πε-
ρίεσται.

Ἡ δὲ π πὴν ἢ φάλη ὑπὸ τῷ ῥιζὶ χροῖον,
καὶ τῷ ῥιζὶ χροῖον ἐμὲν περιεῖται.

Ἡ δὲ τῷ ῥιζὶ ὅσπερ αὖ ἀρξεται ὁ πόσις τῇ πρῶ-
τῇ ἡμέρᾳ γίνεσθαι, πεπταῖοι πίνουσιν μά-
λιστα καὶ πεπταῖοι, ἐν δὲ τῷ ἰσχυρῇ ἀπαλ-
λάσσονται.

Οἱ γὰρ ῥιζὶ ἀλείοντες αὐτῶν, ἀρξεται μὲν πρῶ-
τῇ ἡμέρᾳ, πεπταῖοι χαμᾶζονται δὲ μάλιστα, πε-
πταῖοι ἀπαλάσσονται δὲ ἐν αὐτοῖς, ἢ ἐν δὲ
κατὰ τοῖς ῥιζὶ.

Οἱ δὲ αὖ ἀρξεται πεπταῖοι πίνουσιν, καὶ
τὰ κατὰ ῥιζὶ ἀλείοντες αὐτοῖς τῶν ὀφθαλμῶν γίνε-
ται, ἢ τῷ ῥιζὶ ἰσχυρῇ ἀπαλάσσονται, καὶ τῷ
ῥιζὶ γίνεται ἢ τὰ κατὰ τοῖς ῥιζὶ ἀλείοντες, καὶ τῷ
ῥιζὶ γίνεται, ἐν τῷ ῥιζὶ πεπταῖοι μάλιστα, τῷ δὲ
κατὰ τοῖς ῥιζὶ γίνεται μὲν καὶ ἐν τῷ ῥιζὶ, καὶ ἐν
τῷ ῥιζὶ ἰσχυρῇ ἀπαλάσσονται, καὶ ἐν τῷ ῥιζὶ
γίνεσθαι πεπταῖοι.

Οἷσι δ' αὖ τριτοτέτῳ πυριτῷ κεφαλῇ, ἐλ-
γίσσι, αὐτὴ μὲν τῷ ὀφρῶδ' ἐκ παρ' ἑ ὀφθαλ-
μῶν φαίνομαι, ἀμβλυωμὸς γίνεταί, ἢ μαρ-
μαρυσαὶ παρφαίνονται· αὐτὴ δὲ τῷ καρδιώσ-
σει, ἐν τῷ ὑποχρῖδ' ἐπὶ δεξιᾷ ἢ ἐκ' ἀρι-
στῆ, ἐκωτύνεται π, μήτε ξυὼ ὀδυρὴ μήτε ξυὼ
φλεγματῇ, αἵμα δ' αὖ τῶν ρινῶν ἰσχυροῖς ρυήται
προσδ' ἑκμῶ αὐτὴ τῷ ἐμύτῃ· μάλλον δ' ἐκ γὰρ ἐκ-
πύθεται τοῖσι νόοις τῷ αἵματι· πλὴν ρυήται παρ'
ἐκχέομαι· οἷσι δ' ἐκτρίκται ἴσσι καὶ γαστρί-
ροισιν, ἥτοι, ἀλλὰ τῷ ἐμύτῃ τῷ πρὸς δ' ἑ
χέομαι.

Quicumq; verò in febre non lethali
dixerit sibi caput dolere, aut etiam prae
oculis obscurũ quiddam apparere, si &
osculi ventris morsus huic accesserit, ei
biliosus vomitus aderit. At si quid bibe-
rit aut ederit sub hoc tempus, valde citò
vomet. Porro quibus horum dolor fieri
incœperit primo die, hi quarto magis
quàm quinto premuntur, septimo verò
liberantur. Pleriq; tamen ipsorum ter-
tio die dolere incipiunt, vexantur au-
tem maximè quinto, liberantur nono
aut undecimo. Qui verò incœperint
quinto die dolere, aliaq; iuxta rationem
priorum ipsis fiant, his ad decimum quart-
tum morbus indicatur. Fiūt autem hæc

& viris & mulieribus, maxime in tertianis. iunioribus accidunt etiam in illis, verum magis in cōtinuis febribus, & in synceris tertianis. Quibuscunq; verò in huiusmodi febre caput dolentibus, pro eo quod obscurem quiddam præ oculis appareat, visus hebetudo contingit, aut splendores ob oculos obuersantur, & pro osculi ventris morsu, in præcordiorum dextra aut sinistra parte aliquid tenditur, neq; cum dolore, neq; cum inflammatione: sanguinem de naribus his fluxurum esse pro vomitu expectandum est. Magis tamen & hic in iuuenibus sanguinis eruptionem expectare oportet. His autem qui triginta sunt annorum, & seniores adhuc, minus: Verum vomitus in his expectari debent.

Vomitionis critica signa, febris minimè extingosa, dolor capitis, acrum aliquid ob oculos obuersans quod à flava bile exhalatur, hæc enim multum affata nigrum vaporem seu fuliginem quandam mittit ad caput, ei dolorem inferens. Hanc igitur exhalationem à cerebro permeantem ad oculos visorius spiritus sentiens (quemadmodum fit in suffusionibus) imagines quasdam tenebrosas concipit. His si accedat etiam morsus oris ventriculi cum

τα δὲ πρὸς ὅτις τῶν παιδῶν καὶ οἱ ἄνδρες
 εὖ ἐπὶ τῇ τριτοσίᾳ τῶν πασμάτων ἔ-
 λθοντες, ἢ μὴ τῶν σημείων προσήληται
 τῶν ἰσχυροτάτων τε καὶ κακίστων, διαφῆς ἐν
 τῇ φρενὶ γίνονται.

Τὰς δ' ἀπλημνίας τε καὶ πεισματικές
 τῶν παιδῶν τε καὶ τῶν ἄλλων περὶ αἱρεθῶν
 τοῖς ἑομπασι σημείωσιν, ὡς ἐφ' ἑκάστοισιν ἐκα-
 στα διαγέγραπται.

At verò pueris convulsionēs fiunt, si
 febris fuerit acuta, & venter non ege-
 serit, & vigilarint, & terreantur, & eiula-
 rint, & colorem mutarint, & viridem si-
 ve pallidum, aut lividū, aut rubrum con-
 traxerint. Fiunt autem hæc promptissi-
 mē quidem pueris nuperrimē editis, usq;
 ad septimum annum. Seniores autem
 pueri & viri non amplius in febribus
 corripuntur convulsionibus, nisi quid
 ex signis fortissimis, ac pessimis accesserit,
 qualia sanē in phrenitide fieri solent.
 Perituros porro & superstites futuros,
 tum pueros tum alios ex omnibus signis
 coniectare oportet, prout singula de sin-
 gulis perscripta sunt.

Convulsio pueris promptissimē evenit, pō-
 tissimūm lactentibus plurimū & intempe-
 stivo alimento utentibus. Cū enim nec sine

facultates quibus gubernatur corpus, duabus quidem pueri quam aliq̃ fortiores sunt, una verò debiliores, quæ in nervis est, & ob eam rem promptissimè conuelliuntur, sed ab hac conuulsione rursus ad habitum naturæ facillimè redeunt. perfectis autem neq; sic neq; desinit facile conuulsio, propter robur facultatum in nervis itaq; accidit etiam sine febre conuulsio in forti admodum frigore, & copia humorum crudi crassiq̃, & in inflammatione in nervis ac tendonibus, quoties originem ad consensum agunt. Sed hoc loco de conuulsione docet quæ sit per febre, quemadmodum initio admo-
 uuit se tractare prædictiones in morbi acutis & in alijs q̃ui ex his decidunt. In pueris ergo conuulsiones indicabunt quæ recensuit signa, vigilie, terrores, emlatu, colorum mutationes &c. In adultis autem ea quæ maxime in periculosioribus phrenitidibus apparent indicia, & potissimum si partes in vultu peruertuntur, aut demes frident, aut oculi sunt instabiles aut distorquentur.

Conualituros autem moriturosq̃ pueros & alios ex omnibus signis conijciemus, in memoria habentes (ne nos augurium nostrum fallat) quòd interdum à multis bonis indicijs unum malum relinens vincatur, & econtrariò unum bonum maximum vincatur à multis malis.

Quod hæ prædictiones sint ex signis quæ
apparent in acutis morbis, & Quod signa
omnia expendenda sint, ne ex vngue leo-
nem æstimemus.

CAP. X.

Ταῦτα δὲ λέγω, αἵτιτι τῶν ὀξείων νοσημά-
των, καὶ ὅσα ἐκ τούτων γίνονται.

Χρή δὲ τὸ μέλλοντα ὁρᾶν προσκινῶσθαι τὰς
αἰτιατορμύδας καὶ τὰς ἀποθανουμένας, ὅσοισί
τι αὐτῶν μέλλῃ πόλιονας ἡμέρας παρεμῖναι τὸ νό-
σημα, καὶ ὅσοισιν αὐτῶν ἰλάσεται, τὰ σημεῖα ἐκ-
κριθάναι, καὶ διὰ ταῦτα κρίνειν λογίζομε-
νον τὰς δυνάμεις αὐτῶν πρὸς ἀκρόασις ὥστε
διαγίγχαπται αἵτιτι τῶν ἄλλων, καὶ τῶν οὐρανῶν,
καὶ τὸ πίνελον, ὅταν ὁμῶς πύοντι αἰσθήσῃ καὶ
χολῇ.

Χρή δὲ καὶ τὰς φάσεις τῶν νοσημάτων ἀπὸ
ἐπιδημιώων, παχίως ἐκδομῶν, τήν τε τῆς
ἡμέρας κατάστασιν.

Atque hæc & de acutis morbis, & de
his qui ex ipsis fiunt, dico. Qui vero re-
le prænoscere volet & superstitites futu-
ros & morituros, & quibus per plures
dies, & quibus ad pauciores morbus du-
raturus est, cum signa omnia ediscere &
expendere convenit, ita ut vires ipsorum
inter se conferendo æstimet, quemadmo-
dum perscriptum est, & de aliis, & de vri-
nis, & de sputis, ubi simul & pus & bilem
ægrotus tussiendo reiecerit. Quin & im-
petus

petus morborum semper populariter grassantium, citò animadvertere oportet, & temporis constitutionem non ignorare.

Quamvis in his praedictionibus, quadragesimi diei, atque etiam sexagesimi, suppurationumq;, & aquae intercutem, necnon febris quartanae meminerit, propositum tamen eius est de acutis dicere tantum, & de ijs qui ex acutis decidunt: in quibus omnia, (ne vni confidendum esse putes) consideranda sunt indicia, non singulorum modò vires aestimanda sunt, sed cōferri naturam eorum inter se oportet, non tantum similitum, verbi gratia, bonorum cum bonis, ac malorum cum malis, sed etiam bonorum cum malis, ac ediversis: ut sufficienter expensis omnibus, verè de eo quod futurum est pronunciemus. Ceterum indicijs morborum ipsorum proprijs censet adijcienda esse ea quae ex aëris constitutione ducuntur, quae in Aphorismis breuiter perstrinxit, singulis temporibus superuenientes morbos peculiare, ac cæli dispositionem sequentes, enumerans.

De signis dictum in genere. C A P. XI.

Εὖ μὲν τι χρὴ εἶδεναι, αἰεὶ τῶν τεκμηρίων,
καὶ τῶν ἀδυνάτων σημείων, καὶ μὴ μανθάνειν, ὅτι ἐκ
πάνη ἐστὶ καὶ πᾶσιν ὁμοῦ, τὰ τε καὶ ἀκαὶ κακὰ, καὶ
καλὰ.

μαίνοι, καὶ τὰ χερσὶ ἀγαθόν· ἐπεὶ καὶ ἐν Λιβύῃ, καὶ ἐν Δέλφω, καὶ ἐν Σκυθίῃ φαίνεται τὰ προγγεγραμμένα ἀληθεύοντα σημεῖα.

Probè id nosse expedit de coniecturis certis & aliis signis, & nō ignorare quòd in òmni anno & omni tempore, mala malum, bona bonum significant. Nam & in Libya, & De'o, ac Scythia, præscripta signa vera comperiuntur.

Accidentia ex pravis in bona, atq; etiam ex bonis in mala mutantur. Signa verò nequaquam, verti in contrarium solent, sed magis ac minus aut malum significare aut bonum: non tamen nunc bonum, rursus verò malum: aut malum nunc, rursus verò bonum. Nullum enim bonum ad genus decidit maiorum, nec ullum ex illis ad genus bonarum, quoties scilicet cum distinctionibus proprijs considerantur. Itaq; quaecunq; in urina docuit esse mala signa, hæc hæud unquam bona evadent: Et ut concoctio celorem iudicationem, securam sanitatem significat, ita cruditas malum abscessum, aut non fore iudicationem, aut temperis longitudinem, aut dolorem, aut mortem, aut horum ipsorum recidivas semper ostendit. Quare signa tum bona tum etiam mala idem denunciant omni temperis constitutione, si calida, si frigida, si temperata sit:

Libyam

Libyam enim tanquàm calidam, Scythiam tanquàm frigidam, Delum tanquàm temperatam mediamq; inter utranque pro exemplo commemoravit.

Quòd sciens & memoria valens ratò fallitur in præfagiis. CAP. XII.

Εξ ὧν καὶ εἰδέναι, ὅτι ἐν τοῖς αὐτοῖς χωρίοις ἐστὶν θένον, τὰ ποικιλοτάσια, αὐτῶν ἐπιτυχάνει, ἢ ἐκμαθὼν τις αὐτὰ κρίνει, καὶ λογίζεσθαι ὁρῶν ἐπίστανται.

Sciendum est minimè difficile esse, in his ipsis regionibus posse aliquem præfagi ex ipsis assequi, si memoria tenens ipsa rectè expendere sciat.

Alter altero peritior est in cuiuslibet rei præfensione: Nunquàm enim hallucinari supra captum hominis est, sed quàm minimè aberrare solius est artificis. Quare eius qui vires indiciorum exactè ediducit, prædictiones erunt irritæ valde paucae, ratæ verò quàm plurimæ.

Quòd in omnibus morbis acutis fiant ex his signis prædictiones. CAP. XIII.

Ποτὶς δὲ καὶ ἐδένος νοσήματος ὄνομα ὅτι μὴ τυχερὰ ἐνθάδε γινέσθαι μέντοι πάντες οὐκ ἔχουσι ἐν τοῖς χρόνοις τίτι περιγενημένοι, καί πάλιν γνώσῃ τίτιν αὐτοῖσι σημεῖον.

Cæterùm nullius morbi nomen desiderare

derare oportet quod hic nō est ascriptū:
Omnes enim qui in prædictis temporibus iudicātur, ex iisdē signis cognosces.

In hac disputatione qua instituta est de morbiū acutis, & alijs qui ex illis fiunt, omnes complexus est, hos quidem nominatim qui præceptū egebant proprijs, alios autem sub signis communibus intelligi voluit.

PRÆNO. HIPPOCRATIS
FINIS.



INSIGNIORES ALI-

QVOT SENTENTIAE

selectæ ex libris Aurelij Cornelij Celsi medici inter Latinos eloquētissimi.

EX PRIMO.

1 Vt alimenta sanis corporibus Agricultura sic sanitatem agris Medicina promittit.

2 Desidia atq; luxuria, hæc duo primum in Grecia corpora vitiarunt, deinde apud nos affixerunt.

3 Sanus homo, qui & benè valet, & sua spontis est, nullū obligare se legibus debet, ac neq; medico, neque alijs egere. Hunc oportet

varium

varium habere vite genus, modo ruri esse, modo in vrbe, sapiuq; in agro, nauigare, venari, quiescere interdum, sed frequentius se exercere. Siquidem ignauia corpus hebetat, labor firmat, illa maturam senectutem, hic longam adolescentiam reddit.

4. Eum recte curaturum esse dicunt, quem prima origo causa non fefellerit.

5. Alij putant interesse non quid morbum faciat, sed quid tollat.

6. Morbos nō eloquētia, sed remedijs curari.

7. Nam ne agricolam quidem, aut gubernatorem disputatione, sed vsu fieri.

8. Cuius rei non est certa cognitio, eius opinio certum remedium habere non potest: Verum est quod ipsam curandi rationem nihil plus confert, quam experientia.

9. Neq; ignorare medicum oportet quæ sit agri natura: humidum magis, an magis siccum corpus eius sit, validi nervi an infirmi, frequens valetudo an rara, eaq; cum est, rehemens esse soleat an lenis, breui an longa.

10. Interest enim an fatigatio, morbum, an sitis, an frigus, an calor, an vigilia, an fames fecerit, an cibi viniq; abundantia, an intemperantia libidinis.

11. Cum par scientia sit, tamen vtiliorem medicum esse scias amicum, quàm extraneum.

12. Bis in die cibum capere, potius quàm semel,

semel, potest homo, & semper quàm plurimum, dummodo hunc concoquat.

13 Concubitus neq; nimis concupiscendus, neq; nimis pertimescendus est: rarus, corpus extitit, frequens soluit. Cùm autem frequens non numero sit, sed natura, ratione ætatis & corporis, scire licet eum non inutilem esse, quem corporis neq; tangor neq; dolor sequitur.

14 Cavendum, ne in secunda valetudine aduersa præsidia consumantur.

15 Imbecillus stomacho, quo in numero magna pars urbanorum, omnesq; penè cupidi literarum sunt, observatio necessaria est, ut quod corpori vel loci, vel studij ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur qui bene concoxit, manè autò surget: qui parùm, quiescere debet: & si manè surgendi necessitas fuerit, redormire: Qui non concoxit ex toto conquiescere, ac neq; labori se, neque exercitationi, neq; negotio credere.

16 Scire licet integrum corpus esse, cùm quotidie manè urina alba, dein ruffa est: illud concoquere, hoc concoxisse significat.

17 Si lucubrandum est, non post cibum facere, sed post concoctionem.

18 Post satietatem nihil agendum.

19 Quem interdum vel domestica vel civilia officia tenuerunt, huic tempus aliquod seruandum curatiopi corporis est. Prima autem

eius curatio exercitatio est, quæ semper antecedere cibum debet: Exercitationis autem modus & finis esse debet sudor, aut certe lassitudo quæ citra fatigationem sit.

20. Nūquàm utilis est nimia satietas. Sæpe inutilis nimia abstinentia. Sæpe si quæ intemperantia subest, durior est in potu quàm in esca.

21. Secunda mensa bono stomacho nihil nocet, in imbecillo coacescit.

22. Vbi expletus est aliquis, facilius concoquit: si quicquid assumpsit, portione aquæ frigida includit, tum pausè inuigilat, deinde benè dormit.

23. Cùm quis mutare aliquid velit, paulatim debet assuescere.

24. Neq; ex salubri loco in grauem, neq; ex graui in salubrem transitus satù tutus est.

25. Neq; verò ex multa fame nimia satietas, neque ex nimia satietate fames idonea est.

26. Neq; ex nimio labore subitum ocium, neq; ex nimio ocio subitus labor sine noxa est.

27. Periclitatur & qui semel & qui bi die cibum incontinenter contra consuetudinem assumit.

28. Quod contra consuetudinem est, nocet, seu melle seu durum est.

29. Nimis ociosa vita utilis non est, quia potest incidere laboris necessitas.

30. Illud nosse oportet, quòd in labore fundantur

danti frigida potio perniciosissima est, atque etiam cum sudor se remisit, itinere fatigatio inutilis.

31 Vomitus inutilis est gracilibus & imbecillum stomachum habentibus: Utilis est plenis & biliosis omnibus, si vel nimium se repleverunt, vel parum concoxerunt. Nam siue plus est quàm quod concoqui possit, periclitari ne corrumpatur non oportet: Si verò corruptum est, nihil commodius est quàm id, quæ via primum expelli potest, eicere.

32 Deiectio autem medicamento petenda est, ubi venter suppressus parum reddit, ex eoq; inflammationes, caligines, capitis dolores, aliæq; superioris partis malâ incrementa.

33 Sed purgationes quoq; ut interdum necessariae sunt, sic ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescit enim nō ali' corpus, & ob hoc infirmum erit, cum omnibus morbis obnoxia maximè infirmitas sit.

34 Vinum dilutius patris, meracius senibus convenit.

35 Hyeme pler esse convenit, minus, sed meracius, bibere. At Vere paulum cibo demendum, adijciendumq; potioni, sed dilutius tamen bibendum est. Aestate ut sapienter recedendum cibo, sic exiguo est. Per Autumnum propter cæli varietatem periculum maximum est, itaq; neq; sine veste neq; sine calciamen-

prodire oportet: Cibo verò iam pleniore villicet, minus, sed meracius bibere.

36 Venus Hyeme non pernicioſa, Veretatiſſima: neq; Aeflate verò neq; Autumno utiliſt, tolerabilior tamen per Autumnum eſt. Aeflate in totum, ſi fieri poteſt, abſtinendum.

EX SECVNDO.

1 Saluberrimum Ver eſt, proximò deinde ab hac Hyems, periculoſior Aeflas, Autumpus longè periculoſiſſimus. Ex tempeſtatibus optime aequales ſunt ſive frigida ſive calideſ Peſſimaq; quæ variant maximè: Quo ſit ut Autumnus plurimos opprimat.

2 Saluberrimi ſunt ſerani dies: meliores pluuij, quàm tantum nebulofi, optimiq; Hyeme quæ omni vento vacant: Aeflate, quibus ſæuoni perflant. Si genus aliud ventorum eſt, ſalubriores ſeptentrionales quàm ſubſolani vel aſtrini ſunt.

3 Ventus ubiq; ſerè à mediterraneâ regiõnibus veniens ſalubris, à mari grauis.

4 Aetas media tutiſſima eſt, quæ neq; iuuentutis calore, neq; ſenectutis frigore infeſtat.

5 Longi morbi ſenectus, acutis adoleſcentia magis patet.

6 Corpore autem habiliſſimum, quadratum eſt, neq; gracile neq; obefum: Nam longa ſtatu

flatura, ut in iuuenta decora est, sic maturâ senectute conficitur: Corpus gracile, infirmum: sic obesum, hebes est.

7. Facile securus est aliquis in ijs quæ sæpe sine periculo quasit.

8. Si speciosior & plenior aliquis & coloratior factus est, suspecta habere bona sua debet: quia quia neq; in eodem habitu subsistere, neq; ultra progredi possunt, ferè retrò quasi ruina quadam revolvuntur. Peius tamen signum est ubi aliquis contra consuetudinem emarcuit, & decorem caloremq; amisit, quoniam in his quæ superant, est quod morbus dormiat: in his quæ desunt, non est quod ipsum morbum ferat.

9. Mali morbi testimonium est vehementer & crebro spirare.

10. Vomitus sincera pituitæ vel bilis periculosus, peiorq; si viridis aut niger est. At mala urina est in qua subsidunt subrubra aut livida, deterior in qua quasi fila quadam tenuia atq; alba, pessima ex his si tanquam ex fursuribus factas nubeculas repræsentat, diluta quoq; atq; alba vitiosa est, sed in phreneticis maxime. Alvus autem mala est ex toto suppressa. Periculosa etiam quæ inter fibres fluens, conquiescere hominem in cubili non patitur, utiq; si quod descendit, est perliquidum, aut albidum, aut pallidum, aut spumans.

Item quod excernitur malum est, exiguum, glutinosum, liuidum, biliosum, cruentum: aut peioris odoris quàm ex consuetudine, malum est & syncerum. Urina verò rubra & tenuis in magna cruditate esse consuevit: Pestifera tamen est precipueq; mortifera, nigra, crassa, mali odoris. Alui quoq; varia & discreta reddens, pestifera est: Sed egrum in precipitium esse denunciat, quæ liquida, eademq; vel nigra vel pallida, vel pinguis est, utiq; si magna fæditas odoris accessit.

11 Omne auxilium corporis aut demit aliquam materiam aut adiicit, aut euocat aut reprimat, aut refrigerat aut calfacit, aut durat aut mollit.

12 Sanguinem incisa vena mitti nouum non est: sed nullum penè morbum esse in quo non mittatur, nouum est.

13 In mittendo sanguine non tam annos medicus numerare, quàm vires egrotantis estimare debet.

14 Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat.

15 Satius est anceps experiri auxilium, quàm nullum.

16 Si morbi ratio patitur, sanguinis detractioni tempus aptissimum est dies aduersæ valetudinis secundus aut tertius. Sed ut aliquando etiam primo die sanguinem mittere necesse

neceſſe eſt, ſic nunquam utile poſt diem quartum eſt, cum iam ſpacio ipſo materia & ex-
hauſta eſt & corpus corrumpit, ut detractio
imbecillum id facere poſſit, non poſſit integrũ.

17 Quod ſi vehemens febris urget, in ipſo
impetu eius ſanguinem mittere, hominem iu-
gulare eſt. Expectanda ergo remiſſio, & iſta
medicina ſerè in biduum diuidenda: Satius
enim eſt primò leuare agram, deinde perpur-
gare, quàm ſimul omni vi effuſa fortasſe præ-
cipitare.

18 Cum ſit crudo minimè mittendus ſan-
guis, tamen ne id quidem perpetuum eſt, neq;
enim ſemper concoctionem res expectat: Nam
ſi ex altiore loco deſcendit aliquis, ſi conuulſus
eſt, ſi ex aliquo ſubito caſu ſanguinem vomit,
quantũ paulò antè ſumpſit cibum, tamen
protinus ei materia æmendanda eſt: idemq; etiam
in alijs repentinis caſibus dictum ſit.

19 Mittere autem ſanguinem cum ſit expe-
ditiffimum, uſum habenti, tum ignaro diffi-
ciliſſimum eſt, iuncta eſt enim vena arterijs, his
nerui: Ita ſi neruum ſcalpellus attingit, ſequi-
tur neruorum diſtentione ea quæ crudeliter ho-
minem conſumit: At arteria incifa neq; coit,
neq; ſanſcit, interdum etiam ut ſanguis ve-
hementer erumpat efficit.

20 Incidenda ad medium vena eſt, ex
qua cum ſanguis erumpit, colorem habitumq;

eius oportet attendere: Nam si in crassus & niger est, vitiosus est, ideoq; vtiliter effunditur: Si rubet & pellucet, integer est, eaq; misce sig sanguinis adeo non prodest, vt etiam nocet, protinusq; in suppressendus est.

11. Semper ante finem faciendus est quam anima deficiat.

12. Vehementi malo nisi equè vehemens auxilium succurrere non potest.

13. Medicamentum non semper aegri prodest, nocet semper sanis.

14. Initia morborum primùm famem stimulant, desiderant, ipsi deinde morbi, moderationem, vt neq; alius quam expedit, neq; eius ipsum nimium sumatur. Neque enim conuenit iuxta inedia protinus satietatem esse: Quod si sapi corporibus etiam inutile est; vbi aliqua necessitas famem fecit, quantò inutile est in corpore aegro? Neq; vlla res magis adiuuat laborantem, quam tempestiua abstinentia.

15. Plus alimenti est in carne quam in vlla alia cibo.

16. Brassica subcruda aluum mouet, bis cocta stringit.

EX TERTIO.

1. Natura repugnante nihil medicina proficit. Magis tamen ignoscendum medico est parum

parum proficiente in acutis morbis quàm in longis. hic enim breue spatium est, intra quod, si quod non profuit auxilium, aeger extinguitur: ibi & mutationi remedium & deliberationi tempus patet, adeò ut raro, si inter initia medicus accessit, obsequens aeger sine illius vitio pereat.

2 Illud ignorari non oportet, quòd non omnibus aegris eadem auxilia conveniunt.

3 Oportet itaq; ubi aliquid non respondit, non tanti putare authorem quanti aegrum, & experiri aliud atq; aliud.

4 In acutis morbis serius aeger alendus est, ut primò dempta materia impetum frangatur. In longis maturius, ut sustinere spatium affecturi mali possit.

5 Multum interest ab initio quin rectè curatus sit, an perperam: quia curatio minus hic prodest in quibus assidue frustra fuit.

6 Omnium optima sunt quies & abstinentia: solaq; abstinentia sine ullo periculo medetur.

7 Non dubium est quin vix quisquam, qui non dissimulavit, sed per hac maturè morbo occurrit, agraet.

8 Asclepiades officium esse medici dicit, ut tutò, ut celeriter, ut iucundè curet, id votum est, sed ferè periculosa esse nimium & festinatio, & voluptas solet. Qua verò moderatione utendum sit ut quātum fieri potest omnia ista

contingant, quæritur qua ratione primis diebus æger continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam datis concoctionem moliebantur, eò quòd cruditatem maximè horrebant. Deinde eam materiam quæ ledere videbatur, ducendo sæpius aluum subtrahebant. Asclepiades medicamenta sustulit: aluum non toties, sed ferè tamen in omni morbo subduxit. Febre verò ipsa infestante se remedio hoc uti professus est: conuellendas enim vires ægri putavit, luce, vigilia siti ingenti, sic ut ne os quidem primis diebus elui sineret. Quo magis falluntur qui per omnia iucundam eius disciplinam esse cõtendunt. Is enim vltioribus quidem diebus cubatæ etiam luxuria subscripsit, primis verò tortoris vicem exhibuit. Ego autem medicamentorum dari portiones & aluum duci non nisi rarò debere concedo. Et id non ideo tamen agendum, ut ægri vires conuellantur existimo: quoniam ex imbecillitate summum periculum est. Minui ergo tantum exuperantem materiam oportet, quæ naturaliter digeritur ubi nihil noui accedit. Itaque abstinentum à cibo primis diebus, in luce habendus æger, nisi infirmus interdum est, ubi cubare quàm maximo conclauì debet. Quod ad sitim verò somnumq; pertinet, moderandum id est, ut interdum vigilet, noctu, si fieri potest, conquiescat: ac neque potet, neque nimium siti

crucietur. Os etiā eius elui potest, ubi & sic-
tum est & ipsi fœtet, quamvis id tempus apertū
potioni non est: Commodeq; Erasistratus dixit,
saep̃ inferiore parte humorem non requirentē,
os & fauces requirere.

Optimum medicamentum est opportu-
nē cibum datus, qui quando primū dari de-
beat ambigitur, alijs quintum diem, alijs se-
xtum expectantibus. Asclepiades ubi agrum
triduo per omnia fatigarat, quarto die cibum
indulgebat. At Themison non quando cœpisset
fibris, sed quando desisset aut certē leuata
esset, & ab illo tempore expectato die tertio
cibum dabat. Nihil autem horum vtiq; per-
petuum est: nam potest primo die dari, potest
secundo, potest tertio, potest nō nisi quarto aut
quinto, potest post vnam accessionem, potest
post duas, potest post plures. Refert enim qualis
morbus sit, quale corpus, quale cælum, qua
etas, quod tempus anni: minimeq; in rebus
multum inter se differentibus perpetuum esse
præceptum temporis potest.

10 Illud est vnum semper & ubiq; seruan-
dum, ut agri vires subindē assidens medicus
inspiciat, & quandiu supererunt, abstinen-
tia pugnet: Si imbecillitatem vereri cœperit,
cibo subuenias. Id enim eius officium est, ut
agrum neq; supernacua materia oneret, neq; im-
becillitatem fame perdat.

11 Antiquos admodum celebres Pythagorici numeri fefellerunt, cum hîc medicum non numerare dies debeat, sed ipsas accessiones intrinseci, & ex his coniectare quando cibum dandus sit.

12 Ab vno medico plures sanari non possunt.

13 Scire oportet optimum cibo tempus esse febre finita.

14 Cum egros semper securos agere conveniat, ut corpore tantum non etiam animo laborent, tum præcipuè ubi cibum sumpserunt: itaq; si qua sunt quæ exasperatura sunt eorum animos, optimum est ea dum agrotant eorum notitia subtrahere.

15 Periti medici est non protinus, ut venit, apprehendere manu brachium, sed primum residere hilari vultu, percontariq; quemadmodum se habeat: & si quæ eius metus est, eum probabili sermone lenire: tum deinde eius corpori manum admovere.

16 Medicus neq; in tenebris neq; à capite atri residere debet, sed illustri loco aduersus eum, ut omnes notas ex vultu quoq; cubantis perspiciat.

17 Ponendi sunt egro varij cibi, sicut Asclepiades præcepit, tum demum ubi fastidio urgetur, neq; satis vires sufficiunt, ut paulum ex singulis degustando famem vitet. At si neque

que vi neq; cupiditas deest, nulla varietate sollicitandus ager est, ne plus assumat quàm concoquat. Neq; verum est quod ab eo dicitur, facilius concoqui varios cibos: eduntur enim facilius, ad concoctionem autem materiae generis & modus pertinent.

18. Neq; inter magnos dolores, neque in crescente morbo, ratum est, agrum impleri cibo, sed ubi inclinata iam in melius valitudo est.

19. Id quoq; videndum est quod quidam solum precipiunt, an astrictum corpus sit, an prosuat. Nam si astrictum est, ducenda alvus est, movenda vrina, eliciendus sudor: contra si prosuat, sudor coercendus, quies adhibenda erit, tenebris somnoq; quandocunq; volet utendum, non nisi leni gestatione corpus agitandum, & pro genere mali subueniendum.

20. In febre pestilente minimè utile est aut fame aut medicamentis uti, aut ducere alvum. Si vires sinunt, sanguinem mittere optimi est, precipueq; si cum dolore febris est.

21. Non facile sanguinem mittere, non facile ducere alvum, non cruciari vigilia fame, aut nimia siti, non vino curare satis convenit.

22. Cum verò in summo incremento morbus est, utiq; non ante diem quartum, magna siti antecedentes frigida aqua copiose prestanda est, ut bibat etiam ultra satietatem: cum

iam

iam venter & praecordia vltra modum repleta sunt satinq; refrigerata, vomere debet. Quidam ne vomitum quidem exigunt, sed ipsa aqua frigida tantum ad satietatem data pro medicamento vtuntur. Vbi vtrumlibet factum est, multa veste operiendus est & collocandus vt dormiat, fereq; post longam sitim & vigiliam, post multam satietatem, post infractum calorem, plenus somnus venit, per quem ingens sudor effunditur: idq; presentissimum auxilium est: sed in his tamen in quibus praeter ardorem nulli dolores, nullus praecordiorum tumor nihil prohibens vel in thorace, vel in pulmone, vel in faucibus, non vlcus, non defectio, non deiectio, non profusum alui fuit:

23. Est etiam observatio necessaria qua quis in pestilentia vtatur adhuc integer, cum tamen securus esse non possit: Tum igitur oportet peregrinari, navigare, gestari, ambulare sub diuo ante aelum leuiter, vitare fatigationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem: multoq; magis se continere si qua grauitas in corpore est, tum neque mane surgendum, neq; pedibus nudis ambulandum est, non remendum, neq; mouenda alui, neq; etiam si mota est per se comprimenda: abstinendum potius, itemq; vitandum balneum, sudor, meridiana somnus, vtiq; si cibum antecessit, qui tamen semel die tammodum assumitur, in sta-

per etiam modicum, ne cruditatem moueat. Ad-
ternis diebus inuicem modò aqua, modò vi-
num bibendum est. Quibus seruatis, ex reli-
qua victus consuetudine quàm minimum mu-
tari debet.

24 Sed cùm eadem omnibus conuenire non
possunt, frè quoratio non restituit, tenacitas
adiuuat.

25 Sape etiam pertinacia iuuandis, ma-
lum corporis vincit.

26 Quartana febris neminem ingulat, ve-
tus quartana raro nisi Vere soluitur.

27 Si quartana quieuit diu, meminisse
eius diei conuenit, eoq; vitare frigus, calorem,
cruditatem, lassitudinem, facile enim reuerti-
tur nisi à sano quoq; aliquandiu timetur.

28 Est qui fugians horrorem febrilem ante
accessionem vtiliter edat allium, aut bibat
aquam calidam cum pipere, siquidem ea quo-
que assumpta calorem mouent qui horrorem
non admittit.

29 Ex phreneticis alij hilares, alij tristes
sunt, alij facilius continentur & intra verba
desipiunt, alij consurgunt & violenter qua-
dam manu faciunt, atq; ex his ipsis alij nihil
nisi impetu peccant, alij etiam artes adhibent,
summamq; speciem sanitatis in captandis ma-
iorum operum occasionibus præbent, sed exitu
deprehenduntur. Ex his autem res qui iura
verba

verba desipiunt, aut leuiter etiam manu per-
citant, onerare asperioribus coercitionibus su-
peruacuum est: eos verò qui violentius se ge-
runt, vincire conuepit, ne vel alteri vel sibi
noceant. Neq; credendum est si vinctus ali-
quis dum lenari vinculis cupit, sanum iam se
fingat, quamuis prudenter & miserabiliter lo-
quatur, quoniam is dolus insanientis est. Ad-
uersus omnium sic insanientium animos gere-
re se pro cuiusq; natura necessarium est.

30. Aselepiades perinde esse dixit his san-
guinem mitti, ac si trucidentur, rationem hanc
sequutus, quòd neq; insania esset nisi febre in-
tenta, neque sanguis nisi in remissione eius re-
cte mitteretur.

31. Omnibus sic affectis somnus & difficilis
& precipue necessarius est, sub hoc enim ple-
riq; sanescunt.

Somnus illis medicamentis accersendus est
que soporifera sunt, habita scilicet eadem mo-
deratione que hic necessaria est, ne quem ob-
dormire volumus, excitare postea nò possimus.

32. Neq; ignorare oportet lenidrem esse
morbum cum risu quàm feridò insanientium.

33. Aquæ inter cutem tres species sunt: hu-
ius communis est humoris nimia abundantia, ob
quam ne vlcera quidem in hiis agris facili sa-
neſcant.

34. Facilius in seruis quàm in liberis col-
litur

litur hydropisis, quia cūm desideret sumē,
sitim, mille alia tēdia, longamq; patientiam,
promptius his succurritur qui faciliē coguntur,
quā quibus inutilis libertas est. Sed nō hi
quidem qui sub alio sunt, si ex toto sibi tem-
perare non possunt, ad salutem perducuntur.
Ideoq; non ignobilis medicus Chrysippi disci-
pulus apud Antigonum regem amicum quen-
dam eius nota intemperantia, mediocriter eo
morbo implicītū, negavit posse sanari. Cumq;
alter medicus Epirotes Philippus se sanatu-
rum polliceretur, respondit illum ad morbum
egri respicere, se ad animum. Neque eum res-
fessit. Ille enim cūm summa diligentia non
medici tantummodo sed regis cūstodiretur,
tamen malagmata sua deuorando, bibendoq;
suam urinam, se precipitauit.

35 Inter initia non difficillima curatio est,
si imperata sunt quies, sitis, inedia. At si ma-
lum inueterauit, non sine magna molestia
discutitur.

36 Multū ambulandum, currendum
aliquando est, superiores maxime partes sic
perfricanda ut spiritum ipse contineat, euo-
candus est sudor non exercitatione tantum-
modo, sed etiam in arena calida, vel laconico,
vel clubano, similibusq; alijs, maximeq; utiles
naturales & sicce sudationes sunt, quales su-
per Baiae habemus in myrtetis. Balneum

atq; omnis humor alienus est.

37 Potio non ultra danda est quàm vitam sustineat, optimaq; est quæ urinam mouet.

38 Non alienum erit metiri potionem hydropici & urinam: nam si plus humoris excernitur quàm assumitur, ita demùm secunda valetudinis spes est.

39 Qui de phthysi dubitant an sit, hac nota vtuntur: Quod excreatum est si in ignem impositum mali odoris est.

40 Lac quod in capitis doloribus & in acutis febribus pro veneno est, in phthysi tamen sicut in omnibus longis difficilibusq; febriculis rectè dari potest.

DE QUARTO.

1 Vno die fluere alnum saepe pro valetudine est, atq; etiam pluribus, dum febris absit, & intra septimum diem conquiescat: Purgatur enim corpus, & quod intus laesum erat, vtiliter effunditur. Verùm spatium periculosum est: interdum enim termina & febriculas excitat, viresq; consumit: interdum autem euenit vt id neglectum pluribus diebus curari difficillimum sit.

2 Medicamentis vti nisi in vehementibus malis superuacuum est.

3 Podagricis equitare alienum est.

Quibus articularum dolor certis temporibus reuertitur, hos à curioso victu cauere oportet, ne inutilis materia corpori supersit.

EX QUINTO.

1. Medicamentorum vsum magna ex parte Asclepiades non sine causa sustulit, cum omnia ferè stomachum ledant, maliq; succi sint: ad ipsius victus rationem potius omnem suam curam transtulit. Verùm vt illud in pleriq; morbis vtilius est, sic multa admodum corporibus nostris incidere consueuerunt, quæ sine medicamentis ad sanitatem peruenire non possunt. Illud ante omnia scire conuenit, quòd omnes medicinae partes ita innexæ sunt, vt ex toto separari non possint, sed ab ea nomen trahant à quo plurimum petunt. Ergo vt illa quæ victu curat, aliquando medicamentum adhibet, sic illa quæ præcipuè medicamenti pugnât, adhibere etiam rationem victus debet, quæ multum admodum in omnibus malis corporis proficit.

2. Vti somniferis nisi nimia necessitas urget, alienum est: sunt enim ex vehementibus medicamentis & stomacho aliis.

3. Est prudentis hominis primùm eum, qui seruari non potest, non attingere, ne videatur occidisse quem fors ipsius peremit. Deinde vbi grauius melius est, sine certa tamen desperatione.

ne, indicare necessarijs periclitantis in difficultate rem esse, ut si victa ars malo fuerit, vel ignorasse vel fefellerit non videatur. Sed ut hoc prudenti viro conveniunt, sic rursus hystrionis est parvam rem attollere, quod plus prestasse videatur.

4 Dubia spes certa desperatione est potior.

FINIS.

R E R V M E T V O C V M

toto hoc volumine memorabilium

index, cuius numerus pa-
ginam indicat.

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| Abdominis vis in iuvē | Abcessus boni vel ma- |
| da cōcoctione. pa. 134 | li cognitio. 367 |
| Abortus periculum à | Abstinentum in ac- |
| missione sang. item | cessionibus. 1324 |
| ab alui fluore. 182. 183 | Accessionum initio nō |
| Abortus periculum à | confere somnus. 94 |
| gracilitate mamma- | Accessiones si eandem |
| rum. 185 | semper horam serva- |
| Abortioni quo tempo- | uerint, febrem lon- |
| re obnoxia mulier. | gam fore porciunt. |
| 190. 191 | 251 |
| Abcessus in febribus. | Accessionibus singulis |
| 252 | febres solutæ cur su- |
| Abcessus à lassitudi- | binde reuertatur. 166 |
| ne. 252 | Acetabula seu Coty- |
| Abcessu finiuntur mor- | ledones. 190 |
| bi longi. 169 | Acidus ructus. 141 |
| | Acut |

I N D E X.

Acuti morbi. 244
 Acutis quando medi-
 candum. 16
 Aegrorum de salute
 quando bene speran-
 dum. 19
 Aegri decubitus conue-
 niens. 316. 317
 Aetati aliquid condo-
 mandum. 312. 308
 Aetati morbi. 206. 207
 Alimentum trifariam
 dicitur. 187
 Alopecia. 190
 in Alui profluvij mu-
 tationes excremen-
 torum iuvant. 41
 Alui profluvio superue-
 niens vomitus utilis.
 171
 Angina. 181
 Animi defectio mensu-
 ra euacuatiōis. 42
 Aphoristica doctrina
 quæ. 1
 Apoplexia. 189
 Aqua optima quæ. 184
 Aqua inter cutem. 182.
 183. 184
 Ascites. 148
 Aquilonia constitutio.
 117
 Articulorum tumores.
 283
 Aut imitatur naturam.

37
 Assueti etiam deteriora
 sint, insuetis minus
 molestant. 31
 Atque bilis ab humore
 melancholico disci-
 men. 64. 111
 Asthma. 11
 Aversio quid. 85
 Austrinæ constitutionis
 nota. 130
 Autumnus insalubris.
 233

B

Balbi alui profluvio
 cur obnoxij. 74
 Balneum quibus feбри-
 bus convenit. 174
 Biliosum acutos mor-
 bos operatur. 176

C

Calor innatus, & calor
 febrilis. 17
 Calor natus omnium
 operationum autor.
 19. 20
 Calidi usus immodi-
 cus. 106
 Calidi officium. 180
 Calculi causa. 214
 Calculi nota utina are-
 nosa. 173
 Calui. 299
 Cancti oculi. 200
 Capitis dolor. 85. 86

D

Capit

Capitis dolor & fau-
ctum cū febre. 379. 380
Caros. 94
Cardia, Cardialgia, Car-
diogimos. 169
Cardiacæ syncope. 143
Caralepsis, Catoche. 96
Causæ morborum per
contraria curantur. 7
Cerebri passiones. 99
Cerebri concussio. 91
Cerebro vulnerato qd
contingit. 93
Cibi exhibendi ratio. 3
Coma. 96
Comitialis morbus.
99. 100
Cōceptus impellimēta.
191
Cōceptus signa. 188. 189
200
Concocta medicari. 40
Constitutionem morbi
considerate, quid. 15
Cōsuetudinis vis. 11. 206
Convalescentiū & mo-
runtorū signa. 376. 377
Concussio. 101
Cotidis motus velox &
morsus. 169
Cor proprio affectu la-
borans. 143
Corpus repentiē muta-
re, periculosum. 45
Corpus molle equali-

ter & calidam, No-
num. 357
Coxendicam dolor. 394
Crassi citius intereunt.
109
Crisis. 118
Crisis & Criticorū die-
rum ratio. 146.
147. 37. 375
Crudus humor medica-
mento non obedit.
119
Cubare in ventrem quid
significet. 119
Cutis densa vel laxa in-
morituris. 171
Cynanchæ minus peri-
culosa. 114
Declinātis ætatis mor-
bi. 118
Deficientes animo. 143
Defectio animi. 198
Detretoriorū dictum
ratio. 374
Deiectiones nigre, &
deiectio hominis sa-
ni. 161
Deiectiones syncere 71
Deiectionū bonarum
& malarum genera.
341. 342
Deonium Aridor quid
significet. 319
Desipientia. 116

Difficultas intestinorū seu dysenteria. 71	nudatione. 195
Desperati non sunt at- tendendi. 10	Escharæ. 110
Destillationes senibus. 218	Evacuatio cuius humo- ris faciendâ. 37
Destillationes. 115	Evacuatio omnium hu- morum equaliter fit per venæ sectionem. 4. 15. 78
Dies intercurrentes, in- dices & indices. 147. 248	Evacuandum vsq; ad animi deliquiū quā- do. 41
Difficultas spirandi. 160	Evacuatio immodica periculosa. 7
Difficultas urinx. 75	Evacuatio quâ ducen- da. 39
Difficultas intestinorū in lienosis. 156. 157	Eunuchi. 289
Dysenteria unde. 65	Excretiones corporis. 81. 83
Distensio seu Terrens. 101. 103	Excretiones in febrī- bus. 59
Divinum in morbis quid. 310	Eruptio sanguinis à do- lore capitis. 388
Doloris species. 141	Experimentum cur pe- riculosum. 1
Dolor dolorem obscu- rat. 88	Fames canina. 28
Color quid. 91. 93	in Fame laborandum non est. 46
Elleboro purgandi. 57	Fames siccæ. 81
Emmetum quid, & e- ius vsus. 191	Fastidium cibi in mor- bis. 31
Epilepsia. 100	Fauces inflammatione laborantes. 38
Error in victu. 9	Febris. 10
Erysipelas in muliere gravidâ. 189	Febrē consulsioni su- perue
Erysipelas. 131	
Erysipelas verū fotas. 288	
Erysipelas in ossis de.	

- peruenire melius. 101
 Febres diatriæ. 263
 de Febribus 248 &
 deinceps. Item 173
 Febris quibus morbis
 confert. 148
 Fecundæ quæ sunt, &
 quæ non. 203
 Frigidi incōmoda. 107.
 120. 125. 178
 Frigidæ aquæ perfusio
 conuulsioni remedio
 est. 107
 Frigiditas partium extre-
 marum. 255. 273
 Furorē cur Vete. 112
 Gibbositas. 118
 Graciles quomodo pur-
 gandi. 54
 Gravidarū affectus. 178
 Gravitas debilitatis est
 indicium. 317
 Grauedines & saucedines
 senes comitantur
 ad mortem. 118
 Gurgulionē scire est
 periculum. 385
 H
 Habitus Athletarum. 5
 Hæmorrhoides. 158
 Hepatis dolori febris
 superueniens. 149
 Hepar aqua plenum. 153
 Hydrops causa. 336
 Hydrops. 151
 Hydropisim præceden-
 tia signa. 145
 Hyemales morbi. 213
 Hyeme ventres calidiores. 19
 Hyemales medicatio-
 nes. 145
 Hypochondria inflata
 & murmurantia quid
 portentant. 154
 Hypochondriis inflatis
 lac noxium. 89
 Hypochondria quæ sa-
 lubria & quæ non.
 245. 319
 Humidū citius nutrit.
 27
 Humorē in corpore a-
 bundantis signa. 37
 I
 Icterus ab hepatis ob-
 structione. 41
 Icterus febrī superue-
 niens. 167
 Ictericis dolores. 159. 161
 Ileos, vel Iliaca passio.
 147
 Ieiunium qui faciliē se-
 runt. 16
 Immodicum omne pe-
 riculosum. 7
 Infantium morbi. 21
 Indicationes à morbo
 & vitibus. 21. 24
 Indi

I N D E X.

Indices dies qui, item
intercidentes. 248
Indicia singula confide-
randa, necvni confi-
dendum. 261
Inflammatio vesicæ. 371
Inflammationis ad pus
transmutatio. 319
Innatus calor omnium
operationum autor.
119
Infantia soluitur varici-
bus aut hæmorrhoi-
dibus. 311
Intestinorum vulnus.
236. 288
Intestinorum difficul-
tas ab atrobile lethar-
gicis. 289
Iudicationis perfectæ
signa. 39
Iudicatio. 373
Iudicatorij dies. 247.
374
Iudicationes in mulieri-
bus à partu. 378
Iudicium. 31
Iuueum morbi. 217
L
Lac mulieris quæ nec
grauida est nec pepe-
rit. 186
Lac quibus prodest &
quibus nocet. 39
Lacrymæ non volunta-

rie in morbis quid si-
gnificent. 261. 315
Lassitudo. 276
Lassitudinis remedium
quies. 277
Latenti dolores. 22. 217
Lentor dentium in fe-
bre. 261
Leptæ quando fiant. 211
Letargica passio 96. 217.
213
Leuitas intestinorum
seu lienteria. 56. 71
Leucophlegmatiz so-
lutio. 155
Lienes magni. 223
Lienos qui. 156
Linamentum. 192
Lippitudines quando
fiant. 216. 248
Lippitudo alui proflu-
vio tollitur. 116
Loca conferentia eua-
cuationibus. 49
Longi morbi signa. 255
Lumbrici. 213
Lucæ refugientes oculi.
315
Magnitudo corporis
quibus utilis. 210
Manuum gesticulatio
quid significet. 319
Medicamēta sanis. 41
Medicationes sub Ca-
D 5 ne

ne difficiles.	53	Mutationes rependens	periculoꝝ.	36
Medicationis modus le		Mutationes tēporum.		114
ge naturæ examinan	38.52	Muti ex dolore capitis.		87
das.		Mutatio per quaterna-		
Medicari in valde acu-		rios consideranda.	375	
tis eadem die.	56	Mutationes variz lon-		
Medicus minister natu		gitudinem morbi de-		
ra.	37	monstrant.	155	
Medicus quod futurū		N		
est prædicens lauda-		Nares humidiores.	117	
tur, & à suspicione		Nasus compressus & a-		
interempti ægi libe		cētis in morbis quid		
rarur.	312	significet.	331	
Melancholia.	113	Naturæ, aliæ ad alia		
Melancholicus humor.		et tempora melius aut		
Menſis minor triginta		pelos habent.	140	
diebus, maior vigin-		Naturæ officium.	6	
ti nouem.	377	Nimium omne naturæ		
Morbi ex replectione.	4	contrarium.	35	
Morbi ad alia tempora		Nephritidi ſuccedentes		
benè malève ſe ha-		hæmorrhoides.	158	
bent.	140	Nubecula in vrinis.	167.	
Morbus peracutus.	10	Nutrientia velociter ve-		
Morbi acuti & longi.		locēs habēt excretio-		
244		nes.	27	
Morbi ſimiles minus		Occaſio.	1	
periculoſi.	207	Oculorum dolores.	114	
Morientium ſigna.	376	ex Oculis ſigna.	314	
Morpendum in princi-		Omenti procidētia.	156	
pio morbi.	48	Omnia naturalium		
Motum naturæ oportet		opera		
animaduertete.	39			
Mulierum affectus &				
morbi.	178			

Operationum causa	Potu facilius imple-
calor.	mur quàm cibo.
Omnia facienti secun-	Prædictionis utilitas.
dum rationem si non	308. 309
succedat, quid facien-	Providentia.
dum.	310
Ophiassus.	Prædictiones in acutis
Os ruptum non glori-	non tuæ.
natur.	244
Oscitatio.	Prognostica de urinis.
Ossis capitis præcisio.	216. 244
195	Proflutū alui in pleu-
P	riide.
Pandiculario.	141
Parrem affectam indi-	Puerorum morbi.
cat calor aut frigus.	215
214	Pulmonis vitia.
P	124
Purgandum initium cum	Purgadum initium cum
turgent humiores.	turgent humiores.
43	43
Purgatio.	Purgatio.
4. 76	4. 76
Purgationes quæ &	Purgationes quæ &
quando cōferunt.	quando cōferunt.
36	36
Pus dum conficitur, do-	Pus dum conficitur, do-
lores ac febres viget.	lores ac febres viget.
277	277
Purulenti quibus signis	Purulenti quibus signis
cognoscantur.	cognoscantur.
360	360
Puris boni signa.	Puris boni signa.
330	330
Pustulæ laetæ.	Pustulæ laetæ.
186	186
Qualitas victus.	Qualitas victus.
10	10
Qualitas euacuationis.	Qualitas euacuationis.
137	137
Quartana æstus bre-	Quartana æstus bre-
ues.	ues.
148	148
Quartus dies septeno-	Quartus dies septeno-
rum est index.	rum est index.
247	247
Quarta circuitio septi-	Quarta circuitio septi-
mæ index erit.	mæ index erit.
278	278
Quater	Quater

Quaternarij sex, vigesimum conflant. 376
 Quies lassitudini confert. 277

R.

Reliquiæ morborum. 145

Remissio aut intentio symptomatum sine ratione non est tuta. 297

Renum & vesicæ vitia. 159

Repletio immoderata. 7

Repletio curatur evacuatione, & cōtrā. 47

Refrigerationes seu rigores à parte posteriore magis fiunt. 202

Refrigerata quæ excalfacienda. 279

Regius morbus. 156, 267

Remedia non temerè mutanda. 298

Rigor ex potatione. 233

Rigores quotidiani in febribus. 266

Rigor succedens ardenti febrī. 264

Rigor febris non intermittens. 257

Rigores sexto die contingentes. 251

Ructus acidus in lientia. 71

Ructus acidus. 141

Ruptiones. 73

S.

Sanguinis mictio. 173

Sanguinis vomitus. 79

Sanguinis in aluum effusio. 137

Sanguis in māmīs prolacte. 187

Sanguinem suprà ferri, malum. 65

Sanguinis fluor è paribus quādo expectandus. 180

Sanitas. 84

Scrotationis promptæ signa. 352

Senes minus ægrotant. 198

Senum morbi. 218

Siccitates imbribus salubriores. 231

Septenariotū diductio. 176

Signorum consideratio in genere. 258

Singultus ex nimia putrefactione. 270, 71

Singultus. 277

Singultus quo differt à convulsione. 2109

Singultus sterputamento soluitur. 2109

Singultus in hepatis inflammatione. 2109

Situs

Sitis nocturna. 31
 Sitis in purgatione. 61
 Somnus delitium se-
 datus. 95
 Somnus & vigilia im-
 modica. 100
 ex Somno signa. 138
 Somnus hians ore exi-
 tiolosus. 138
 Somni per hyemē lon-
 gissimi. 19
 Spinæ dolores. 160
 ex Spiratione signa. 312
 Spiratio offendens in
 febribus. 173
 Spuma patientis pul-
 monis signum. 115
 Sputum sanguinis &
 sputum purulentum
 ex Spuio signa. 331
 Sternutationes malæ.
 113
 Sternutamenti causa. 119
 Sticticidium urinx vel
 stranguria. 146
 Stictidium urinx sol-
 uitur venæ sectione.
 81
 Strangulatio. 124
 Sudor dentium in febi-
 bus quid portendat.
 319

Stupor linguæ. 104. 105.

Suauitas cibi salubris.
 30
 Sudor multus ex som-
 no factus quid signi-
 ficet. 68
 Sudor multus calidus
 vel frigidus. 81
 Sudores frigidi quid si-
 gnificent. 113
 Sudores in febricitanti-
 bus qui boni. 151
 ex Sudoribus signa. 123
 Suffocatio ab vtero le-
 uatur. Remutatione.
 184
 Suffitua aromata. 180.
 200
 Supinum iacere. 317
 Suppuratio. 329. 334.
 355
 Suppurationis termi-
 nus. 357
 Supputatio à ventris do-
 lore. 357
 Suppuratio ex pleuriti-
 de. 359
 Suppurati qui vruntur
 & secantur. 80
 Suppurati vsti vel secti
 qui euadunt. 151
 Suppurati quibus pus
 vniuersum effluxerit.
 moriuntur. 74
 Suppuratione rupta. 110
 Surditatis solutio. 165
 Suid

- Sordidas sistit biliosas
 deiectiones, & cōtra. 167
 Suspiria luctuosa in a-
 cuis mala. 173
 Tabidi purgandi per in-
 feriora. 175
 Tabida ætas. 175
 Tabis lethalis signa. 177
 Tabidis lac cōuenit. 177
 Tabidis Autumnus ma-
 lus. 177
 Tenuis, tenuissimus,
 maximeq; tenuis vi-
 ctus. 179
 Tempora legitima &
 constantia. 118, 119
 Tenesmus. 119
 Tertiana exquisita. 164
 Tetanus. 103
 Tormina. 141
 Tonillæ. 113
 Tumor in hypochon-
 driis qua parte pericu-
 losior. 126 & c.
 Tumores in ulceribus
 quibus nō apparent. 108, 118
 Tumores molles boni
 118
 Turgētes humores. 40
 Tussis aquæ inter cu-
 tem superueniēis ma-
 la. 1, 2
 Tussis sicca. 161
 Vacuatio. 435
 Varix. 111
 Vena secunda Vera. 76
 Ventrīs dolores. 136, 137
 Venæ communes sunt
 vtero & mammis. 181
 Veneris vīdus afferre po-
 diagram. 190
 Venter in quouis mor-
 bo mollis. 139
 Venti Auster, Aquilo.
 116
 Ventosi seu flatuosi. 115
 Ver saluberrimum. 111
 Verrucæ. 114
 Vertigo. 160, 97
 Vesica. 160
 Victu tenui ægri ledun-
 tur. 89
 Vigēsimum diem com-
 plēt tres septēnarij &
 sex quaternarij. 175
 Vigēsimus dies iudica-
 torius. 118, 116
 Vigiliæ vnde, & quas
 relaxationes afferant. 56
 Vigiliæ immodicæ Hip-
 pocriticam faciem ef-
 ficiunt. 111
 Vigiliās sequens cōsul-
 tio. 96
 Vinum generosum fa-
 mem sedat. 118
 Vitis

I N D E X.

Vires inde cognoscun- tur. 14	Vomitionum differen- tiz & signa. 50
Viri ad generandum cur inhabiles. 204	Vomitionis criticæ si- gna. 211
Vita brevis. 1	Vomitus in ilio. 142
Ulcenibus frigida mor- dax. 273	Vomitum excitat mo- tio. 18
Ulcera annua & mali- gna. 292	Vomitus sanguinis. 79
Ulcera in hydropicis nō facilè sanantur. 152	Vrinatum differentiæ & Prognostica. 161
ex Ulcere signa. 310	& deinceps. Item 345
Vomentes facilè & dif- ficulter quomodo purgandi. 54	Vulnera circumglabra. 186
	Vulnus Hippocraticus. 313

F I N I S.



